

女
科
歌
訣

田夫兄弟
可謂

古人云甯治十男子莫治一婦女明乎調經胎產見證
百出也女科成書林立奈簡而闕畧者有之繁而蒙混
者有之不失諸偏卽失諸奧我曾祖搜羅女科諸書恐
學者之難於記誦也因編爲歌訣爲初學指引入門非
敢曰知其要者一言而終所賴舉一反三者好古敏求
隨所指而進步焉是卽先人所厚望也夫曾孫炳揚謹
識

女科歌訣目錄

卷之一

經水

四物湯

八物湯

溫經湯

桃仁散

大延胡散

伏龍肝散

調營湯

犀角地黃湯

桃仁承氣湯

逍遙散

小柴胡湯

玉燭散

卷之二

經閉

越鞠丸

導痰湯

逍遙散

白虎湯

紅花散

玉燭散

溫經湯

分心氣飲

卷之三

崩漏

益胃升陽湯

涼血地黃湯

升陽舉經湯

膠艾湯

四物湯

四君子湯

樗白皮散

補中益氣湯

卷之四

赤白帶

二陳湯

魏君元濟陰丹

小胃丹

人參黃芪湯

加味四物湯

滋陰降火湯

五苓散

益胃升陽湯

卷之五

胎妊

人參橘皮湯

全生白朮散

子淋散

麥門冬飲

羚羊角散

芎歸膠艾湯

安胎飲

達生散

佛手散

卷之六

產後

五積交加散

蔥白散

四物湯

四君子湯

當歸川芎湯

失笑散

麻仁丸

延胡琥珀散

聚寶丹

七珍散

益母濟陰丹

硃砂安神丸

清魂散

抵聖湯

荊芥散

續命煮煎

女科歌訣卷之一

吳門邵登瀛步青輯

曾孫炳揚香泉述

元孫

景康景堯

謹校

經水

婦人之病與男子同月經胎產方論不共也不同所謂經

血心主脾生衝爲血海灌溉諸經經絡之餘是爲月候
三旬一見調准無咎過期爲虛四物參芪略加桃紅引
用相宜不及期來乃屬血熱四物芩連清熱養血將行
作痛鬱滯不通四物延牡青附桃紅行後作痛血虛宜
補八物湯中延胡入劑紫色屬熱淡色屬痰治痰治熱

須以脉參

洪數爲熱
滑大爲痰

經凝作痛新舊相搏血室停寒宜

溫經藥淋漓不斷斷後復來或爲澁滯桃仁散該臍腹

作痛癥瘕寒疝消息虛實大延胡散五色相襍注下不

時冷痛日久伏龍肝宜邪客經凝血化爲水泛濫爲腫

調營分理火載血上錯經迷方爲吐爲衄犀角地黃入

於大腸猶如血痢去瘀生新桃仁承氣血虛潮熱經候

不調腰臍脹滿乃用逍遙傷寒發熱適逢經至熱入血

室或行或止晝則明了夜則讖語四物小柴二方合之

甚則玉燭下之亦宜師尼寡婦獨陰無陽慾願不遂火

動不常陰陽交爭乍寒乍熱絕似溫瘧久成勞怯經事

不調白淫襍下頭眩膈滿肢瘦力疲肝脉獨弦出於寸口是爲陰盛治隨脉候

四物湯

歸入心脾地入腎

芍入肝脾斂陰分

芎能通行血中氣

最治血家百種病

血藥主方調經隨症加減

八物湯

八物湯名卽八珍

就於四物配參苓

朮焦草炙同相用

氣血兼療最有靈

溫經湯

溫經歸芍牡川芎

參桂莪甘牛膝同

血室凝寒新舊搏

繞臍氣滯痛難通

治經水不通繞臍寒疝痛甚及寒客血室血滯不行
新舊相搏作痛

桃仁散

桃仁散桂半參丹

四物蒲甘漆澤蘭

經斷復來來復斷

腹疼血滯服之安

治月水不調或淋漓不斷斷而復來血滯作痛

大延胡散

大延胡散樸檳黃

赤芍芎歸橘木香

蓬稜桂棟苓甘草

癥瘕攻衝痛莫當

治腹中滿痛或癥瘕痞塊血氣攻痛

伏龍肝散

伏龍肝散芍藥歸芍

赤脂石甘艾桂薑冬

衝任脉虛經色襍

腰臍腹痛冷攻冲

治勞病衝任脉虛經血不時注下或如豆汁五色相

襍腰腹冷痛

調營湯

調營十七桂延蓬

赤芍歸芍赤茯苓

辛草桑皮芷陳腹

檳苧瞿麥大黃攻

治瘀血留滯血化爲水四肢浮腫皮可赤紋

犀角地黄湯

犀角地黄芍牡丹

吐如潮湧衄如湍

若逢蓄血色應黑

審症投之卽見安

治經水不調火載血升爲吐爲衄

桃仁承氣湯

桃仁承氣用硝黃

攻血通陰入大腸

益以牡丹歸尾芍

婦人腹痛定安康

治經水不調血被火搏滲入大腸有如血痢肚腹作

痛用此主之

逍遙散

逍遙白朮芍歸苓

薄荷柴甘七味靈

室女童男潮晡熱

調經除熱最爲神

治血虛煩熱及潮熱往來月水不調臍腹作痛加味
用山梔丹皮

小柴胡湯

小柴胡湯參夏草

更有黃芩加薑棗

和解方中推第一

少陽百病奏奇效

治婦人傷寒及勞役發熱適遇經行致熱入血室其
血或閉或不止寒熱往來晝則明了夜則譫語用小

柴胡湯合四物湯服之

玉燭散

白芍芎歸并地黃

硝黃甘草配相當

調胃承氣合四物

兩方合用莫遺忘

治經閉發熱六腑閉結

女科歌訣卷之一終

女科歌訣卷之二

吳門邵登瀛步青輯

曾孫炳揚杏泉述

元孫

景康
景堯

謹校

經閉

二陽之病發於心脾不得隱曲女子不月月事不來胞
脉閉也胞脉屬心不下通也是知經血責在心脾通其
閉塞各有所宜七情所傷抑遏停結越鞠丸子疎其鬱
結軀脂滿閉經道閉塞導痰湯者通其經隧脾虛少食
羸瘦潮熱用宜逍遙可使熱徹中消胃熱血液不生先
清胃熱白虎人參血滯作痛紅花當歸經閉腹滿玉燭

無違血海虛冷溫經是已氣滯不通分心理氣有等女
人性執愚魯脉道不通經事向阻難以藥攻戒勿過與
越鞠丸

越鞠丸神香附子

川芎蒼朮炒山梔

六般鬱結須當用

氣暢胸舒痞自除

治七情鬱結經水不行

導痰湯

導痰原用二陳湯

枳實南星并一方

不獨化痰兼利氣

脂充經滯服之康

治脂滿經滯