

福建

五福堂



必便血產後下利厥逆躁不得臥或厥不止

中寒門

陰寒直中少陰經當手足青黑陰寒直中腎經兩脇痛手足指甲盡

青囊縮踠曲而臥陰寒不中腎經舌黑眼目身盡黑黑身盡

青大便秘出小便自遺直中陰寒冷氣犯于小腹不從傳經傷寒

而自寒者

中暑門

中暑亡陽汗出不止立時氣脫中暑發狂氣喘汗如雨下如喪神失守中暑循衣摸床以手撮空中暑猝倒

心痛欲死中暑忽倒口吐白沫將欲發狂身如火燒紫斑爛然

雷亂腹痛欲吐不能欲瀉不得四肢厥逆身青囊縮夏曰感

暑至生霍亂產後忽中霍亂吐瀉夏令

火熱有一時感犯暑邪上吐下瀉立時者生

水濕門

水氣凌心包之絡呃道不止水濕結在膀胱血敵不能

黃癰之症原不宜死產婦感水腫以外面浮手足浮心脹產

婦痛疾如嘔逆產婦一身發黃產婦濕氣感中包絡下陰腫

脹小水點滴不出產

婦水氣凌肺作喘不已

熱症門

熱症發狂如見鬼產婦產半月忽然大汗如雨口渴舌乾發

似熱而燥有似傷寒者

燥症門

血燥肺乾又生癰疽血崩之後口舌燥裂不能飲食口燥症舌乾腫大溺血又便血乾燥火燥大腸陰盡

羊渠名爲腸結 燥症乾甚小腸細小不能出便脹甚 肺燥復耗必有吐血久成肺痿 燥極生風手足牽掣 燥熱之極已成

臍體無膏澤足心反熱 燥極口吐白血 燥極一身無肉陰乾面

小腹痛目有齒突 燥症咳嗽傷肺復加吐血吐濃 產後血燥而暈不省人事 產後大便燥閉欲解不能不解不可煩燥身熱

瘵症 產後失血衄血 產後大血燥成 肺燥裂 脇痛 腹痛絞腸砂 陰陽脫症

內傷門 中風 條 心痛 癆病癆重尸氣 離魂 翻胃 條

失血喘癲癰症 中邪遇鬼 中惡 暈眩 嘔吐 瀉症 喘

症二條 消渴二條 夢遺 痿症二條 瘡症一條 陰喘

血症 水膨 氣膨 血膨 斑症

腹痛 亡陽

喉痛 痢疾

氣鬱 五絕

癲症 砒毒

狂症 虎傷

呆症

厥症

湯火燒湯治

癰疽並無名瘡毒

血

血

血

血

血

血

血

血

血

血

血

山陰陳士

義烏金以

雷真君親傳活人錄

傷寒門

雷公真君曰傷寒而感隔經相傳每每殺人如第一日宜在太陽第二日宜在陽明第三日宜在少陽第四日宜在太陰第五日宜在少陰第六日宜在厥陰此順經傳也今第一日太陽即傳陽明第二日陽明即傳太陰第四日太陰即傳少陰第五日少陰即傳厥陰此過經傳也更有第一日太陽即傳少陽第二日陽明即傳太陰第三日少陽即傳少陰第四日太陰即傳厥陰此隔經傳也第一日太陽即傳少陰第二日陽明即傳太陰第三日少陰即傳厥陰此隔經傳也順傳者原有生機至七日而病自一過傳者有生有死矣隔傳者死多於生矣兩感而傳者三日水漿不入六

知人卽死雖仲景張公立門原有治法然亦止可救其不死者而不能將死者而重生之也我今憫世人之枉死特傳二方一救過經傳之傷寒一救隔經傳之傷寒過經傳方名救過起死湯麻黃一錢柴胡一錢厚朴一錢石膏五錢知母一錢青蒿五錢半夏一錢黃芩一錢茯苓五錢炒梔子五分當歸三錢水煎服一劑卽生蓋過經之傳必然變症紛紜斷非初起之一二日也所以方中不用桂枝以散太陽之邪止用麻黃以散其表傷寒至三四日內熱必甚故以石膏知母爲君以洩陽明之火邪陽明火一退而厥陰之本不舒則木以生火邪退者復聚故又用青蒿柴胡梔子以涼散之木不自焚而各經之邪不攻自散況又有茯苓之重用健脾行濕引火下行盡從膀胱而出之乎且黃芩以清肺厚朴以逐穢半夏以清痰又用之咸宜五臟無非生氣矣所以不必問其日數但見有過經之傳者卽以此方投之無不慶更生也○隔經傳方名救隔起死湯人參五錢石膏五錢知母一錢青蒿一兩柴胡二錢白芍三錢半夏一錢炒梔子三錢

甘草一錢水煎服隔經之傳必至三日而症乃明雖已過陽明而餘火未散故少陰之火助其陷而少陽之火失其權若不俱用石膏知母則陽明之火勢不退而少陰之火勢不息也故必須用此二味爲主然徒用二味而太陰脾土不急爲救援則火極凌元何以存其生氣故又用人參以助生氣但生氣既存而厥陰受邪則木氣乾燥勢必尅太陰之脾土僅存之生氣又安能保乎故又用柴芍梔蒿以涼散其木中之邪木之邪散則木氣得養自然不去尅土而太陰之氣生太陰上有生氣則陽明之火必消歸無有矣又何至焚燒自滅其少陰之臟哉元方中半夏清痰甘草和中又用之無不宜乎起死爲生實非虛語故一見有隔經之傳卽以此方投之必能轉敗爲功也或疑青蒿用之太多不知青蒿不獨泄肝木之火尤能瀉陽明之焰且性靜而不動更能補陰火旺之時補陰重藥又不敢用惟青蒿借其攻中能補同人參氣用實能生陰陽之氣於無何有之鄉若但用人參止生陽氣而不能生陰氣矣陰生則陽火無權制伏之道實非

世人所能測也。○其兩感傳者近岐大師已傳四方可以救死予不必再特遠公固請奇方以救世我於第三日少陽與厥陰兩感水漿不人不知人者再傳一方以佐天師之未逮方名救臟湯人參二兩麥冬三兩當歸一兩天花粉二錢元參二兩白芍二兩荆芥二錢水煎服全方多當歸者助肝胆以生血也多加麥冬者救肺氣之絕以制肝胆之木使火不旺而血易生而後胃氣有養臟腑可救其壞也與天師方大同小異各有妙用傷寒發狂至登高而歌棄衣而走見水而人罵詈呼號不避親疎者去半遠矣仲景以竹葉石膏湯救之妙矣蓋陽明之火其勢最烈一發而不可救非用大劑白虎湯何能止其燎原之勢而世人畏首畏尾往往用之而特少其劑是猶杯水救車薪之焰也故用否羔必須至三四兩或半斤一劑煎服火勢始能少退狂亦可少止也然石膏性猛雖退火未免損傷胃氣必須與人參兼用爲妙我今傳一方用白虎湯之半而另加藥味方名祛熱生胃湯石膏三兩知母三錢人參五錢元參三兩茯苓一兩麥冬三

兩草前子五錢水煎服此方石羔知母以瀉胃火人參以生胃氣元參去浮游之焰麥冬生肺中之陰茯苓車前引火下行於膀胱從小便而出且火盛者口必渴口渴必多飲水吾用此二味以分濕則水流而火自藏水而散矣方中瀉火而不傷氣似勝於白虎湯一劑而狂定二劑而口渴減半三劑而口渴止火亦息正不必用四劑也凡有火熱而發狂或汗如雨下口渴舌燥或如芒刺者以此方投之立效斷不至於死也

傷寒發斑死症也然而斑亦不同有遍身發斑者有止心窩發斑症以輕而轉重蓋遍身發斑內熱已盡發於外心窩發斑熱存於心中而不得出必須用化斑之藥以解其熱毒之在中也我有一方最神名起斑湯升麻三錢當歸一兩元參三兩荆芥三錢黃三錢天花粉五錢甘草一錢茯神三錢水煎服火毒結於內必須盡情發出然內無血以養心則心中更熱火毒益熾而不能外越也故用當歸元參以滋心中之血用黃連以涼心中之火天花粉以消心中之痰然而無開關之散則火藏於內而不

得洩故又用升麻荆芥之發也甘草決神以和之自然引火出外而不內蓄矣火既外越班亦漸消又何至於喪命哉

傷寒太陽症結胸證具煩燥者王死言不可下卽下而亦死也夫結胸而如煩燥所以症成不可治也雖然津液之竭非五臟之自絕亦固結胸之故耳是必攻其中堅使結胸症愈而津液自生死症可望重甦也我今傳一奇方名化結湯天花粉五錢只壳一錢陳皮五分麥芽三錢天門冬三錢桑白皮三錢神曲三錢水煎服一劑卽結胸開而津液自生也此方用天花粉以代瓜萆不至陷胸之過猛然而天花粉卽瓜萆之根也最善陷胸而無性猛之憂枳壳消食寬中麥芽與桑白皮同用而化導更速神曲皮調胃實有神功天門冬善生津液佐天花粉有水乳之合世人未知也天花粉得天門冬化痰化食殊有不可測識之效所以旣結者能開必死者可活若以大陷胸湯蕩滌之於已汗已下之後鮮不速其死矣

傷寒有臟結之症載在太陽經中其實臟結非太陽經病也然則仲景載

在太陽經者何故正辨太陽經有似臍結之一症不可用攻故載之以辨明也臍結之症小腹之內與兩脅之旁相連牽痛以至前陰之經亦痛重則有筋青而死者此乃陰邪而結於陰地也原無表症如何可作表治必須攻裏爲得有我一方專補其陰中之虛而少佐之祛寒之味則陰邪自散而死症可生方名散給救臍湯人參一兩白朮五錢甘草一錢附子一錢當歸一兩肉桂五分水煎服白朮利腰脅之氣人參救元陽之絕當歸活週身之血而腰脅之氣更利也甘草和中以定痛附桂散寒以祛邪臍中既溫結者自解矣用攻於補之內祛寒於補之中其奏功爲獨異耳傷寒陽明症中有直視譫語喘滿者死而下利者亦死之文此必症邪直視譫語而又喘滿下利一齊同見也苟有一症未兼尙不宜死倘三症皆見明是死證矣雖是直視譫語之生多是胃火之盛自焚其心而腎水不能來濟於是火愈盛而無制喘滿者火炎而氣欲上脫也下利者火隱而氣欲下脫也此猶欲脫未脫之角症若治之得法猶可望生吾有奇方名

曰援脫散石羔五錢人參一兩麥冬一兩白芍一兩竹茹三錢水煎服此方用人參以救脫用石膏以平入用麥冬以平喘白芍以止利用竹茹以清心自然氣不絕而可救也

傷寒表症乃已汗已吐已下而身仍熱如火此不解之症也其時自然各死症紛見矣我用何法以生之乎夫已汗而不解者乃不宜汗而汗之已吐而不解者乃不宜吐而吐之已下而不解者乃不宜下而下之也干不宜汗而救其失汗干不宜吐而救其失吐干不宜下而救其失下固是生之之法然而終無一定之法也我今特傳奇方于三者之失而統救之名救壞湯人參五錢柴胡一錢白芍一兩元參五錢麥冬五錢白芥子二錢當歸五錢陳皮五分水煎服此方妙在全不去救失吐失汗失下之症反用參苓歸芍大補之劑少加柴胡以和解之自能退火而生胃氣倘鑒其失吐而重吐之失汗而重汗之失下而重下之孱弱之軀何能勝如是之摧殘哉必死而已矣故必用吾方而後死者可生也

傷寒少陰症惡寒身踈而不利手足逆冷不治之病也蓋陰盛無陽腹中無非寒氣陽已將絕而又下利不止則陽隨利而出不死何待雖然陽氣將絕終非已絕也急用補陽氣之藥挽回於無何有之鄉則將絕者不絕方用人參二兩附子二錢甘草二錢乾姜二錢白朮一兩茯苓五錢水煎服方名救逆止利湯一劑而逆回二劑而利止三劑全愈矣此方用人參附子回元陽於頃刻以追其散失祛其陰寒之氣用白朮茯苓以分消水濕而仍固其元陽用甘草乾姜調和腹中而使之內熱則外寒不去而自散又何有餘邪之伏莽哉自然寒者不寒而踈者不踈逆者不逆而利者不利也寒踈逆利之去哉安得而不生乎

傷寒少陰症吐利兼作又加煩悶手足四逆者死病也上吐下瀉且兼煩燥則陰陽擾亂拂抑而無生氣可知況加手足四肢之逆冷是脾胃之氣又將絕也自是死症無疑然而治之於早未嘗不可救如一見此等症急以人參二兩白朮二兩肉桂二錢丁香二錢灌之尚可救耳方名二逆湯

安湯人參救元陽之絕原有奇功白朮救脾胃之崩實有至效丁香止嘔  
肉桂溫中又能止瀉救中上之危亡莫上下之奠亂轉生機於頃刻杜死  
禍於須臾舍此方又何有別方哉

傷寒少陰症下利雖止而頭眩暈昏亦是死症蓋陽雖回而陰已絕下多  
亡陽竟至陰絕原無救法雖然陰陽未嘗不兩相根而兩相生也今因陰  
絕而諸陽之上聚於頭者紛然亂動所以眩胃陽欲脫而未脫夫陽既未  
絕補其陽而陽氣生陽生則陰之絕者可以重續陰生於陽之中也方用  
參桂湯人參二兩肉桂二錢煎服可救人參返陽氣於無何有之鄉是止  
能返陽氣也如何陰絕也亦能回之不知人參雖屬陽而中存陰氣陽居  
其二陽既既回矣陰氣亦從之而漸返肉桂雖是純陽之品而性走肝腎  
俱是補陰之聖藥故用之而成功也

傷寒少陰病四逆惡寒身踈脉不至不煩而躁本是死症而吾以爲可救  
者何全在脉不至不煩而躁也夫病至四肢之逆其陰陽之將絕可知脉

之不至未必非寒極而伏也不然陽絕則心宜煩矣而何以不煩但嫌其  
不煩而燥則陽未絕而將絕爲可畏耳陽旣欲絕則陰亦隨之而絕矣故  
一補其陽陽回而陰亦回也陰陽之道有一線未絕俱爲可救譬如得餘  
火之星星引之可以焚林况眞陰眞陽非有形之水火也乃先天之氣耳  
一得接續便有生機故一見此等之症急以生生湯救可以重生方用人  
參三兩附子三錢炒東仁五錢水煎服此方得人參以回其陰陽附子以  
祛其寒逆加東仁以安心則心定而躁可去定而脉自出矣死中求生其  
在斯方乎

傷寒少陰病六七日息高者死息高見於六七日之間明是少陰之症而  
非太陽之症也息高與氣喘大殊太陽之症乃氣喘氣喘本乎邪盛少陰  
之症乃息高息高本於氣虛而息高與氣喘終何以辨之氣喘者鼻息粗  
大息高者鼻息微小耳此乃下元之眞氣欲絕而未絕牽連氣海之間故  
上行而作氣急之狀能上而不能下也最危最急之候方用止息湯人參

三兩熟地三兩牛夕三錢麥冬二兩破故紙三錢胡桃仁一箇乾姜五分  
水煎服此方大補開元氣海復引火之下行絕不去祛寒逐邪庶幾氣可  
回而息高者可平也倘疑是太陽喘症而妄用桂枝湯投入於頃刻矣故  
必用止息湯救之十人中亦可望生五六人然必須多服久服始得苟或  
服一劑而輟止亦未能收功者又不可不知

傷寒少陰病脈微沉細但欲臥汗出不煩自欲嘔吐至五六日自利復煩  
躁不能臥寐者死症也傷寒而脈微沉細明是陰症况欲臥而不欲動乎  
汗已出矣內無陽症可知心中不煩時欲嘔吐此陽邪已散而陰邪作祟  
急宜祛寒爲是乃失此不溫至五六日而下利是上下俱亂也此時倘不  
煩燥則腎中之真陽未散今又如煩燥不得臥寐明是奔越巧不可回之  
兆矣非死症而何然而其先原因失治以至於不可救非本不可救而成  
此擾亂之症也我有奇方名轉陽拔絕湯用人參一兩白朮一兩炒杏仁  
一兩茯苓五錢肉桂二錢水煎服一劑即可安臥而回春矣此方用人參