

臨證指南
外

秘聚 嘔吐 便秘 喘

痞 吐 肺痺 呃

噎膈 不食 胸痺 疸

噫噎 腸痺 哮

臨證指南醫案目

卷四

積聚

痞

噎膈

噤口

嘔吐

吐衄

不食

腸痺



便閉

肺癰

胸痺

哮

喘

呃

嘔

卷四

雜症

臨證指南醫案卷四

許關李大瞻翰圃

枯吳葉

桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九空較

華旦玉堂

積聚

木犯土
虛中夾

葛

與怒強食肝木犯土腹痛突如有形緩則泯然無跡

氣下鳴響皆木火餘威乃癰疝之屬戊伐消導必變腹

滿以虛中挾滯最難速功近日痛瀉恐延秋痢

丁香

厚朴

茯苓

炒白芍

廣皮

煨益智仁

又下午倦甚。暮夜痛發。陽微陰獨。乃踞用溫通陽明法。

人參

吳萸

半夏

姜汁

茯苓

炒白芍

又照前方去白芍加川棟牡蠣

脾胃傷
氣分結
痞

白

十

瘡邪久留。結聚血分成形。仲景有緩攻通絡方法可

宗。但瘡母必在脇下。以少陽厥陰表裡爲病。今脉弦大。

面色黃滯。腹大青筋皆露。頸脉震動。純是脾胃受傷。積

聚內起。氣分受病。痞滿勢成。與瘡母邪結血分。又屬兩

途。經年病久。正氣已怯。觀東垣五積。必疎補兩施。蓋緩

攻為宜

生於朮

雞肫皮

川連

厚朴

新會皮

姜渣

水快丸

氣滯濕熱
腑聚

馬三病後食物失和腸中變化傳導失職氣滯釀濕鬱而

成熱六腑滯濁為之聚昔潔古東垣輩於腸胃宿病每取九劑緩攻當倣之

川連

蘆薈

若葉上炙

雞肫皮

不落水去垢新丸上炙晚

煨木香

小青皮

萊菔子

南山查

紫厚朴

蒸餅為小丸

濕熱食滯

陳十濕勝脾胃食物不化向有聚積腸腑不通熱氣固鬱

當進和中忌口勿勞不致變病

黃芩

枳實

廣皮

萊菔子

白芍

白朮

蒼朮

雞肫皮

水泛丸

痰癰脉絡

吳三

右脇有形高突按之無痛此屬癰痞非若氣聚凝痰

難以推求然病久僅阻在脉須佐針刺宣通正在伏天宜商

真蛤粉

白芥子

瓜蒌皮

黑梔皮

半夏

鬱金

橘紅

姜皮

血絡凝滯

曹

着而不移是爲陰邪聚絡診脉弦緩難以五積肥氣

攻治大旨以辛溫入血絡治之

當歸鬚

延胡

官桂

橘核

韭白

王三騎射馳驟寒暑勞形皆令陽氣受傷三年來右胸脇形高微突初病脹痛無形久則形堅似梗是初爲氣結在經久則血傷入絡蓋經絡系於臟腑外廓猶堪勉強支撐但氣鈍血滯日漸痰痺而延癥瘕怒勞努力氣血交亂病必旋發故寒溫消剋理氣逐血總之未能講究絡病工夫考仲景於勞傷血痺諸法其通絡方法每取虫蟻迅速飛走諸靈俾飛者升走者降血無凝着氣可宣通與攻積除堅徒入臟腑者有間錄此備參末議

蟻螂虫

廣虫

當歸鬚

桃仁

川鬱金

伏梁

川芎 生香附 纓木香 生牡蠣 夏枯草

用大酒麴末二兩加水稀糊丸無灰酒送三錢

某 伏梁病在絡。日後當血凝之處。脉數左大。是其徵也。

厚朴 一錢 青皮 八分 當歸 一錢 鬱金 一錢

益母草 三錢 茯苓 一錢 澤瀉 一錢

某 脉數堅。伏梁病在絡。宜氣血分消。

桃仁 三錢 鬱金 一錢 芫薺子 一錢 枳實 七分

厚朴 一錢 茯苓 三錢 通草 五分

自難經分出積者陰氣也。五臟所生聚者陽氣也。六

腑所成。後巢氏病源另立癥瘕之名。以不為癥。

動者爲癥。究之亦卽難經積聚之意也。前賢有云。積聚者。就其有膜結聚之處。以經脈所過部分屬臟者爲陰。陰主靜。靜則堅而不移。屬腑者爲陽。陽主動。動則移而不定。故是案中又從而悟出云。着而不移。是爲陰邪。聚絡大旨以辛溫入血絡治之。蓋陰主靜。不移卽主靜之根。所以爲陰也。可容不移之陰邪者。自必無陽動之氣。以旋運之。而必有陰靜之血。以倚伏之。所以必藉體陰用陽之品。方能入陰出陽。以施其辛散溫通之力也。又云。初爲氣結在經。久則血傷入絡。輒仗蠕動之物。鬆透病根。是又先生化裁之妙。於

古人書引伸觸類而得。若夫蒼腕之去熱滯。芥珣之
豁凝痰。不過爲先生用古處也。案中積症。第見伏梁。
不能盡備。然宋時諸賢。於五積九積治法。載在書籍。
者頗多。大畧消補兼施。并以所惡者攻。所喜者誘。爾。
業醫者。自當知之稔也。姚亦陶

痞

痰熱內閉

宋

前議辛潤下氣以治肺痹。謂上焦不行。則下脘不通。

古稱痞悶。都屬氣分之鬱也。兩番大便秘。胸次稍舒。而未爲全爽。此豈有形之滯。乃氣鬱必熱。陳腐粘凝膠聚。故脘腹熱氣下注。隱然微痛。法當用仲景梔子豉湯。解其陳腐鬱熱。暮卧另進白金丸一錢。蓋熱必生痰。氣阻痰滯。一湯一丸。以有形無形之各異也。

黑山梔

香豉

鬱金

杏仁

桃仁

瓜蒌皮

降香

另付白金丸五錢

孫 寒熱由四末以擾胃。非藥從口入以擾胃。邪熱津液

互膠成痰。氣不展舒。阻痺脫中。治法不但攻病。前議停

藥。欲謬藥氣盡。病自退避。三舍耳。

人參

川連鹽水炒

枳實

半夏

鬱金

石菖蒲

熱邪裡結

某

脉不清。神煩倦。中痞惡心。乃熱邪裡結。進瀉心法。

炒半夏

黃芩

黃連

乾姜

枳實

杏仁

劉

熱氣痞結。非因食滯。胃汁消燂。舌乾便難。苦辛開氣。

酸苦泄熱。是治法矣。

川連

生薑

人參

枳實

橘紅

烏梅

生白芍

氣閉化熱

顧

氣閉久則氣結不飢不食不大便

川貝母

白蔻仁

鬱金

杏仁

金銀花

萊豆殼

又氣結必化熱乃無形之病故徒補無益

鮮省頭草

川斛

甜杏仁

川貝母

麻仁

何三煩勞之人衛氣少固霧露雨濕傷其流行清肅瘡痍

外涸腕脇反痺乃經脈為病無關腑臟

鈎藤

生白蒺

鬱金

白蔻仁

桑葉

橘紅

又氣室熱鬱仍治上可以通鼻

杏仁

鬱金

香附

瓜蒌皮

黑山梔

蘇梗

熱邪入厥陰

周

寒熱嘔吐。或重。自利。是暑濕熱外因。因嗔怒動肝。邪

氣入於厥陰。胸滿腹脹消渴。議以開痞方法。

瀉心湯去參甘加枳實白芍

伊

因驚而得邪。逆入肝。故厥後熱。神識昏狂。視得面青

舌白。微嘔渴飲。胸次按之而痛。此屬痞結。乃在裏之症。

宗仲景以瀉心湯為法。

暑濕伏
邪夾食

川連

半夏

乾姜

黃芩

人參

枳實

尤

面垢油亮。目眇黃。頭脹如束。胸脘痞悶。此暑濕熱氣

內伏。因勞倦。正氣泄越。而發。既非暴受風寒。發散取汗。
徒傷陽氣。按脉形濡瀼焉。是表症。凡傷寒必究六經。伏
氣須明三焦論症。參脉壯年已非有餘之質。當以勞倦
傷伏。和例診治。

滑石

黃芩

厚朴

醋炒半夏

杏仁

蔻仁

竹葉

又胸痞自利。狀如結胸。夫食滯在胃。而胸中清氣悉爲

濕濁阻遏與食滯兩途此清解三焦却邪湯藥兼進保

和丸消導

淡黃芩 川連 淡乾姜 厚朴 醋炒半夏

鬱金 白蔻仁 滑石 送保和丸三錢

談氏 胸痞不饑熱不止舌白而渴此暑邪未盡仍清氣分

暑邪阻氣

鮮竹茹 淡黃芩 知母 橘紅 鹽水炒

滑石 桔梗 枳殼汁 鬱金汁

某 惡寒泄瀉悉減胸脘仍悶餘暑未盡胃氣未甦故耳

大麥仁 佩蘭葉 新會皮 半夏 麴 錢半

金斛 茯苓 錢半