

傷寒質珠集

(二)

張仲景傷寒論貫珠集目錄卷二

太陽救逆法第四 計六十四條 方二十七道

論結胸臟結之異三條

結胸及痞之源一條

結胸證治十條

大陷胸湯方

大陷胸丸方

小陷胸湯方

文蛤散方

三物白散方

痞證七條

大黃黃連瀉心湯方

附子瀉心湯方

半夏瀉心湯方

生薑瀉心湯方

甘草瀉心湯方

懊惱煩滿六條

梔子豉湯方

梔子甘草豉湯方

梔子生薑豉湯方

梔子厚朴湯方

梔子乾薑湯方

下利脈證五條

桂枝人參湯方

葛根黃連黃芩湯方

赤石脂禹餘糧湯方

下後諸變證治九條

桂枝去芍藥湯方

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝去芍藥加附子湯方

柴胡加龍骨牡蠣湯方

誤汗吐下後諸變脈證十三條

乾薑附子湯方

茯苓四逆湯方

黃連湯方

火逆十條

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

桂枝加桂湯方

太陽類病法第五 計三十三條 方八道

溫病一條 風溫一條 瘟病七條

桂枝加葛根湯方

濕病五條 風濕四條

桂枝附子湯方

甘草附子湯方

渴病三條 霍亂病十一條

四逆加人參湯方

理中丸方

四逆加猪膽汁湯方

飲證一條

瓜蒂散方

張仲景傷寒論貫珠集卷之二

飲鶴山人尤怡在涇註

二然朱陶性校

太陽下篇

太陽救逆法第四 計六十三條

論胸結臟結之異三條

問曰病有結胸有臟結其狀如何答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也何謂臟結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰臟結舌上白胎滑者難治

此設爲問答以辨結胸臟結之異結胸者邪結胸

按中之則痛臟結者邪結腸間按之亦痛如結胸
一者謂如結胸之按而痛也然胸高而臟下胸陽而
臟陰病狀雖同而所處之位則不同是以結胸不
能食臟結則飲食如故結胸不必下利臟結則時
時下利結胸關脈沉臟結則更小細緊而其病之
從表入裏與表猶未盡之故則又無不同故結胸
臟結其寸脈俱浮也舌上白胎滑者在裏之陽不
振入結之邪已深結邪非攻不去而臟虛又不可
攻故曰難治

臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不

可攻也

邪結在臟必陽氣內動或邪氣外達而後可施攻
取之法若無陽證不往來寒熱則內動外達之機
俱泯是以其人反靜其舌胎反滑邪氣伏而不發
正氣弱而不振雖欲攻之無可攻已蓋卽上文難
治之端而引其說如此

病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名
臟結死

臟結之證不特傷寒卽雜病亦有之曰脇下素有
痞則其病久而非暴矣曰連在臍旁痛引少腹入

陰筋則其邪深而非淺矣既深且久攻之不去補之無益雖不卒死亦無愈期矣故曰死

論結胸及痞之源一條

病發於陽而反下之熟人因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之太早故也

此原所以結胸與痞之故病發於陽者邪在陽之經病發於陰者邪在陰之經也陽經受邪鬱卽成熟其氣內陷則爲結胸陰經受邪未卽成熟其氣內陷則作痞所以然者病邪在經本當發散而反下之裏氣則虛邪氣因入與飲相博而爲病也要

之陽經受邪原有可下之例特以未得成實而早行下法故有結胸之變證審其當下而後下之何至是哉仲景復申明所以成結胸之故而不及痞豈非以陰經受邪則無論遲早俱未可言下耶

論結胸證治十條

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則爲結胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗劑頸

而還小便不利身必發黃也

脈浮動數皆陽也故爲風爲熱爲痛而數則有正爲邪迫失其常度之象故亦爲虛頭痛發熱微盜汗出而復惡寒爲邪氣在表法當發散而反下之正氣則虛邪氣乃陷動數變遲者邪自表而入裏則脈亦去陽而之陰也膈內拒痛者邪欲入而正拒之正邪相擊則爲痛也胃中空虛客氣動膈者胃氣因下而裏虛客氣乘虛而動膈也短氣躁煩心中懊憹者膈中之飲爲邪所動氣乃不舒而神明不寧也由是陽邪內陷與飲相結痞鞕不消而

結胸之病成矣大陷胸湯則正治陽邪內結胸中
之藥也若其不結胸者熱氣散漫旣不能從汗而
外泄亦不得從溺而下出蒸鬱不解浸淫肌體勞
必發黃也

太陷胸湯方

大黃六兩 芒硝一升 甘遂一錢七分

右三味水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝
煮一二沸內甘遂末溫服一升得快利止後服
按大陷胸與大承氣其用有心下與胃中之分以

愚觀之仲景所云心下者正胃之謂所云胃中者

正太小腸之謂也。胃爲都會水穀並居清濁未分邪氣入之夾痰雜食相結不解則成結胸。大小腸者精華已去糟粕獨居邪氣入之但與穢物結成燥糞而已。大承氣專主腸中燥糞。大陷胸并主心下水食燥糞在腸必藉推逐之力故須枳朴水食在胃必兼破飲之長故用甘遂。且大承氣先煮枳朴而後內大黃大陷胸先煮大黃而後內諸藥夫治上者制宜緩治下者制宜急而大黃生則行速熟則行遲蓋卽一物而其用又有不同如此。

傷寒六七日結胸熱實脈沉而緊心下痛按之石硬

者大陷胸湯主之

邪氣內結既熱且實脈復沉緊有似大承氣證然
結在心下而不在腹中雖按之右鞭而痛亦是水
食互結與陽明之燥糞不同故宜甘遂之破飲而
不宜枳朴之散氣如上條之說也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯
但結胸無大熱者此爲水結在胸膈也但頭微汗出
者大陷胸湯主之

熱結在裏而復往來寒熱是謂表裏俱實不得以
十餘日之久而獨治其裏也故宜大柴胡表裏兩

解之法若但結胸而無大熱如口燥渴心煩等證者此爲水飲結在胸膈之間所謂水結胸者是也蓋邪氣入裏必挾身中所有以爲依附之地是以在腸胃則結于糟粕在胸膈則結於水飲各隨其所有而爲病耳水結在胸而但頭汗出者邪膈於上而氣不下通也故與大陷胸湯以破飲而散結太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

汗下之後津液重傷邪氣內結不大便五六日舌

上燥而渴目晡所小有潮熱皆陽明胃熱之徵也
從心下至少腹鞭滿而痛不可近則不特徵諸兆
抑且顯諸形矣乃不用大承氣而用大陷胸者亦
以水食互結且雖至少腹而未離心下故也不然
下證悉具下藥已行何以不臣枳朴而臣甘遂哉
結胸者項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸

痓病之狀頸項強直結胸之甚者熱與飲結胸膈
緊貫上連於項但能仰而不能俯亦如痓病之狀
也曰柔而不曰剛者以陽氣內陷者必不能外閉
而汗常自出耳是宜下其胸中結聚之實則強者

得和而愈然胸中盛滿之邪固非小陷胸所能去
而水熱互結之實亦非承氣湯所可治故與葶苈
之苦甘遂之辛以破結飲而泄氣閉杏仁之辛白
蜜之甘以緩下趨之勢而去上膈之邪其芒硝大
黃則資其軟堅蕩實之能

大陷胸丸方

太黃半觔

葶苈半觔

芒硝半觔

杏仁半升去皮尖熬

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研加脂和散
取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合