

赤水玄珠

卷五

赤水玄珠第八卷目錄

瘧門

泄痢辨

泄瀉門

痢門

亦水玄珠第八卷

新安生生子孫一奎著輯

瘧門

內經皇帝問曰夫瘧瘧皆生於風其蓄蘊有時者何也岐伯曰瘧之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲飲冷帝曰何氣使然願聞其道岐伯對曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頷也巨陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故飲冷也此皆得之

夏傷暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣並居衛氣者晝日行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日而作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰善其作日晏與日早者何氣使然也岐伯曰邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此作日稍晏也其出於風府日下一節

二十五日下至骶骨二十六日入於脊內注於伏膂之脈其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連暮原也其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也

帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之始發也不當風府其日作者柰何岐伯曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之

所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之發必開其腠理邪氣之所舍則其府也

帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧帝曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏岐伯曰溫瘧得之冬傷於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓燥肌肉消腠理發泄或有所用力

邪氣與汗皆出此病藏於腎其氣先從內出之於外者也如是者陰虛而陽盛陽盛則熱矣衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧其但熱不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧帝曰瘧瘧何如岐伯曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身厥逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間今人消爍肌肉故名曰瘧瘧帝曰瘧未發其應何如岐伯曰瘧氣者必更盛更虛當氣之所在也病在陽則熱而脈躁在陰則寒而

脈靜極則陰陽俱衰衛氣相離故病得休衛氣集則復病也

衛與邪相并則病作與邪相離則病休其并於陰則寒并於陽則熱離於陰則寒已離於陽則熱已至次日又集而并合則復病也

帝曰時有間二日或者至數日或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日發者邪氣與衛氣客於六府而有時相失不能相得故休數日乃作也瘧者陰陽更勝也或甚或不甚故或渴或不渴

帝曰夫經言有餘者瀉之不足者補之今熱爲有餘寒爲不足夫瘧者之寒湯火不能溫也及其熱冰水不能寒

也此皆有餘不足之類當此之時良工不能止必須其
自衰乃刺之其故何也願聞其說岐伯曰經言無刺熇
熇之熱無刺渾渾之脈無刺漉漉之汗故爲其病逆未
可治也夫瘧之始發也陽氣并於陰當是之時陽虛而
陰盛外無氣故先寒慄也陰氣逆極則復出之陽陽與
陰復并於外則陰虛而陽實故先熱而渴夫瘧氣者并
於陽則陽勝并於陰則陰勝陰勝則寒陽勝則熱瘧者
風寒之不常也病極則復至病之熱也如火之熱如風
雨不可當也故經言曰方其盛時必毀因其衰也事必
大昌此之謂也夫瘧之未發也陰未并陽陽未并陰因
而調之眞氣得安邪氣乃亡故工不能治其已發爲其

氣逆也帝曰善攻之奈何早晏何如岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也上已

俱內經
瘧論

保命集云夏傷於暑秋必瘧瘧蓋傷之淺也近而暴傷之重也遠而深瘧瘧者久瘧也是之夏傷於暑濕熱閉藏而不能發洩於外邪氣內行至秋而發爲瘧也初不知何經受病隨其受而取之有中三陽者有中三陰者大抵經中邪氣其症各殊同傷寒論之也故內經曰五臟皆有瘧其治各別太陽經者謂之風瘧治多汗之在陽

明經者謂之熱瘧治多下之在少陽經者謂之風熱瘧治多和之此三陽受病皆謂之暴瘧也發在夏至後處暑前者此乃傷之淺者近而暴也在陰經者則不分三經皆謂之溫瘧宜以太陰經論之其發處暑後冬至前者此乃傷之重者遠而深也瘧瘧者老瘧也故謂之久瘧

丹溪云風暑之瘧當發汗夏月多在風涼處歇遂閉其汗而不泄故也惡飲食者必自飲食上得之無汗者要有汗發散爲主帶補有汗者要無汗扶正氣爲主帶散邪瘧病感虛者須以人參白朮一二帖托住其氣不使下陷後使他藥內傷挾外邪同發必內生痰外

以汗解散二陳湯加柴胡黃芩常山草菓煎服 久瘧

不得汗者二陳

湯加

檳榔倍加蒼朮

一方加柴胡葛根

川芎一補一發不可直截

老瘧係風暑入於陰分用

血藥引出陽分則散當以當歸紅花黃柏川芎白朮

蒼朮甘草白芷水煎露一宿空心服

按瘧在陰分須徹起陽分者卽格至論中云臟傳出至
府亂而失期也又當因其汗之多寡而爲補養升發之
下陷謂陽氣下陷入陰血中無汗要有汗多用川芎葛
根蒼朮升麻茈胡之屬此丹溪治瘧之微旨也

心法附餘曰世用砒礬等毒藥截瘧差悞甚矣且俗名曰

脾寒此因名而迷其實也苟因飲食所傷而得亦未必

全是寒况其他乎在陽分者易治陰分者難治瘧母必用毒藥消之行氣消堅爲主

脈訣舉要曰瘧脈自弦弦數多熱弦遲多寒隨時變遷

心法附錄曰有病久脈極虛微而無力似乎不弦然而必於虛微之中見弦但不搏手耳細察可見也

生生子曰世俗皆視瘧爲小病不分外感內傷勞倦虛弱在陽在陰之旨率以砒丹常山等毒劑劫之或以草藥嘗之又或指爲鬼祟而以符水巫咒禁之稟受厚邪輕者偶中僥倖稟弱邪重者愈劫而愈陷矣於是遷延歲月咳嗽潮熱飲食減少每每變虛怯之候不思經曰邪之所湊其氣必虛輕病重治必成重病都緣不能脫俗

故耳良可悲夫

桂枝羌活湯

處暑前後頭痛項強脈浮惡風有汗

桂

枝 羌活

防風

甘草

炙

各等分爲粗末每服五

錢水一盞半煎至一盞迎發日溫服

吐者加半夏麴

麻黃羌活湯

頭痛項強脈浮惡風無汗

麻黃 羌活

防風

甘草

炙

各等分煎法如前如吐加半夏麴等

分

二方皆太陽經

白芷湯

治瘧身熱目疼熱多寒少脈長睡卧不安先以

大柴胡湯下之微利爲度如下後微邪未盡者以此湯

盡之

白芷

知母

各一兩

石膏

四兩

服法同前

此陽明經

桂枝石膏湯

隔日一發先寒後熱寒少熱多

桂枝

五錢

石膏

知母

各一兩半

黃芩

一兩

右分作三服

間日

者邪氣

所舍深也

如外邪已罷內邪未已再下之

從卯至

午發者宜大柴胡湯下之

從午至酉者知邪在內

也宜大承氣湯下之

從酉至子或至寅發者知邪

在血宜桃仁承氣湯下之

前項下藥微利爲度再

以小柴胡湯徹其微邪之氣

桂枝芍藥湯

寒熱大作不拘先後此太陽陽明合病也

謂之大爭寒熱作則必戰動經曰熱勝則動也發熱則

必汗泄經云汗出不愈知爲熱也陽盛陰虛之症治當

內實外虛不治恐久而傳入陰經也宜桂枝芍藥湯主

之

示火之味

八卷

桂枝二錢 黃芪 知母 芍藥 石膏各五錢

右服七錢水煎服 如服前藥而寒熱轉大者知太

陽陽明少陽合病也宜桂枝黃芩湯以和之

桂枝黃芩湯 治三陽合病 甘草四錢五分 石膏五錢 知母五錢

桂枝二錢 柴胡二錢 黃芩四錢五分 人參四錢五分 半夏四錢 右水

煎服服後如外邪已罷內邪未已用大柴胡大承氣等

湯下之

麻黃黃芩湯 治夜發者 桃仁承氣湯亦治夜發者

麻黃一兩 甘草炙三兩 桃仁三十枚 黃芩去苦 官桂二錢五分

服法同前

桃仁味苦甘辛肝為血海血受邪則肝氣燥經云肝

苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此發散血中風寒之劑麻黃桂枝桃仁乃太陽經血藥非三陰經藥也

生生子曰已上皆劉守真分經治療法也與內經之旨皆相符合明其邪自外而來故治同傷寒也予驗今之所發者除傷風所發外亦有多挾內傷者或從飲食所得或從勞倦所得此必先有所感而邪氣潛伏今爲新傷所啟發也雖涉內傷而頭疼寒熱口渴等症亦不出前數法外矣予每用所挾症之藥加於前各經治方之內錯綜治之亦不失古人意也故所向輒有功

濟世方治先熱後寒者以小柴胡湯先寒後熱者小柴胡