

門類目錄

外感門

中風

傷寒

中寒

傷寒

中暑

中溼

瘟疫

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

風門

破傷風

胃風

痛風

痺

癘風

寒門

咳嗽

霍亂

暑門

瘧

痢

溼門

痞

泄瀉

溼熱門

吞酸

疽

水腫

鼓脹

赤白濁

痰門

痰

哮喘

喘

惡心

嘔吐

欬逆

翻胃

嘈雜

闕格

噎氣

痰熱門

瘧

癰

顛狂

驚悸怔忡

健忘

纏喉風喉痺

大門

火

吐血

咳血

嘔血

咯血

衄血

溺血

下血

腸風臟毒

痔瘡

漏瘡

脫肛

淋

小便不通

小便不禁

夢遺

風熱門

斑疹

頭眩

頭痛

頭風

眼目

耳聾

鼻病

口舌

牙齒

燥門

消渴

燥結

鬱門

六鬱

氣滯

寒鬱門

心脾痛

腹痛

火鬱門

脇痛

跌撲損傷

疥瘡

癰疽

疔瘡

諸瘡

溼鬱門

腰痛

疝痛

腳氣

積門

積聚痞塊

虛損門

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

厥

勞瘵

補損

婦人門

經病

崩漏

帶下

產前

產後

子嗣

諸病

小兒門

小兒諸病

痘瘡

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用要方

體氣

汗癰

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

廣按先儒曰學者必務知要知要則能守約守約則足以盡博矣至哉言也不獨可施於讀書窮理而已今予於醫道亦然夫醫經所言人有四百四病可謂博矣而丹溪定為病目一百可謂約矣然簡約之中又有樞要存焉何則醫之末流雖繁其本源也不過外感內傷二者而已故今定門類先之以外感內傷然外感又有風寒暑溼致疾之殊故繼之以風寒暑溼內傷又有溼熱痰火為病之異故繼之以溼熱痰火况外感內傷久而不治則成鬱積故鬱積次之鬱積之久而無以解則致虛損故虛損又次之至於婦人小兒有病不同於男子大人者故婦人小兒又其次之可謂博而約且要矣孰謂醫道無統紀也哉

目錄

卷首

甲集

丹溪本草行義補遺

丹溪十二經見證

丹溪論

河間風熱溼燥寒論

診家樞要

十二經脈歌

卷之一

乙集

外感門 上

中風

中氣

預防中風

傷風

冒風同治

中寒

傷寒

冒寒

溫熱病

卷之二

外感門 下

中暑

暑風

注夏

中溼

溼熱

瘟疫

大頭病

冬溫病

嶺南諸病

運氣證治

卷之三

丙集

內傷門

內傷

傷食

調補脾胃

卷之四

風門

破傷風

胃風

痛風

脈節痛

肩背痛

痺

癘風

血風瘡

身上虛痒

癰疹

卷之五

寒門

咳嗽

肺痿

肺癰

霍亂

卷之六

暑門

丁集

瘧

痢

卷之七

溼門

痞

泄瀉

卷之八

溼熱門

咳氣

疸

水腫

鼓脹

赤白濁

卷之九

痰門

痰

痰熱

哮喘

喘

惡心

嘔吐

咳逆

翻胃

嘈雜

關格

癰氣

卷之十

痰熱門

瘰癧

癰

卷十二婦人門

經事不調

血痛

附血瘕

血虛

崩中

赤白帶

胎前產後

方訣引用醫書

素問

難經

傷寒論

和劑方

三因方

濟生方

本事方

宣明論方

事親書方

脾胃論方

拔萃方

直指方

癰疽 乳癰 疔瘡 諸瘡

卷之十七

溼鬱門

腰痛

腎痛

疝痛

水腎偏墜

腎囊溼瘡

脚氣

足眼痛

脚轉筋

卷之十八

積門

積聚痞塊

卷之十九

虛損門

發熱

胸中煩熱

虛熱

虛煩不眠

惡寒

面熱面寒

自汗

盜汗

痿

厥

手足十指麻木

勞瘵

補損

諸虛

卷之二十

婦人門^上

經病

崩漏

帶下

婦人門^下

卷之二十一

產前

產後

子嗣

補虛

斷子法

諸病

卷之二十二

小兒門^上

小兒諸病

士集

辛集

卷之二十三

小兒門下

痘瘡

卷之二十四

雜治門

倒倉法

吐法

救急諸方

十危病方

備用藥方

體氣

汗癥

烏髭

駐顏

拾遺雜論

醫論

用藥大畧

製方之法

製造藥法

醫略

丹溪先生墓表辭

丹溪翁傳

丹溪心法附餘卷之二十二

小兒門

小兒諸病九十九

丹溪心法

○乳下小兒常多溼熱食積痰熱傷乳為病大槩肝與脾病多 小兒易怒肝病最多大人亦然肝只是有餘腎只是不足

○小兒初生未經食乳急取甘草一寸火上炙熟細切置地上出火毒一時許用水一小盞熬去三分之一去滓用新綿蘸滴兒口中令嚙盡須臾吐痰及瘀血方與乳食年長知膚無病

○小兒急慢驚風發熱口禁手心伏熱痰熱咳嗽痰喘此類證並用湧法吐之重劑芩蒂散輕劑用苦參赤小豆末須蝦蟇汁調服之後用通聖散為末蜜丸服間以桑樹上牛兒陰乾焙末調服以平其急

驚有二證 一者熱痰主急驚當吐瀉之 一者脾虛乃為慢驚所以多死當養脾 急驚只用降火化痰養血 慢驚者先寔脾吐後散風邪只用硃砂安神丸更於血藥中求之

○小兒驚然無故大叫作發者必死是火大發則虛其氣故也

入方黑龍丸 治小兒急慢驚風

牛膽南星一兩青礞石煅硝等分天竺黃半兩青黛半兩盧薈二錢辰砂三錢殭蠶半兩蜈蚣一條存性

右為末甘草煎膏丸如雞頭大每服一二丸急驚煎薑蜜薄荷湯下慢驚煎桔梗白木湯下

治驚而有熱者 人參 茯苓 白芍酒炒 白木 右咬咀薑煎夏月加黃連生甘草竹葉

通聖散見痘疹類 朱砂安神丸見驚悸類 芩蒂散見痘類 疳病或肚大筋青

胡黃連丸 治疳病腹大 胡黃連半錢去果積子阿魏一錢半醋神麴二錢去食積積麝香四粒炒黃連二錢去熱積積

右為末豬膽汁丸如黍米大每服二三丸白木湯送下 又云胡黃連丸十二粒白木湯下 足本丹溪心法附餘 卷二十二 小兒門 泥江海左書局印行

五積丸 治小兒諸般疳積 丑頭末一兩 黃連半兩 陳皮一兩 青皮半兩 山查半兩

右炒焦黑色為末每用已豆霜半錢前藥末半錢宿蒸餅丸麻子大小兒二歲十九五更薑湯下至天明大便泄為度溫粥補之未利再服三五丸

烏犀丸 丑頭末三兩 青皮三兩 史君子肉半錢 白蘞薹半錢 鶴虱錢五 蘆薹一錢 燒紅 苦練根皮五錢

右炒令焦黑色為末麴丸麻子大每三五十丸米飲送下食前量小兒大小加減

黃龍丸 三稜三兩 黑角莪術三兩 青皮一兩 山查肉半錢 乾薑半錢

右用麴丸麻子大日曬乾食後薑湯下量兒大小加減 ○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積 蘆薹半兩 胡黃連三錢 炒麴四錢 黃連半兩 山查半兩 燕薹炒二錢

右為末蘆薹和勻猪膽汁如粟米大每六十丸食前米飲下

疳黃積食 白朮 黃連 苦參 山查 右為末麴丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱重蒸 白朮一兩 半夏半兩 黃連半兩 平胃散 右用粥丸食後白湯下二十丸

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳舖飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆因乳食不

調甘肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生延及歲月五疳病成甚者胸陷喘噦乳

食直瀉腫滿不利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面槁色夭骨露莖張腹硬不食者皆危篤

矣凡此等類盧扁復生難施其巧

○子熱 炒芍藥 香附 滑石一兩 甘草三錢 黃連二錢 右作四服水一盞半生薑三片煎乳母服

○風痰 南星一兩 切用白礬末半兩 水白附子二兩

右為末飛白麴糊丸如芡實大每服一二十丸薑蜜薄荷湯化下

白附丸 牛膽南星一兩 須用黃牯牛胆臘月粉南星親手修大陳半夏半兩 粉白南星一兩 切作片用臘月

桂白礬半錢 右為末宿蒸餅丸如梧桐子大用薑汁蜜湯送下有熱加薄荷葉

紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合 黑椒四十九粒浸透去皮研如泥次入 人言錢一鵝管石錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熟物服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲食所傷 宜白木上 陳皮中 青皮中 山查中 神麴炒 砂仁下 麥蘖 甘草 受寒痛者加藿香 吳茱萸 有熱加黃芩水煎服

○小兒腹脹 薤藷子蒸 紫蘇 乾葛 陳皮 等分 甘草減半 食減者加白木煎服 小兒好喫糗成腹脹疼用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹 茯苓皮 陳皮 赤小豆 薤藷子炒 木通各半 木香分二 甘草 右咬咀薑一片煎服 ○小兒吐瀉黃疸 三稜中 莪朮中 青皮中 陳皮上 神麴炒 茯苓上 麥蘖下 黃連下 甘草下 白朮上

右為末調服 傷乳食吐瀉如山查 時氣吐瀉加滑石 發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜加蘇合香丸名萬安膏用米湯化下 ○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾 黃連下 黃芩下 陳皮上 甘草中 右以水煎服 赤痢加紅花桃仁 白痢加滑石末 又方 治小兒食積痢 炒神麴中 蒼朮中 滑石中 白芍上 黃芩中 白朮上 甘草炙 陳皮下

右咬咀水煎下保和丸 一方加茯苓 ○小兒黑斑紅斑瘡痒癰疹並宜用防風通聖散為末調服

○小兒口瘡 戴云謂滿口生瘡者便是 江茶 粉草 右為末敷之 一方用黃丹一錢炒過傳之

又方 苦參 黃丹各二錢 五倍子錢二 青黛錢一 右等分為末敷之

又方 青黛錢二 芒硝錢一 右為末敷口中吐嚙俱宜

又方 黃柏錢二 細辛錢三 青鹽錢五 右等分為末嚙之吐出涎不過三日愈亦治大人

治胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

龜胸

蒼朮

中酒柏中酒芍藥上陳皮上

防風

中威靈仙下

山查

中當歸上

痢後加生

中水煎服

○小兒夜啼此是邪熱乘心

黃連

薑汁炒一錢半

甘草

五分

右用竹葉二十片煎服

又方 加人參二錢半作二服入薑一片煎

又法夜啼不止潛取捕雞窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛

戴云脫肛者大腸脫下之說

脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收

上之說 或云潰爛陰丸脫出

入方

木通

甘草

黃連

炒當歸

黃芩

右以水煎服

又方

治脫肛

用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方

治脫囊

紫蘇葉莖為末如爛乾傳如未傳用香油調鵝翎刷

又用青荷葉包上

○小兒木舌

戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二者皆是熱病

入方

百草霜

芒硝

滑石

右為末酒調傳之

重舌用好膽礬研細傳之

○咯血

戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血同

又方

黑豆

甘草

陳皮

右水煎食後服

○小兒尿血

甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥冒氣熱故也

入方

軟石膏

黃芩

陳皮

茯苓

白朮

甘草

右用水煎服

又方

膩粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出立瘥

○小兒解顱乃是母氣虛熱多耳

戴云即小兒初生小兒頭二骨未合而開者

入方 四君子與四物子母皆可服 有熱加酒炒黃芩黃連生甘草煎服外用帛束緊用白欬末傳之

○小兒吐蛇蟲

以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蛇多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香二粒

錢氏白朮散

藿香

白朮

木香

白茯苓

甘草

人參

各一錢

葛二錢

右為末每一錢至二錢水煎服

○小兒口噤 治法用搐鼻 鬱金 藜蘆 瓜蒂 右為末水調搗

○小兒禿頭 用白炭燒紅碎長流水令熱洗之內又服酒製通聖散除大黃而用酒炒入研為末再用酒拌

乾每服一錢水煎頻服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾即梁上反塵黃連白礬為末油調傳

又方 松樹厚皮二兩反燒黃丹二兩水飛寒水石細研白礬枯黃連大黃各半白膠香二兩輕粉四錢或

右為末熬熱油調傳瘡上須先洗了瘡加傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証 松皮反燒白膠香 枯礬 大黃 黃柏 右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡 臘猪油半生雄黃 水銀等分 右研和勻洗淨傳瘡上

又方 川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮兩半 酒白朮 酒當歸半 酒天麻 蒼朮 蒼耳半錢 酒柏

酒粉草錢四 防風錢三 右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單治頭瘡 松樹皮厚者燒白膠香熱沸傾石黃丹一兩白礬火飛黃芩 黃連 大黃各二錢 蛇床子

寒水石錢三白芷 無名異炒少木香痛者用輕粉 右為末細末熬熱油調敷瘡上須洗淨瘡去加傳之佳

又小兒瘡 猪牙皂角皮去胡椒 枯礬 輕粉 右為末樟腦燭油搽七日如櫻桃膿窠者去椒搽之

○小兒臍腫汁出 用枯白礬末傳或黃柏為末傳之

又小兒臍不乾 伏龍肝塗 或用枯礬煨過白龍骨等分為末傳之

○小兒天火丹臍腹起者赤溜不妨 蚯蚓泥炒調傳

○小兒赤溜 主熱傷血 用生芋木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患處芒硝濃煎汁洗之

又方 雞子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡 黃連 枯白礬 右為末傳之

○小兒鼻赤 雄黃 黃丹 右同為末無根水調傳之 又蒼耳葉酒蒸焙乾為末調服最解食毒

又鼻下一道赤者名曰鼷以黃連末傳之

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止 辛夷葉一兩洗淨焙乾 木通 白芷各半 杏仁一兩去皮研如泥 木香半兩

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻塗顙門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸是胎毒散也

○乳兒癰疾痞塊 川芎錢二 生苳 白芍半錢 陳皮 半夏 炒苓錢一 甘草分二

右作一服薑三片熟煎下甲末半錢

附諸方

釀乳方 楊氏方 解胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉半兩 猪苓 赤茯苓 天花粉 茵陳 甘草各一兩 生地黃兩二

右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母搜去宿乳却服

生地黃湯 楊氏方 治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此胎黃之候

皆因母受熱而得於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與此兒服

生乾地黃 當歸 赤芍藥 川芎 天花粉各等分 右咬咀每服五錢水一盞煎服

當歸散 楊氏方 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊病並皆治

之 當歸剉碎 黃耆蜜炙 細辛 黃芩 龍骨細研 桂心 赤芍藥各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

鈎藤膏 楊氏方 治內吊腹疼 沒藥 乳香各三錢 木香 薑黃各四錢 木鱉十一箇

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑收沙罐內量兒大小加減煎鈎藤湯化下次服魏香散

魏香散 錢氏方 蓬莪朮半兩 真阿魏一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服一字煎紫蘇米飲空心調下

胎寒傷氣痛 楊氏方

方用沒藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水一盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

茴香散 宣明方 治小兒盤腸氣痛 茴香 炒木香 黑附子 金鈴子 去核用皮 蘿蔔子 炒 枳榔 破故紙 炒

白豆蔻 煨各等分 右咬咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散 經濟方 治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川練子 二箇去皮核用已豆十五粒去皮同炒令豆黃去豆不用 木香 黃史君子肉 延胡索 茴香 各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調脾胃進飲食

丁香 檀香 木香 白豆蔻砂仁 各四錢 藿香 甘草 各八分 沉香 三錢 陳皮 四錢

右為末研細用鹽湯調不拘時候 ○臍風撮口 新增

附諸方

宣風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫 全蠍 二十一箇頭尾全者去毒用好酒塗炙為末 麝香 一字別研

右同和為細末用半字金銀煎湯調下

辰砂礪蠶散 治小兒臍風撮口 辰砂 白礪蠶 直者去絲炒一錢 蛇蛻皮 一錢 麝香 半錢別研

右為細末少許用蜜調傳唇口

治撮口 張氏方 治小兒斷臍為風溼所乘或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘急啼聲不出名曰撮口並皆治

之 赤脚金頭蜈蚣 一枚 蝎稍 四尾 礪蠶 七箇 瞿麥 半錢

右為末先將鵝毛管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之

定命散 陳氏方 治因剪臍傷於風溼致令唇青撮口 赤脚蜈蚣 半條酒炙 川烏頭 生三箇 麝香 少許別研

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口 楊氏方 用白殭蠶為末蜜調塗口唇內即瘥 白殭蠶要自死者

治撮口 聖惠方 用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

一方 取活蝎尾一箇 江南名 裝內硃砂細末不拘多少亦入瓶內封口食砂月餘取出其身赤色陰乾為細末每服一二分酒下大效

一方 用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎稍七箇共為極細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之用厚衣包裹須臾小兒冷汗出愈

一方 小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺破一二處入麝香末少許灸三炷後無臍風

又方 同前 珍珠 四十九粒 白礬 飛 蛤粉 黃丹 血竭 各五 棗貓兒 飛 蟲青 灰色 菓子 大頭上有兩角

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚五六寸處先用軟線綰住却於線外將臍咬斷片時去線待血流盡用鵝翎管送藥二分入臍大孔內 近肚處臍有三孔一孔大 以手指輕輕揉散艾灸臍頭三炷結作臍胎軟帛腰裹切勿可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失一又云臍硬直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方 兒初生七日若有臍風必須發出青筋一道行至肚却生兩岔待行至心不治必死知者常視其青筋初發速照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上截灸六炷青筋自消兒必活矣

一方 小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其死而無救良可憫哉一秘法極有神驗世間知之凡兒患此者齒齬之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿裹手指輕輕擦破即開口便安不用服藥

附諸方

保命散 治小兒鵝口 白礬 飛 馬牙硝 錢五 朱砂 一錢 右為細末每用一字取白鷄真以水攪取汁調塗

舌上領頰內未用藥時先以手指纏亂頭髮揩舌上拭舌上垢然後用藥傳之

藥

○鵝口口瘡新增

此方試誤，需安元整印，請功同。 www.e1ong500k.com