

傷寒論類方

張道坤
記



傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯

一

桂枝三兩去皮芍藥兩甘草二兩生薑兩大棗十二枚擘

右五味㕮咀以水七升微火煮去三升去滓過寒溫

服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力

桂枝本不能發汗故須助以熱粥內經云穀入於胃以動榮氣衛傳於肺肺主皮毛汗所從出散粥充胃氣以達於肺也

觀此可知傷寒不禁食矣溫覆令一時許遍身漸熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病不必除若如水流漓則邪仍在

若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令

三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至二三劑桂枝湯全科謂之一劑三分之一謂之一服古一兩今二錢零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢零一服不過如此一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見服藥得效者反令多服無效者即

禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物

疑藥誤

又復易方無往不誤矣

風在外故陽脉浮衛氣有

以收之甘草

以緩之

桂枝之辛以散之

風為陽邪故發散

桂枝之辛以散之酸

太陽中風陽浮而陰弱

風在外故陽脉浮衛氣有

以收之甘草

以緩之

桂枝之辛以散之

風為陽邪故發散

陽相近故畧有兼病但不甚耳

桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風者

桂枝湯主之

此桂枝

湯總症

陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法

誤治若不上衝者不可與之

桂枝發表若不上衝則其邪已下陷變病不

當隨宜施治論中誤治諸法詳觀自明

此非誤治因風邪凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛

湯則愈而在經刺之以洩經氣風府一穴在頂上入髮際一寸大筋內宛宛中督脈陽維之會也刺入四分留三呼風池二穴在顴額後髮際陽者

太陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯病雖過期

中足少陽陽維之會針入三分留三呼

太陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯病雖過期

傷寒論類方

桂枝法
陽仍不離
而後下也

太陽病外症未解者不可下也

此禁下總誤

下之為逆欲解外者宜服

言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

須解外則愈宜服脉浮而下此為誤下後仍浮則邪不因誤下而入仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也

和者外不諳以衛氣不共榮氣和諳故爾調和之和故又申言之

以榮行脈中衛行脈外復發其汗榮

桂枝湯

衛和則愈宜桂枝湯

自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正

病嘗自汗出者此謂榮氣和榮氣

時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也先其時之時發汗則愈宜桂枝湯主之

無他病太陽諸症不必

用桂枝湯

傷寒不大便六七日之候頭痛有熱者未可與承氣湯

按未可二字從金匱增入傷寒論失此

症必致

其小便清者知不在裡仍在表也

裡有熱當須發汗若頭痛者必衄

汗出而頭痛未解則

宜桂枝湯

傷寒醫下之續得下利清穀

不止裏身疼痛者表急當救裡而救裡為急傷寒論不可下篇云誤下寒多者便清穀熱多者便膿血

後身疼痛清便自調者急當救表

清穀已止疼痛未除仍從表治蓋凡病皆當先表後裡惟下利清穀則

以扶陽為急而表症為緩也表裡分治而序不亂後人以一方治數

兩誤

救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯

太陽病發熱汗出者此謂榮弱衛強故使汗出欲救邪風者宜

桂枝湯

陽明病脉遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方

桂枝湯

桂枝為驅風聖藥

多汗而猶惡寒則仍在太陽

太陰病脉浮者可發汗宜桂枝湯

太陰本無汗法因其脈獨浮則邪仍

矣雖陽明病而治從太陽

在表故亦用桂枝從脉不從症也

人煩熱汗出則解又如瘧狀

陽明本自多汗但

桂枝湯

桂枝為驅風聖藥

此時

日晡所發熱者屬陽明也之潮熱而非瘧矣

虛浮者宜發汗一症而治法迥別全以脉為

不惡寒而惡熱今

症之法此亦從脉而不從症之法

病

先溫其裏乃攻其表溫裡宜四逆湯攻表宜桂枝湯

此節屬厥陰症未必由誤治

不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之

桂枝法輕其劑而加減之可也

桂枝湯

傷寒大下後復發汗

再誤心

傷寒大下後復發汗

得然既見表症亦宜兼治

下痞邪入中焦惡寒者。表未解也。不可攻痞。當先解表。表解乃可攻痞。解表宜桂枝湯。攻痞宜大黃黃連湯。

湯法詳見後

桂枝加附子湯二

桂枝湯原方加附子

一枚皮破八片泡去

太陽病發汗遂漏不止。此發汗太過如水流。或藥不對症之故其人惡風中風本惡風汗後當愈今小便難少。四肢急難以屈伸。四肢為諸陽之本急難屈伸乃津脫陽虛之象但不至亡陽耳若更甚而厥冷惡寒則有陽脫之慮當用四逆湯矣

桂枝加桂湯三

桂枝原方加桂二兩即另立湯名治症迥別古聖立方之嚴如此

桂枝原方加桂

二兩

右五味以水七升煮取三升去渣溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒復感寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯。云各一壯不止一針故

與桂枝加桂湯重加桂枝不特禦寒且制腎氣又藥味重則能達下凡奔豚症此方可增減用之

桂枝去芍藥湯四

桂枝湯原方去芍藥

右四味以水七升煮取三升溫服一升。

桂枝去芍藥加附子湯五

即前方加附子一枚泡去皮破八片

餘依前法

太陽病下之後脉促胸滿者

中虛而表邪仍在

桂枝去芍藥湯主之

太陽之邪未盡故用桂枝下後傷陰不宜更用涼藥

若微惡寒者去芍藥方中加附子湯主之

微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯六

桂枝湯原方加厚朴

二兩去皮

杏仁五十

右七味以水七升微火煮取三升溫服一升。覆取微似汗。

桂枝湯

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳。本經杏仁主咳逆上氣。太陽病下之危喘者。表未解故也。此湯主之。前乃本然之喘。此乃誤下之喘。因殊而法一。

小建中湯

桂枝湯原方加膠飴一升

右六味以水七升煮去三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脉濇陰脉弦。中宮之陽氣虛則木來。法當腹中急痛先與小建中湯。以助中宮。不差者與小柴胡湯主之。治太陰不愈變而治少陽所以陳

傷寒二三日心中悸而煩者。小建中湯主之。煩可知故用建中湯以補心脾之氣。蓋梔子湯治有熱之虛煩。此治無熱之虛煩也。

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩。加人參三兩。右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升。以

多煎為妙。取其味厚入陰也。

發汗後身疼痛盡。脉沉遲已甚。此湯主之。邪未盡宜表而氣虛不能勝散藥故。用人參凡素體虛而過汗者方可用。

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服。此以一劑為一服者。

辨地則用真武湯矣。一症而輕重不同用方迥異其義精矣。

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤

桂枝四兩

甘草二兩

大棗十二枚擘

右四味以甘爛水一斗。以水二斗搗之萬遍取用。按甘

先

煮茯苓凡方中專重之藥法必先煮減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是擾胸中之陽臍下除則因發汗太過上焦乾

涸腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以制奔豚乾

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六銖去皮芍藥 生薑

甘草炙去節各一兩

大棗四枚

杏仁二十四枚去皮及雙仁者

右七味

以水

五升先煮麻黃一二沸去上沫欲去沫故先煮

納諸藥煮取一升八合減去三之一

去滓溫服六合一云桂枝湯三

合麻黃湯三合頓服將患如上法

太陽病得之八九日

經遇

如虛狀發熱惡寒熱多寒少邪已其人不嘔

非少陽漸輕已

清便欲自可無裏熱

一日二三度

發非癰象

脉微緩者不浮不沉不大為欲愈也

餘邪欲退之象

脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也

此三句中明上文欲愈之故蓋由病氣雖除而正氣亦衰當靜以養之使胃氣漸充則

榮衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增醫者不審誤人多矣

面有熱色則以其不得小汗出身必痒宜服微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗足

方分兩甚輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分

三服祇服四服零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

按此

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七銖去皮

芍藥一兩六銖

杏仁十六枚去皮尖

麻黃十六銖去節

甘草一兩二銖

生薑六銖

大棗五枚

右七味以水五升

先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升合為三升分再服

桂枝湯大汗出脉洪大者

汗雖出而邪未盡

與桂枝湯如前法

此所謂邪不盡行復如法者也

若形如癰日再發者汗出必解

桂枝二麻黃一湯主之

此與麻黃桂枝各半湯意畧同但此因大汗出之後故桂枝畧重而麻黃畧輕

桂枝二越婢一湯十三

桂枝湯加麻黃石羔二味

桂枝去皮 芍藥

甘草

麻黃去節各十八昧

大棗一枚

生薑二兩

右七味以水五升
石

甘草二兩

石

石

右七味以水五升
石

右七味以水五升
石

甘草二兩

石

石

煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取二升去渣溫服一升

附越婢方

麻黃六兩

甘草二兩

石

桂枝半助 生薑三兩

大棗十五枚

甘草二兩

石

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗蓋其人本非壯盛而邪氣亦輕故身有寒熱而脉微弱若發其汗必至有手冒心臍下悸等症故以此湯清陳榮衛令得似汗而解况熱多寒少熱在氣分尤與石羔為宜古聖用藥之審如此
按以上三方所謂一二各半之說照方計算並不對準未何說或云將本方各煎或一分或二分相和服此亦一法但方中又各藥注明分兩則何也考存

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四

芍藥三兩

甘草

生薑二兩

茯苓

白朮各三兩

大棗十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服一升小便利則愈此方專於利小便也

服桂枝湯或下之仍頭頂強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者此湯主之頭痛發熱桂枝症仍宜更用桂枝心下滿則用白朮小便不利則用茯苓此症乃亡津液而有停飲者也
在也以其無汗則不當佐使之藥若去其君藥則另立方名今去桂枝而仍以桂枝為名所不可解殆以此方雖去桂枝而意仍不離乎桂枝也

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五

桂枝湯原方去芍藥加蜀漆去腥

牡蠣五兩

龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

納諸藥煮取三升去滓溫服一升

傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂以火劫其胸中之陽起卧不安者此湯主之此與少陰汗出之亡陽迥別蓋用四逆輩回其陽於腎中今乃以火逼汗亡其陽中之陽故有至理不可易也去芍藥因陽虛不復助陰也蜀漆去心服邪積龍骨牡蠣治驚癇熱氣

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝去皮甘草

二兩

牡蠣熬二兩

龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

脈浮宜以汗解此治脉下微重而痹

則陰氣獨治於火逆下之又誤

用火灸之誤

火反病從腰以下必重而痹名火逆也火氣

主之鎮其陰氣散其火邪上下同治前方驚狂治重在心故

用蜀漆此無驚狂象故蜀漆不用其症藥大段相同

桂枝加葛根湯十七

火逆下之治

因燒針煩躁者

更誤治下之虛其陰燒針又益

桂枝甘草龍骨牡蠣湯有麻黃則為葛根湯矣

此湯成無已本有麻黃非

桂枝加芍藥湯十八

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強八八伸頸之象邪

氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯十八

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同

右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫納

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症

而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症

而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症

而法不離乎桂枝

桂枝湯類二

桂枝湯類二

麻黃三兩去節桂枝二兩去皮甘草一兩炙杏仁七十個去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升

此須多煮取其力轉不僅為去上沫

去上沫納諸藥者取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥以其易發汗也餘如桂枝將息法

止煮二沸矣去上沫納諸藥者取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥以其易發汗也餘如桂枝將息法活人書云夏至後用麻黃湯量加知母石

羔黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之慮

太陽病頭痛發熱身之腰痛骨節疼痛此痛處比桂枝症尤多而

仁治喘桂枝甘草治太陽諸症無一味不繫切所以謂之經方

比桂枝症之症麻黃治無汗杏

喘而胸滿者不可下

病俱在上焦

比桂枝症尤多而

宜麻黃湯主之

喘而胸滿比麻黃症

太陽病十日以去

過脉浮細邪已而

嗜卧者正漸外已解也

設胸滿腸痛者與小柴胡湯邪留少陽故與此湯

此當發其汗宜麻黃湯治

證仍在表證即上文數端

此當發其汗宜麻黃湯治

湯既下不可復汗若汗出而喘無大熱者可與此湯

大青龍湯

三此合麻黃桂枝越婢三方為一方而無芍藥

麻黃六兩去節桂枝二兩

甘草二兩去皮炙

杏仁四十枝去皮尖生薑三兩

大棗十二枚

石膏碎如雞子大一塊

大青龍湯主之若脉微弱

右七味以水九升

湯津液不得兩傷

先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升取微似汗汗出多者溫粉撲之法論中無

溫粉方明理論載白朮蕷本川芎白芷各等分入米粉和勾摟之無著本亦得後人用牡蠣麻黃根鈍粉龍骨亦可一服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩燥不得眠也

太陽中風脈浮緊緊為陰脉故發熱惡寒非

惡身疼痛汗不出而煩躁者邪深

大青龍湯主之若脉微弱熱鬱大青龍湯主之若脉微弱

汗出惡風者不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也

惡風乃桂枝症誤服此則汗不止而有亡陽之象矣立此方即垂此戒聖人之意深矣

按此方合麻桂而用石羔何以發汗如是之烈蓋麻黃湯麻黃用二兩而此用六兩越婢湯石羔用半斛而此用雞子大一塊一劑之藥除大棗約共十六兩以今秤計之亦重三兩有餘則發汗之重劑矣雖少加石羔終

不足以相制也少陰篇云脉傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰症者大青龍湯主之沉緊身有輕時為無少陰症不厥利吐逆為無少陰裏症此邪氣俱在外也故以大青龍發其汗按此條必有誤脉浮緩邪輕易散身不疼外邪已退乍有輕時病未入陰又別無少陰等症此病之最輕者何必另有投以青龍險峻之劑此必另有主方而誤以大青龍當之者也

小青龍湯

四

麻黃去節芍藥

細辛

乾薑

甘草

桂枝去皮各

三兩

五味子半兩

半夏半升

湯洗

右八味以

水一斗先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升

若微利者去麻黃加茺花如雞子大熬令赤色

利屬下焦陰分不可更發其陽茺花明理論作茺花恐誤本草茺花茺花

葉相近而茺花不常用當時必不可得故改用茺花以其皆有去水之功也

若渴者去半夏加桔梗根三兩

本草括蒌根主消渴若噎者

古云寒氣相搏則為腸鳴醫

乃不知而反飲冷水令

半夏加附子一枚炮去麻黃加附子一枚炮

本草附子

汗大出水得寒氣冷必相捕其人即餉

按內經無噎字疑即

輕者逆之去麻黃加附子一枚炮

本草附子

若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩

則水小便不在上而在下矣

故用

扶菴無微不至

若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖

杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源邪汗未盡必停於肺胃之間病屬有形非一味發散所能除此方

傷寒表不解發汗心下有水氣即未出之汗乾嘔發熱而咳或渴或痢或噎或小便不利少腹滿或喘者小青龍湯主之以上皆水停心下現症其傷寒心下有水氣欲而微喘發熱不渴凡水停心下服湯已即小青龍湯主之欲解也欲去小青龍湯主之謂欲解之後更服小青龍湯也

麻黃附子細辛湯

五

麻黃去節細辛二兩附子一枚

右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升日

少陰病始得之反發熱脉沉者此湯主之少陰病三字所該者廣必從少陰諸現症細細詳審然後反發必俟其脉象之沉然後益知其為少陰無疑也凡審症皆當如此附子細辛為少陰溫陽明之發熱耶又入之用麻黃者以其發熱則邪猶連太陽未盡入陰猶可引之外達不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通用亦能溫裏故陰經諸藥皆用之麻黃則專於發表今欲散少陰始入之邪非麻黃不可況已有附子足以溫少陰之經矣

麻黃附子甘草湯

六

麻黃二兩甘草炙二兩附子一枚

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸少煮

此當去上沫納諸藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸少煮

去上沫納諸藥煮取三升

此當

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也三陰經惟少陰與太陽為解之理况二三日而無裏症則其邪未深入

此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也

葛根湯類

三

此即桂枝湯加麻

葛根湯一

葛根四兩桂枝二兩芍藥三兩生薑三兩甘草二兩

葛根湯一

葛根四兩桂枝二兩芍藥三兩生薑三兩甘草二兩

此切

葛根大棗十二

桂枝二兩大棗十二

右七味以水一斗先煮麻

黃葛根

主藥先煮減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥汗矣

餘如桂枝法將息及禁忌

太陽病項背強几無汗惡風

葛根湯主之

前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也

惡風則未全入陽明故曰太陽病

按葛根本草治身大熱乃陽明之証也以太陽將入陽明之經故加此藥

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之也

合病全在下利一症上審出盜風邪入胃則下利矣

葛根黃芩黃連湯

葛根半劑

甘草二兩

黃芩三兩

黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去渣分溫再服

葛根湯類四

葛根湯原方

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

太陽病桂枝症

桂枝症即太陽傷風之正病也醫反下之

誤利遂不止邪下陷則脉促者表未解也

促有數意邪猶在外

尚未陷入三陰而見

但嘔者葛根加

葛根一昧以解陽

葛根湯隨病

葛根湯隨病

沈微等象故不喘而汗出者此湯主之

因表未解故用葛根固喘汗而利故用芩連之

苦以洩之堅之

芩連甘草為治病之主藥

葛根加半夏湯

葛根湯主之

太陽與陽明合病

不下利知必須從兩經本症一一對勘即不下利而亦可定為合病矣

但嘔者葛根加

葛根一昧以解陽

葛根湯隨病

葛根湯隨病

葛根湯隨病

葛根湯隨病

葛根湯隨病

半夏湯主之

前條太陽誤下而成利則用芩連治利因其本屬桂枝症而脉促故止加葛根湯全方因其但嘔加半夏一味以止嘔隨病

但嘔者葛根加

葛根一昧以解陽

葛根湯隨病

葛根湯隨病

葛根湯隨病

葛根湯隨病

葛根湯隨病

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

柴胡半劑

黃芩

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

柴胡

葛根湯類四

葛根湯主之

葛根湯主之

葛根湯

嘔不嘔不必用半夏。加括薑實一枚。括薑實除胸痹。此若渴者去半夏。半夏能滌痰溼。加人參。

生津合前液

以其能補脾胃加

成四兩半括薑根四兩。湯治消若腹中痛者去黃芩。

苦寒加芍藥三兩。除腹痛。若腹中痞硬去大棗。

以之其能

牡蠣四兩。

別錄云治

脇下痞熱。若心

微熱則

那

溫覆取微似汗愈。

若欲者去人參大棗。

峻非宜

生薑。

去生薑加乾薑故

加五味子。

利小便

若不渴外有微熱去人參。

則津

足自流。

加桂枝三兩。

留太陽

半升乾薑二兩。

古方治嗽

五味子

必同用一以散寒邪一以散正氣從無單用五味治嗽之法後人

多能深求其義則變化心

生矣論中凡可通用之方必有加減法

傷寒五六日。

正當傳少陽之期

中風往來寒熱。

太陽之寒熱寒時亦熱熱時亦

身有微熱。

少陽未盡或發者肺有

或發者。

留飲

此湯主之。

少陽所現之症甚多柴胡湯所治

之症亦不一加減法具載方末

意可推而知矣。

小柴胡湯主之。

木氣

或心下悸。

有病

或胸下痞硬。

真鬱或

或腹中痛。

木氣

或脇下痞硬。

真鬱或

或心下悸。

有病

或胸下痞硬。

</div

實也先宜小柴胡湯以解外

雖潮熱本屬少陽之後

出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便硬脈細者此為陽微結

陽氣不能隨經而散故鬱結不舒非

有表復有理也

以上諸症有表有裡

脉沈亦在裡也

脉細必沈

汗出為陽微

以汗假令純陰結不得復有

外證陰則汗此為半在裡半在表也

以上諸症有表有裡

脉沈為裡

雖沈緊

即有

汗出為表

脉細即有

要今頭汗出故知非少陰也可與小柴胡湯設不了了者得屎而解

得易而不了了者以其有裏症故大便硬必通其大便而後其病可愈其

大柴胡等方是也

陽明病發潮熱大便溏小便自可胸膈滿而不去者小柴胡湯主之

陽明潮熱乃當下之症因太陽

得易而不了了者以其有裏症故大便硬必通其大便而後其病可愈其

此所以下此要訣也

可與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣因和身濶然汗出而解也

按少陽之外為太陽裏為陽明而少陽居其間故少陽之症有兼太陽

陽明病腸下硬滿少陽一症即可用小柴胡湯必能兩顧得效仲景所以獨重此方也

此四句申明小明太陽明中

風脉弦浮大

大屬陽明

而短氣腹都滿脹下及心痛

此少陽症又按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧

似少陰

傷寒五六日頭

面目悉黃小便難似太陰

又有潮熱耳前後脰刺之小差外不解病過

十日脉續浮者與小柴

陽明解

此

胡湯脉浮雖有裏症

脉但浮無餘症者與麻黃湯但浮無餘症則裏症全無必從汗解故用麻黃湯

此

此

此

此

憑無一定法也

吐大下汗出怫鬱復與之水以發其汗因得噦

雲真邪相攻氣并相逆故為

論中陽明篇云陽明病不能食攻其熱必噦所以然者

虛冷二字尤明益陽微噦也又云大

太陽本症

嘔逆也素問云病深者其聲噦乃肺胃之氣隔絕所致兼以腹滿故不治

此為傳經

脅下硬滿乾嘔不能食往來寒熱

以上皆少陽者

之邪也

太陽本症

浮而沈緊則弦之與小柴胡湯

嘔而發熱者小柴胡湯主之明同惟嘔則少陽所獨故亦用此湯

陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脹痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黃湯解見麻

傷寒差以後更發熱者小柴胡主之此復症也非勞復非女勞復乃正氣不充餘邪未盡留在半表半裡

之間故亦用小柴胡復病治法明著於此後世議論不一皆非正治

太

脉浮者以汗解之。脉沉實者，以下解之。
之法不一。醫者於麻黃桂枝及承氣大
等方對症之輕重擇而用之，則無不中。

婦人中風七八日續得寒熱發作有時謂如瘧也。此即下文所經水病矣。柴胡復症之中更當考此二脉。如果脉見浮象則邪留太陽當用汗法。見沈實則裏邪未盡當用下法。但汗下不著切名者因汗下之見沈實則裏邪未盡當用下法。但汗下不著切名者因汗下之。

適斷者此為熱入血室其血未結而感云婦人中風發熱惡寒經水適來彼云

熱結瘀矣。故使如瘧狀發作，有時小柴胡主之。即以治瘧之法治之。

者此為熱入血室也 血室為中焦紫氣
滯則肝氣與心經
二肋端去乳頭約四寸肝募也厥陰陰陰陰陰陰陰陰陰

之氣所聚，則凝而生血。心主血，神主精，則為血精。當刺期門，隨其實而瀉之。期門在乳下第十一肋旁，當刺期門，隨其實而瀉之。

形之症湯劑一時難效刺期門以瀉厥

又云如人傷寒發熱經水過來
陰有餘之熱則尤親切而易散
熱入血室屬陰病在陰經也
血室盡清而夜昏者血室無犯胃氣及上二焦必自愈此為

狀此二條為最詳。婦人傷寒此症最多。

湯刺期門則其治也。按熱入血室之
前條症稍輕後二條尤重男子亦有之

大柴胡湯二
小柴胡去人參甘草加
大黃乃少陽陽明合治
半斤二錢半斤一錢三兩

之方也。三兩一錢，四錢二錢，十二

柴胡半夏黃芩

右七味以水一斗二升

本草方一十七方太陽病過經十餘日反二三

一誤後二三日柴胡症仍在者如寒熱並之類嘔先與小柴胡湯嘔

不止心下急鬱鬱微煩者猶有為未
裏証為未

解也與大柴胡湯下之則愈前雖已下非下法也以大柴胡湯兩解之

熱結在裡之對症復往來寒熱之對症者邪內陷故用枳比陽主之傷寒後

大柴胡湯 傷寒發熱汗出不角柴胡心中痞硬嘔吐而十症更後坐過經之後諸症脈沉沉者內實也沈氏是爲下解之宜大柴胡湯。

柴胡加桂枝湯 三 方乃太陽少陽合

病湯清寒而利全愈也

柴胡四兩
黃芩
人參
桂枝

芍藥 生薑 各一
兩半 半夏 二合半 甘草 一兩 大棗 六枚 右九味

水七升煮取三升去渣温服一升

傷寒十三日不解。胸脇滿而嘔。日晡所發潮熱已而微利。此本柴胡證下之而不得利。今反利者。知醫以丸藥下之。非其治也。潮熱者實也。先宜小柴胡湯以解外。後以柴胡加芒硝湯主之。本草芒硝治六府積聚因其利而復下之

所謂通因通用之法也。潮熱而利則邪不傳結。故較之大柴胡症用藥稍輕邪。

梔子湯類五

梔子豉湯一

梔子十四

香豉四合
桔梗綿裏

右二味水四升。先煮梔子得二升半。納豉煮取升半。去滓分為二服。溫進一

服得吐止後服

此劑分兩藥皆然

發汗吐下後

誤而正氣已傷矣

皆虛煩不得眠。

虛為正氣虛煩為邪氣擾。發汗吐下實邪離去而其餘

者必反覆顛倒心中懊惱。

反覆顛倒身不得寧也

梔子豉湯吐之。

此非汗下之所能除者。吐之而痰涎結氣無不出矣。

按汗吐下之後而邪未盡則不在經而在肺胃之間為有形之物故必吐而出之

反覆顛倒心中懊惱。

摩挲發汗若下之而煩熱胸

寫病狀何等詳切。凡醫者之於病人必事體貼如若身受之而後用藥無誤

中室者煩熱且室較前虛

梔子豉湯主之。

傷寒五六日大下之後誤治身熱不去心中結痛者欲未解也。

內外不失毫釐即上下亦不踰分寸也。

陽明病脉浮而緊咽喎口苦。

胸滿而喘發熱汗出不惡寒反惡

熱身重。

以上皆陽明本症非因誤治而得者若發汗則躁心憤憤反讐語汗多若加燒針必恍恍煩躁不得眠

即前以火逼

意若下之則胃中空虛客氣動膈

心中懊惱。

以前因用三昧未必合度此句乃要訣舌上胎者胎則胸中有物而可用

吐法否則邪尚未結恐無物可吐也

梔子豉湯主之。

陽明病下之其外有熱本虛

手足溫不結胸邪

心中懊惱餓不能

食停結但頭汗出

陽邪在上

梔子豉湯主之。

下利後更煩按之心下濡者濡者濕滯之象

為虛煩也宜

梔子豉湯。