

本草綱目

木部
蟲部
器服部

卷之四
第十一冊

本草綱目木部目錄第三十六卷

木之三 灌木類五十種

桑 本經

柘 嘉祐

奴柘 拾遺

楮 別錄

枳 本經即枳實枳殼

枸橘 綱目

榲 本經 木戟附

酸棗 本經

白棘 本經

雞核 本經

山棗 本經

胡頹子 拾遺即盧都子

金櫻子 蜀本

郁李 本經

鼠李 本經即牛李子

女貞 本經

冬青 綱目

枸骨 綱目

衛矛 本經

山礬 綱目

南燭 開寶

五加 本經

枸杞 本經

搜疏 本經

楊欖 唐本

石南 本經

牡荊 別錄

蔓荊 本經

藥荊 唐本

石荊 拾遺

紫荊 開寶

木槿 日華

扶桑 綱目

木芙蓉 綱目

山茶 綱目

蠟梅 綱目

伏牛花 開寶

密蒙花 開寶

木棉 綱目

柞木 嘉祐

黃楊木 綱目

不凋木 拾遺

賣子木 唐本

木禾蓼 唐本

放杖木 拾遺

接骨木 唐本

靈壽木 拾遺

摠木 拾遺

木麻 拾遺

大空 唐本

右附方舊八十七新二百零七

本草綱目木部第三十六卷

木之三 灌木類五十種

桑 本經中品

釋名 桑，時珍曰：徐鍇說文字解云：桑音若東方自然神木之名，其字象形。桑乃蚕所食，葉之神木，故加木於桑下。而別之典術云：桑乃箕星之精。

集解 頌曰：方書稱桑之功最神，在人資用尤多。爾雅云：桑，辨自甚者，梔又云：女桑，梗桑，壓桑，山桑，郭璞云：辨半也。甚與梔同，一半有梔，一半無梔，名梔俗間呼桑之小，而條長者皆為女桑。其山桑似桑材中弓弩，壓桑絲中琴瑟皆材之美者也。他木鮮及之。時珍曰：桑有數種，有白桑、葉大如掌而厚、難桑、葉花而薄者。桑先梔而後葉，山桑葉大而長，以子種者不若壓條而分者。桑生黃衣謂之金桑，其木必將槁矣。種樹書云：桑以構接則桑大，桑根下埋龜甲則茂盛不蛀。

桑郭璞云：辨半也。甚與梔同，一半有梔，一半無梔，名梔俗間呼桑之小，而條長者皆為女桑。其山桑似桑材中弓弩，壓桑絲中琴瑟皆材之美者也。他木鮮及之。時珍曰：桑有數種，有白桑、葉大如掌而厚、難桑、葉花而薄者。桑先梔而後葉，山桑葉大而長，以子種者不若壓條而分者。桑生黃衣謂之金桑，其木必將槁矣。種樹書云：桑以構接則桑大，桑根下埋龜甲則茂盛不蛀。

桑根白皮 治

別錄 曰：米無時出，土上者殺人。弘景曰：東行桑根乃易得，而江邊多出，土不可輕信。時珍曰：古本草言桑根見地上者名馬額，有毒，殺人。旁行出土者名伏蛇，亦有毒，而治心痛故吳淑事類賦云：伏蛇痛馬額殺人。穀曰：凡使采十年以上，向東畔嫩根，銅刀刮去青黃薄皮，一重裏白皮切焙乾，用其皮中涎勿去之，藥力俱在其上也。忌鐵及鉛或云木之白皮亦可用，煮汁染褐色不落。

氣味甘寒無毒 權曰：平。大明曰：溫。元素曰：苦酸。果曰：甘辛。寒可升，可降，陽中陰也。好古曰：甘厚而辛，薄入手太陰經之木。

主治 傷中五勞六極，羸瘦，胸中絕脈，補虛益氣。去肺中水氣，唾血，熱渴，水腫，腹滿，腫脹，利水道，去寸白，可以

縫金瘡 別錄：治肺氣喘滿，虛勞客熱，頭痛，內補不足。煮汁飲，利五臟，入散用下一切風氣，水氣。

調中下氣消痰止渴開胃下食殺腹臟 時珍曰：桑白皮甘以固元氣之不足，而補虛辛以瀉肺氣之有餘，而止嗽又

蟲止霍亂吐瀉，研汁治小兒天吊驚癇，客忤及傳，我口瘡大驗。明：瀉肺利大小腸，降氣散血。

云：桑白皮瀉肺然性不純良，不宜多用。時珍曰：桑白皮長於利小水，乃寒則瀉其子也。故肺中有水氣及肺火有餘者，宜之。十劑云：燥可去濕，桑白皮赤小豆之屬是矣。宋醫錢乙治肺氣熱甚，欬嗽而後喘，面腫身熱，瀉白散用桑白皮炒一兩，地骨皮焙一兩，甘草沙半兩，每服一二錢，入粳米百粒，水煎食後溫服。桑白皮地骨皮皆能瀉火，從小便去，甘草瀉火而緩中，粳米清肺而養血，此乃瀉肺諸方之準繩也。元醫羅天益言其瀉肺中伏火而補正氣，瀉邪所以補正也。若肺虛而小便利者，不宜用之。頌曰：桑根白皮作線縫金瘡，腸出更以熱

雞血塗之唐安金藏

剖腹用此法而愈

附方 新八 效嗽吐血

甚者殷鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿刮去黃皮剉細入糯米四兩焙乾為末每服一錢米飲下 經驗方

消渴尿多

入地三尺桑根剉取白皮炙黃黑剉以水煮濃汁隨意飲

之亦可入少米勿

用鹽 肘后方

產後下血

炙桑白皮煮水飲之 肘后方

血露不絕

鋸截桑根取屑五指撮以酒酒服之日三服 肘后方

墜馬拗損

桑根白皮五斤為末一升煎膏傳之便止已後亦無宿血終不發動 經驗后方

金刃瘡傷

新桑白皮燒灰和馬糞塗瘡上敷易之亦可煮汁服之 廣利方

雜物眯眼

新桑根皮洗淨搥爛入眼擦之自出 聖惠方

髮鬢墮落

桑白皮剉三升以水淹浸煮五六沸去滓頻頻洗沐自不落也 聖惠方

髮槁不澤

桑根白皮柏葉各一斤剪汁沐之潤 聖惠方

小兒重舌

桑根白皮煮汁塗乳上飲之 子母秘錄

小兒流涎

脾熱也胸膈有痰新桑根白皮搗自煎汁塗之甚效乾者煎水 聖惠方

小兒天弔

驚癇客忤家桑東行根取研汁服 聖惠方

小兒火丹

桑根白皮煮汁浴之或為末羊膏和塗之 千金方

石癰堅硬

不作膿者蜀桑白皮陰乾為末煖膠和酒調傳以軟為度 千金方

皮中白汁

主治 小兒口瘡白漫拭淨塗之便愈又塗金刀所傷瘰癧瘻火血止仍以白皮裹之甚良

新 塗蛇蜈蚣蜘蛛傷有效

取枝燒漚治大風瘡疥生眉髮

時珍 附方 新三

小兒鵝口

桑皮汁和胡粉塗之 子母秘錄

小兒唇腫

桑木汁塗之即愈 聖惠方

解百毒氣

桑白汁一合服之須臾吐利自出 肘后方

傷中風

桑憑好酒對和溫服以醉為度醒服消風散 摘玄方

桑椹

一名丈武定

主治 量食止消渴

蘇 利五臟

經節痛血氣久服不飢安魂鎮神令人聰明變白不老多收暴乾為末蜜丸日服

飲解中酒毒釀酒服利水氣消腫

時珍 發明

宗爽曰本經言桑其詳然獨遺烏椹桑之精英盡在於此采摘微研以布濾汁石器熬成稀膏量多少入蜜熬稠貯瓷器中每抄一二錢食之夜臥以沸湯點服治服金石發熱口渴渴生精神

及小腸熱其性微涼故也仙方日乾為末蜜和為丸酒服亦良時珍曰椹有烏白二種楊氏產乳云孩子不得與桑椹令兒心寒而陸機詩疏云鳩食桑椹多則醉傷其性何耶四時月令云四月宜飲桑椹酒能理百種風毒其法用椹汁三斗重湯煮至一斗半入白蜜二合酥油一兩生薑一合煮令得所瓶收每服一合和酒飲之亦可以汁熬燒酒藏之經年味力愈佳史言魏武帝軍乏食得乾椹以濟飢金末太荒民皆食椹獲活者不可勝計則椹之乾濕皆可救荒平時不可不收采也

附方 新六

水腫脹滿

水不

滿溢水下則虛竭還服十無一活宜用桑椹酒治之桑心皮切以水二斗煮汁一斗入桑椹再者取五升以糯飯五升釀酒飲 **瘰癧結核** 文武膏用文武實即桑椹子二斗黑熟者以布取汁

硬咽 紅椹子細嚼先嚥汁后嚥津新 **小兒赤痢** 桑椹取汁頻服 **小兒白痢** 黑椹入罌中曝三七日化為水洗之三七日神效 **拔白髮** 黑椹一斤料料一斤瓶盛封開縣屋東頭一百

日盡化為黑泥以染白 **髮白生** 黑熟桑葉水浸日晒擦塗 **陰證腹痛** 桑椹絹包風乾過伏天為末每服三錢熱酒下取汁 集簡方

葉氣味苦甘寒有小毒 天明曰家桑葉煖無毒 **主治除寒熱出汗** **汁解蜈蚣毒** **煎濃汁服能除脚氣水腫利大小腸** **炙熟煎飲代茶止渴**

煎飲利五臟通關節下氣嫩葉煎酒服治一切風寒熱搏暑風痛出汗并撲損瘀血接爛塗蛇蟲傷 **研汁治金瘡及小兒吻瘡煎汁**

服止霍亂腹痛吐下亦可以乾葉煮之雞桑葉煮汁熬膏服去老風及宿血 **治湯熱效嗽明目長髮** **發明** 時 **珍** 食方以四月桑茂盛時米

葉又十月霜後三分二分已落時一分在者名神仙葉即米取與前葉同除乾搗末丸散任服或煎水代茶飲之又霜後葉煮湯淋渌手足去風痺殊勝又微炙和桑衣煎服治痢及金瘡諸損傷止血震亨白經霜桑葉研末米飲服止盜汗時珍曰桑葉乃手足陽明之藥汁

前代若能 **附方** **舊二新** **青盲洗法** 昔武勝軍宋仲孚患此二十年用此法二年目明如故新研青桑葉焙乾逐月按日就地上燒存性每以一合於瓷器內煎減二分傾出澄清溫熱洗目至百度常試有驗正月初八二月初八三月初六四

月初四五月初六月初七月初八月初九月 **風眼下垂** 臘月不落桑葉煎湯日日 **赤眼淫痛** 桑葉為末紙卷燒煙熏鼻 **頭髮不**

長 桑葉麻葉煮泔水沐之七 **吐血不止** 晚桑葉焙研涼茶服三錢只一服 **小兒渴疾** 桑葉不拘多少逐片染生蜜綿系帶上 **霍亂轉筋** 入

煩悶桑葉一握煎飲一 **大腸脫肛** 黃皮桑樹葉三升水煎過用 **肺毒風瘡** 狀如大風綠雲散用好桑葉洗淨蒸熟一 **癰口不斂** 經霜黃桑

二服立定 **聖惠方** **仁齋直指方** **宿日乾為末水調二錢七服** **經驗方** **之直** **穿掌腫毒** 新桑葉研爛膏之 **湯火傷瘡** 經霜桑葉燒存性為末油和 **手足麻木** 不知痛痒霜降後桑葉 **指方** 即愈 通玄論 傳之三曰愈 醫學正傳 煎湯頻洗 急救方

枝氣味苦平治偏體風痺乾燥水氣脚氣風氣四肢拘攣上氣眼運肺氣欬嗽消食利小便久服輕身聰明耳目令人光澤瘡口乾

及癰疽後渴用嫩條細切一升熬香煎飲亦無禁忌受服終身不患偏風

蘇頌○出近效方名桑枝煎一法用乾桑枝寸對炒香良器煮減一半再入銀器重湯熬減一半或入少蜜亦可

發明

頌曰桑枝不冷不熱可以常服抱朴子言仙經云一切仙藥不得桑煎不服時珍曰煎藥用桑者取其能利關節除風寒濕痺諸痛也觀

靈樞經治寒痺內熱用桂酒法以桑炭炙布巾熨痺處治口僻用馬膏法以桑鈎鈎其口及坐桑灰上皆取此意也又癰疽發背不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡瘰癧流注腫瘡頑瘡惡瘡久不愈者用桑木炙法未潰則拔毒止痛已潰則補接陽氣亦取桑通關節去風寒火性暢達出鬱毒之意其法以乾桑木劈成細片繫作小把然火吹息炙患處每吹炙片時以瘀肉腐動為度內服補托藥誠良方也又按

趙潛養疴漫筆云越州一學錄少年苦嗽百藥不效或令用南向桑桑條一束每條寸折納鍋中以水五盞煎至一盞盛瓦器中渴即飲之服一月而愈此亦桑枝變煎法耳

附方舊一服食變白

久服通血氣利五臟雜桑嫩枝陰乾為末蜜和作丸每日

酒服六十丸

水氣脚氣

桑條二兩炒香以水一升煎二合每日空心服之無忌

聖濟總錄

風熱臂痛

桑枝一小升切炒水三升煎二升一日服盡許叔微云常病臂痛諸藥不效服此數劑自愈觀本草切用及圖經言其不冷不熱可以常

服抱朴子言一切仙藥不

得桑枝煎不服

本事方

解中蠱毒

令人腹內堅痛面黃青色淋露骨立病變不常桑木心對一斛着釜中以水淹

以桑枝三條塘火炮熱斷之以頭熨瘡上令熱冷即易之盡二條則

瘡自爛仍取韭白或雞白傳上急以帛裹之有腫更作

千金方

紫白癰風

桑枝十斤益母草三斤水五斗漫煮至五斤去滓再

煎成膏每臥時溫酒調服半合以愈為度

聖惠方

刺傷手足

犯露水腫

痛多殺人

桑柴灰氣味辛寒有小毒

說曰林汁入鍊五金家用可結永伏硫

主治桑林取汁為煎與冬灰等分同滅瘧症黑子蝕惡肉煮小豆食大下水脹傳

金瘡止血生肌

桑霜治噎食積塊

時珍

目赤腫痛

桑灰一兩黃連半兩為末每以一

錢泡湯澄清洗之

聖濟總錄

洗青盲眼

正月八二月八三月六四月四五月五六月二七月七八月二

十九月十二月十七十一月二十六十二月三十日每遇上件神日用桑柴灰一合煎湯沃之於瓷器中澄取極清稍

熟洗之如冷即重湯頓溫不住手洗久久視物如鷹鵠也一法以桑灰童子小便和作丸每用一丸泡湯澄洗

龍水論

尸注鬼注

其病

乃自三十六種至九十九種使人寒熱淋瀝恍惚默然不知所苦累年積月以至於死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒灰二

斗着甑中蒸透以釜中湯三四斗淋之又淋凡二度極濃澄清止取二斗以漬赤小豆三斗一宿曝乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊

乃自三十六種至九十九種使人寒熱淋瀝恍惚默然不知所苦累年積月以至於死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒灰二

斗着甑中蒸透以釜中湯三四斗淋之又淋凡二度極濃澄清止取二斗以漬赤小豆三斗一宿曝乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊

乃自三十六種至九十九種使人寒熱淋瀝恍惚默然不知所苦累年積月以至於死復傳親人宜急治之用桑樹白皮曝乾燒灰二斗着甑中蒸透以釜中湯三四斗淋之又淋凡二度極濃澄清止取二斗以漬赤小豆三斗一宿曝乾復漬灰汁盡乃止以豆蒸熟或羊

肉或鹿肉作羹進此豆飯初食一升至二升取飽微者三四斗愈極者七八斗愈病去時體中自覺痛痒淫淫若根本不盡再為之神效方也 肘后方 腹中癥瘕 方見介 身面水腫 坐臥不得取東引花桑枝燒灰淋汁煮赤小豆每飢即飽食之

不得吃湯飲 梅師方 面上瘰癧 寒食前後取桑條燒灰淋汁入石灰熬 白癰鼓風 桑柴灰二斗甑內蒸之取釜內熱湯洗不過五六度瘥 聖惠方 大風惡疾 眉髮脫落以桑柴

頭面以大豆水研漿解澤灰味彌佳次用熱水入綠豆麴 濯之三日一洗頭一日一洗面不過十度良 聖惠方 狐尿刺人 腫痛欲死桑灰汁漬之冷即易 肘后方 金瘡作疼 桑柴灰篩細傳 瘡傷風水 腫疼入腹

桑灰淋汁漬之冷 復易 梅師方 頭風白屑 桑灰淋汁沐之 神良 聖惠方

桑耳桑黃 見菜部 木耳

桑花 見草部 苔類

桑寄生 見後寓 木類

桑柴火 見火部

桑螵蛸 見虫部

桑蠹 見虫部

柘 宋嘉 時珍曰按陸佃埤雅云柘宜山石 柘 釋名 柘宜山草柘之從石其取此義與 集解 宗奭曰柘木裏有紋亦可旋為器其葉可飼蠶曰柘蠶然葉硬不及桑葉入藥以無刺

琴瑟清響勝常爾雅所謂棘刺即此蠹也攷工記云弓人取材以柘為上其寬狀如桑子而圓粒如椒名佳子佳音 雖其木染黃赤色謂之柘黃天子所服相感志云柘木以酒醋調礪灰塗之一宿則作間道鳥木文物性相伏也

木白皮東行根白皮氣味甘溫無毒主治婦人崩中血結瘕瘕大煮汁醱酒服主風虛耳聾補勞損虛羸腰冷夢

與人交接淺精者藏時珍曰柘能通腎氣故聖惠方治耳鳴耳聾一二十年者有柘根酒用柘根二十斤薑蒲五斗各以水一石煮

為末浸酒中三宿日夜飲之附方新飛絲入目柘漿點之以絲蘸水洗目令明柘木煎湯按日溫洗自寅至亥乃止無不效者正月初二

取小醉而眠聞人聲乃止拭去醫學綱目二月初二三月不洗四月初五五月十五六月十一七月

柘黃見采部

奴柘拾遺集解此樹似柘而小有刺葉亦如柞葉而小可同蠶

刺氣味苦小溫無毒治婦人血瘕男子瘕癖悶痞取刺和三稜草馬鞭草作煎如稠糖病在心食後在臍空心服當下惡物藏器

楮別錄音嬌亦上品穀穀呼乳為穀其木中白汁如乳故以名之陸佃埤雅作穀米之穀訓為善者誤矣或以楮構為二物者亦誤矣詳

下集解別錄曰楮寔生少室山所在有之八月九月采寔日乾四十日成弘景曰此即今構樹也南人呼穀紙亦為楮紙武陵人作穀皮

有子者為佳其寔初夏生大如彈丸青綠色至六七月漸深紅色乃成熟八九月采水浸去皮穰取中子段成式酉陽雜俎云穀田久廢

必生構葉有瓣曰楮無曰構陸氏詩疏云江南人績其皮以為布又擣以為紙長數丈光澤甚好又食其嫩芽以當菜如今楮紙用之最

博楮布不見有之醫方但貴楮寔餘亦稀用大明曰皮班者是楮皮白者是穀時珍曰按許慎說文言楮穀乃一種也不必分別惟辨雌雄耳雄者皮斑而葉無極又三月開花成長穗如柳花狀不結寔數年人采花食之雌者皮白而葉有極又亦開碎花結寔如楊梅半熟時水操去子蜜煎作果食二種樹並易生葉多澀毛南人剝皮擣煮造紙亦緝練為布不堅易朽裴淵廣州記言蠻夷取穀皮熟槌為揭裏罽布以擬毡其暖也其木腐後生菌耳味甚佳好

楮實亦名穀實

別錄 楮桃

網目 脩治

要曰采得後水浸三日攪旋投水浮者去之晒乾以酒浸一伏時了蒸之從已至亥

用氣味甘寒無毒主治陰瘰癧腫瘰癧氣充肌明目久服不飢不老輕身

別錄壯筋骨助陽氣補虛勞健腰膝益顏色

大明 弘景曰仙方采

亦乾服使人通神見鬼頌曰仙方單服其實正赤時收子陰乾節末水服二錢七益久乃佳抱朴子云梓木實赤者服之老者成少令人

微視見鬼神道士梁頌年七十服之更少壯到百四十歲能行及走馬時珍曰別錄載楮實功用大補益而修真秘旨書言久服令人成

骨軟之痿濟生秘覽治骨哽用楮實煎湯服之豈非軟骨之微乎按南唐書云烈祖食餒喉中噎國醫莫能愈吳廷紹獨請進楮實

湯一服疾失去羣醫他日取用皆不驗扣廷紹答云噎固甘起故以此治之愚謂此乃治骨硬堅軟之義國醫醫用治他噎故不驗也附方

新水氣蠱脹

楮實子丸以潔淨釜用楮實子一斗水二斗熬成膏茯苓三兩白丁香一兩半為末以膏和丸梧子大

六水氣蠱脹從少至多脹至小便清利服減為度后服治中湯養之忌甘苦峻補及發動之物潔古活法機要 肝熱生翳 楮實子研

湯服一錢日再服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

服愈直指方 喉痺喉風 五月五日或六月六日七月七日采楮桃陰乾每

堯輔
吐血鼻血
楮葉搗汁一二升旋旋溫飲之 聖惠方
一切眼翳
三月收穀木嫩葉曬乾為末入麝香少許 每以黍米大注管內其翳自落 聖惠方
木腎疝氣
楮葉雄黃等分為末酒糊丸梧子大每鹽酒下五十九 醫學集成

氣入囊
五月五日采穀樹葉陰乾為末每服一二匙空心溫酒下 簡便方
癰瘡瘰癧
楮葉搗傳 聖惠方
痔瘻腫痛
楮葉半斤搗爛 封之 集簡方
蜈蚣螫傷
楮葉麻葉合搗取汁漬之 千金方
魚骨硬咽
楮葉搗汁吸之

卜便
良方

枝莖
治癰瘡瘰癧者湯洗浴
別錄
搗濃汁飲半升治小便不通
時珍
附方
舊一
頭風白屑
楮木作枕六十日一易新者 外臺秘要
暴赤眼痛
礞忍著嫩楮枝去葉放地大燒

以溫覆之一日取灰泡
湯澄清溫洗 聖惠方

樹白皮
氣味甘平無毒
治逐水利小便
別錄
治水腫氣滿
甄權
喉痺
吳普
煮汁釀酒飲治水腫入腹短氣欬為散服治下血崩
時珍

附方
舊一
腸風下血
秋采楮皮陰乾為末酒服三錢 或入麝香少許日二 普濟方
血痢血崩
楮樹皮荊芥等分為末冷醋調服一錢血崩以煎七服神效不可具述 危氏得效方
男婦腫疾
不拘久近暴風入腹婦人新產上固

風入臟內腹中如馬鞭短氣楮皮枝葉一大束切煮汁
釀酒不斷飲之不過三四日即退可常服之
千金方
風水腫浮
一身盡浮楮皮散用楮白皮猪苓木通各二錢桑白皮三錢陳皮楮皮一錢生薑三片水二鍾煎服日一劑 聖濟總錄
膀胱石水

四肢瘦削小腹脹滿
構根白皮桑根白皮各二升白朮四兩黑大豆五升
流水一斗煮四升入清酒二升再煮至三升日再一七服之
集驗方
目中翳膜
楮白皮暴乾作一繩子如釵股大燒灰細研每點少許日三五次瘥乃止 崔氏方
魚骨硬咽

楮樹嫩皮搗爛為丸水下
二三十丸 衛生易簡方

皮間白汁
釋名構膠
綱目
五金膠漆
大明曰能合硃砂為團故名五金膠漆時珍曰構汁最粘今人用粘金箔古法粘經書以楮樹汁和白及飛翹調糊接紙永不脫解過於膠漆
氣味甘平無毒
治

瘡癰
別錄
傳蛇蟲蜂蝎犬咬
大明
附方
舊一
天行病後脹滿
兩脇刺脹臍下如水腫以構樹枝汁隨意服之小便利即消 外台秘要

楮皮紙

楮耳

見菜部
木耳

枳

本經
中品

校正
實枳殼

釋名
子名枳實

宋開寶
宗奭曰

枳實枳殼一物也小則其性酷而速大則其性詳而緩故張仲景治傷寒倉卒之病承氣湯中用枳實皆取其疏通決泄破結實之義他方但導敗風墮之氣可常服者故用枳殼其義如此恭曰既稱枳實須合核攢今殊不然時珍曰枳乃木名從枳諧聲也實乃其子故曰枳實後人因小者性速又呼老者為枳殼生則皮厚而實熟則殼薄而虛正如青橘皮陳橘皮之義宋人復出枳殼一條非矣冠氏以為破結寔而名亦未必然也

集解

別錄曰枳實生河內川澤九月十月米陰乾志曰枳殼生商州川谷九月十月米陰乾藏器曰本經枳實用九月十月不如七月八月既厚其半舊云江南為橘江北為枳周禮亦云橘逾淮而北為枳今江南枳橘皆有江北有枳無橘此自別種非關變易也頃曰

今洛西江湖州郡皆有之以商州者為佳木如橘而小高五七尺葉如橙多刺春生白花至秋成實七月八月米者為實九月十月米者為殼今醫家以皮厚而小者為枳實壳大者為枳殼皆以翻肚如盆口狀陳久者為勝近道所出者俗呼臭橘不堪用
曰枳實采破令乾除核微炙令乾用以陳者為良俗方多用道家不須燉曰枳實枳殼性效不同若使枳殼取辛苦腥并有漂油者要塵久年深者為佳並去穢核以小麥麴少麴焦去麴用

枳實氣味苦寒無毒

別錄曰酸微寒晉曰神農苦雷公酸無毒李當之大寒權曰辛苦元素曰性寒味苦氣厚味薄浮而升微降陰中陽也果曰沉也陰也

主治大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱

結止痢長肌肉利五臟益氣輕身

除胸脇痰癖逐停水破結實消脹滿心下急痞滿逆氣脇風痛實氣上瀉泄目
別錄傷寒結胸

主上氣喘欬腎內傷冷陰痿而有氣加而用之

消食散敗血破積堅去胃中濕熱
震亨曰枳實瀉痰能衝墻倒壁滑竅破氣之藥也元素曰心下痞及宿食不消並宜枳實

黃連梟曰以蜜炙用則破水積以泄氣除內熱潔古用云脾經積血脾無積血則心下不痞也好古曰益氣則佐之人參白朮乾薑破氣則佐之以大黃牽牛硝芒此本經所以言益氣而復言消痞也非白朮不能去濕非枳實不能除痞故潔古制枳朮丸方以調胃脾張仲景治心下堅大如盤水飲所作枳實白朮湯用枳實七枚木
附方
新九
卒胸痺痛
枳實搗末湯服方寸七
日三夜一
肘后方
胸痺結胸
胸痺心下痞堅留氣
結胸脇下逆氣搶心

枳實薤白湯主之陳枳實四枚厚朴四兩薤白半斤括樓一枚桂一兩以水五升

先煎枳朴取二升去滓納餘藥煎三兩沸分溫三服當愈張仲景金匱要略傷寒胸痛傷寒後卒胸膈閉痛枳實薤白湯產後

痛腹枳實薤白湯枳實薤白湯枳實薤白湯奔豚氣痛枳實薤白湯婦人陰腫枳實薤白湯大便不通枳實薤白湯

米飲下危積痢脫肛枳實石上磨平蜜炙黃更小兒久痢水穀不調枳實湯末飲腸風下血枳實半斤薤白黃芩半斤為末米飲非

氏得效方五熨之縮乃止千金方服一二錢廣利方時服二錢七糊丸亦可用經驗方

兒五痔不以年月枳實為末煉蜜丸梧子小兒頭瘡枳實燒灰猪脂皮膚風癩枳實醋浸火炙熨之

大空心飲下三十九丸集驗方聖惠方即消外臺秘要

枳殼氣味苦酸微寒無毒權曰苦辛元素曰氣味升降與枳實同果曰沉也陰也主治風痺淋痺通利關節勞氣欬嗽耳聾目倦散留結胸膈痰滯逐水消脹

滿大脇風安胃止風痛開遍身風癢肌中如麻豆惡瘡腸風痔疾腹結氣兩脇脹虛悶膈壅塞權健脾胃調五臟下氣止嘔逆消痰

治反胃霍亂瀉痢消食破癥結瘕癖五膈氣及肺氣水腫大小腸除風明目炙熱熨痔腫大世肺氣除胸痞元治裏急後重時發明元

穀破氣勝濕化痰泄肺走大腸多用損胸中至高之氣止可二三服而已稟受素壯而氣刺痛者看何部經分以別經藥導之果曰氣血弱者不可服以其損氣也

好古曰枳殼主高枳實主下高者主氣下者主血故穀主胸膈皮毛之病實主心腹脾胃之病大同小異朱肱活人書言治痞宜先用桔梗枳殼湯非用此治心下痞也果知誤下氣將陷而成痞故先用此使不致於痞也若已成痞而用此則失之矣不惟不能消痞反損胸中之氣先之一字有謂也時珍曰枳實枳殼氣味功用俱同上世亦無分別魏晉以來始分實殼之用潔古

張氏東垣李氏又分治高治下之說大抵其功皆能利氣氣下則痰喘止氣行則痞脹消氣通則痛刺止氣利則後重除故以枳實利胸膈以枳殼利腸胃然張仲景治胸痹痞滿以枳實為要藥諸方治下血痔痢大腸秘塞裏急後重又以枳殼為通用則枳實不獨治下而

穀不獨治高也蓋自飛門至魄門皆肺主之三焦相通一氣而已則二物分之可也不分亦無傷杜壬方載胡陽公主苦難產有方士進瘦胎飲方用枳殼四兩甘草二兩為末每服一錢白湯點服自五月後一日一服至臨月不惟易產仍無胎中惡氣也張景古活法機要

改以枳朮丸日服令胎瘦易生謂之束胎丸而寇宗奭行義言胎壯則子有力易生令服枳殼藥反致無力兼子亦氣弱難養所謂縮胎易產者大不然也以理思之寇氏之說似覺為優或胎前氣盛壅滯者宜用之所謂八九月胎必用枳殼蘇梗以順氣胎前無滯則產後

無虛也若氣稟弱者即大非所宜矣震亨曰難產多見于鬱悶安逸之人富貴奉養之家古方瘦胎飲為湖陽公主作也子妹苦於難產其形肥而好坐予思此與公主正相反也彼奉養之家其氣必實故耗其氣使平則易產今形肥則氣虛久坐則氣不運當補其母之氣以紫蘇飲加補氣藥舊三新**傷寒呃噫**枳殼半兩木香一錢為末每白湯服一錢末止再服本事方**老幼腹脹**血氣凝滯用此寬腸順氣名四炒丸商州枳殼厚十數貼服之遂快產附方十五

同炒一兩用蘿蔔子一兩同炒一兩用乾漆一兩同炒一兩用茴香一兩同炒黃去四味消積順氣治五積六聚不拘男婦老幼但是氣只取枳殼為末以四味煎汁煮麤糊和丸梧子大每食後米飲下五十九王氏簡易方

去穰每個入巴豆仁一個合定扎煮慢火水煮一日湯減再加熱湯勿用冷水待時足汁盡去順氣止痢枳殼炒二兩四錢甘草六錢巴豆切片曬乾勿炒為末醋煮麤糊丸梧子大每服三四十丸隨病湯使邵真人經驗方

百疏導腳氣即上方用木心小兒秘澀枳殼煨去穰甘草各一錢腸風下血不拘遠年近日博濟方用枳殼煨黑存性五錢羊腰炭為湯服直指方全幼心鑑末三錢五更空心米飲服如人行五里再一服當日見效

簡便方用枳殼一兩黃連五錢水一鍾煎半鍾空心服痔瘡腫痛必效方用枳殼煨熟熨之七枚立定本事**懷胎腹痛**枳殼三兩麤炒黃芩一兩每服五錢水一

兩活**產後腸出**不收枳殼煎湯浸之良小兒驚風不驚丸治小兒因驚氣吐逆作搐痰涎壅塞手足掣瘲眼睛斜視枳殼去穰麤炒淡法機要久即收也袖珍方豆豉等分為末每服一字甚者半錢急驚薄荷自然汁下慢驚荊芥湯入酒三五點

下日三服陳**牙齒疼痛**枳殼浸酒含風軫作痒枳殼三兩麤炒為末每服二錢水一盞煎小兒軟癰大枳殼一箇去白磨口平以麤糊文中小兒方聖惠方六分去滓溫服仍以汁塗之經驗方

無疤痕也利氣明目枳殼一兩炒下早成痞傷寒陰證下早成痞心下滿不痛按之虛軟枳殼危氏得效方為末調湯下枳殼等分為末每服三錢黃連湯調下宣明方**腸骨疼痛**因驚傷肝炒枳殼一兩桂枝生半兩為細末每服二錢薑棗湯下

枳如樹皮也或云枳主中風身直不得屈伸反復及口僻眼斜刮皮一升酒三升漬一宿每溫服五合酒盡再作蘇**樹莖及皮**

主水脹暴風骨節痠急引

根皮主治浸酒漱齒痛煮汁服治大便下水水服治野雞病有血藏

木部

嫩葉主治煎湯代茶時珍

出茶譜

枸橘

綱目釋名臭橘集解

時珍曰枸橘處處有之樹葉並與橘同但幹多刺二月間白花青蕊不香結實大如彈丸形如枳實而殼薄不香人家多收種為藩籬亦或收小實偽充枳實及青橘皮售之不可不辨

葉

氣味辛溫無毒主下痢膿血後重同薏解等分炒存性研每茶調二錢服又治喉癰消腫導毒

時珍附方

咽喉怪證咽喉生瘡層層如疊不痛

日久有瘻出臭氣廢飲食用臭橘葉煎湯連服必愈夏子益奇病方

刺主治風牙痛每以一合煎汁含之

時珍

橘核

主治腸風下血主同檳榔白皮等分炒研每服一錢主莢子煎湯調服

時珍附方

白疹瘡痒

遍身者小枸橘細切麥麩炒研為末每服二錢酒浸少時飲酒

初以枸橘煎湯洗患處救急方

樹皮

主治風痺直不得屈伸細切一升酒二升浸一宿每日溫服半升酒盡再作

時珍

卮子

本經中品釋名木丹

越桃

別錄鮮支

綱目花名釋名

時珍曰卮酒器也卮子象之故名俗作柅司馬相如賦云鮮支黃爍註云鮮支即支子也佛書稱其花為薝蔔謝靈運謂之林蘭曾端伯呼為禪友或曰薝蔔金色非卮子也

集解

別錄曰卮子生南陽川谷九月米實暴乾弘景曰處處有之亦兩三種小異以七稜者為良經霜乃取入染家用于藥甚稱頌曰今南方及西蜀州郡皆有之木高七八尺葉似李而厚硬又似檮蒲子二三月生白花皆六出甚芬香俗說即西域薝蔔也夏秋結

實如訶子狀生青熟黃中仁深紅南人競種以售利史記貨殖傳云卮莢千石與千戶侯等言獲利薄也入藥用山卮子方書所謂越桃也皮薄而圓小刻房七稜至九稜者為佳其大而長者雷斅炮炙論謂之伏尸卮子入藥無力時珍曰卮子葉如鬼耳厚而深綠春榮秋瘁入夏開花大如酒盃白瓣黃蕊隨即結實薄皮細子有鬚
脩治
甘草木浸一宿漉出焙乾搗篩為末用震亨曰治上焦中焦連殼用下霜後收之蜀中有紅卮子花爛紅色其實染物則赭紅色

焦去殼洗去黃髮炒用治血病妙黑用好
古曰去心胸中熱用仁去肌表熱用皮
氣味苦寒無毒
別錄曰大寒元素曰氣薄味厚輕清上行氣浮而味降陽中
陰也果曰沉也陰也入手太陰肺經血分丹書厄子素金
主治五內邪氣胃

中熱氣面赤酒皸鼻白癩赤癩瘡瘍
療目赤熱痛胸心大小腸大熱心中煩悶
去熱毒風除時疾熱解五種黃病利五淋通小便

解消渴明目主中惡殺虺蠱毒
主瘡癰癰風
治心煩懊憹不得眠臍下血滯而小便不利
瀉三焦火清胃

腕血治熱厥心痛解鬱行結氣
治吐血衄血血痢下血血淋損傷瘀血及傷寒勞復熱厥頭痛心氣湯火傷
時珍發明
元素曰厄子輕

而象火故能瀉肺中之火其用有四心經客熱一也除煩燥二也去上焦虛熱三也治風四也
震亨曰厄子瀉三焦之火及痞塊中火邪
最清胃腕之血其性屈曲下行能降火從小便中泄去凡心痛稍久不宜溫散反助火邪故古方多用厄子以導熱藥則邪易伏而病易

退好古曰本草不言厄子能吐仲景用為吐藥厄子本非吐藥為邪氣在上拒而不納食令上吐則邪因以出所謂其高者因而越之也
或用為利小便藥實非利小便乃清肺也肺清則化行而膀胱津液之府得此氣化而出也本草言治大小腸熱乃辛與庚合又與丙合

又能泄戊先入中州故也仲景治煩躁用厄子豉湯煩者氣也躁者血也氣主肺躁主血故用厄子色赤味苦入心而治煩香豉色黑味
益入腎而治躁宗奭曰仲景治傷寒發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹厄子豉湯治之因其虛故不用大黃有寒

毒故也厄子雖寒而無毒治胃中熱氣既亡血亡津液腑臟無潤養內生虛熱非此物不可去也又治心經留熱小便赤澀用去皮厄子
火煨大黃連翹炙甘草等分末之水煎三錢服无不利也
頌曰張仲景及古今名醫治發黃皆用厄子茵陳甘草香豉四物作湯飲又治

大病後勞復皆用厄子鼠矢等湯
舊十新
鼻中衄血
山厄子燒灰吹之屢用
小便不通
厄子仁十四個獨頭蒜一箇滄鹽少
許搗貼臍及囊良久即通
普濟方
血淋瀝

痛生山厄子末滑石等分
下利鮮血
梔子仁燒灰水服一
酒毒下血
老山厄子仁焙研每新汲
熱毒血痢
厄子十四枚去皮搗末蜜丸梧
子大每服三九日三服大效亦

可水煎服
臨產下痢
厄子燒研空心熱酒服一匙
婦人胎腫
屬濕熱山厄子一合炒研每服二
熱水腫疾
山厄子仁炒研米飲下三錢若
上焦熱者連殼用
丹溪纂要

霍亂轉筋
心腹脹滿未得吐下厄子二七枚燒
研細熟酒服之立愈矣
肘后方
冷熱腹痛
疔刺不思飲食山厄子川烏頭等分生研為末酒糊丸如梧
胃脘火痛
大山厄
子七枚

木部

或九枚炒焦水一盞煎七分入生薑汁飲之立止復發者必不效用玄明粉一錢服立止 丹溪纂要

五臟諸氣

益少陰血 厄子以黑研末生薑同煎飲之甚捷 丹溪纂要

五疳注病

冲發心脇刺痛纏綿無時厄子三七枚燒末水服 肘後方

熱病食復

及交接後發動欲死不能語厄子三十枚水三升煎一升服令微汗 梅師方

小兒狂躁

畜熱在下身熱狂躁昏迷不食厄子仁七枚豆豉五錢水一盞煎七分服之或吐或不吐立效 閻孝忠集效方

盤腸釣氣

越桃仁半兩草

烏頭少許同炒過去草烏入白芷一錢為末每服半錢茴香葱白酒下 普濟方

赤眼腸秘

山厄子七個鑽孔煨熱水一升煎半升去滓并入大黃末三錢溫服下 普濟方

喫飯宜出

厄子二十個微炒去皮水煎湯服下 怪證奇方

風痰

頭痛

不可忍厄子末和蜜濃傳舌上吐即止 兵部手集

鼻上酒皰

厄子炒研黃蠟和九彈子大每服一丸嚼細茶下日二服已酒麩煎炙 許學士本事方

火燭丹毒

厄子搗和水塗之 梅師方

火瘡未起

厄子仁燒研麻油和封之

已成瘡燒白糖灰粉之 千金方

眉中練癰

厄子燒研和油傳之愈 保幼大全方

折傷腫痛

厄子白麩同搗塗之甚效 集簡方

獐犬吠傷

厄子皮燒研石硫黃等分為末傳之三日 梅師方

湯濕火燒

厄子末和雞子清濃

掃之救急方

花主治悅顏色千金翼面膏用之

附錄木戟

別錄有名未用曰生山中葉如厄子味辛溫無毒主疫癘氣在臟腑

酸棗

本經上品釋名棗爾

山棗集解

別錄曰酸棗生河東川澤八月采實陰乾四十日成弘景曰今出東山間云即山棗樹子似武昌棗而味極酸東人嗽之以醒睡與經文療不得眠正相反恭曰此即棗也樹大如大棗實無常形但大棗中味

酸者是今醫以棘實為酸棗大誤矣藏器曰酸棗既是大棗中之酸此即是真棗何復名酸既名酸又云小今棗中酸者未必即小小者未必即酸惟嵩陽子云余家於滑臺今酸棗縣即滑之屬邑也其樹高數丈徑圍一二尺木理極細堅而且重可為車軸及匙筋等其樹皮亦細而硬文似蛇鱗其棗圓小而味酸其核微圓而仁稍長色赤如丹此醫之所重居人不易得今市人賣者皆棘子也又云山棗樹如棘其子如生棗其核如骨其肉酸滑好食山人以當果頌曰今近汴洛及西北州郡皆有之野生多在坡坂及城壘間似棗不而皮細其木心赤色莖葉俱青花似棗花八片結實紫紅似棗而圓小味酸當月采實取核中仁子子曰養其核棗是也嵩陽子言酸棗縣所出為真今之貨者皆是棘實用者尤宜詳辨志曰酸棗即棘實更非他物若云是大棗味酸者全非也酸棗小而圓其核中仁微扁其大棗仁大而長不相類也宗奭曰天下皆有之但以土產宜與不宜爾嵩陽子言酸棗木高大今貨者皆棘子此說未盡蓋不知小則為棘大則為酸棗平地則易長居崖壘則難生故棘多生崖壘上久不樵則成棘人方呼為酸棗更不言棘其實一本也此物纔及三尺便開花