

婦人產後胎位  
婦人產後胎位  
婦人產後胎位  
婦人產後胎位

梁鳳

金匱要略

卷十九

金匱要畧淺註

目錄

第一卷

臟腑經絡先後病脉第一

瘧濕暍病脉證第二

第二卷

百合狐惑陰陽毒病脉證第三

瘧病脉證第四

全圖要畧注言  
目錄  
中風歷節病脉證第五

第三卷

血痺虛勞證治第六

肺痿肺癰欬嗽上氣脉證第七

第四卷

奔豚氣病證治第八

胸痺心痛短氣脉證第九

腹滿寒疝宿食脉證第十

五臟風寒積聚脉證第十一

第五卷

痰飲欬嗽脉證第十二

消渴小便不利淋病脉證第十三

第六卷

水氣脉證第十四

第七卷

黃痺證治第十五



驚悸吐衄下血胸滿痰血脈證第十六

第八卷

嘔吐噦下利脈證第十七

瘡癰腸癰浸浮脈證第十八

跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蚘蟲脈證第十九

第九卷

婦人妊娠脈證第二十

婦人產後脈證第二十一

婦人雜病脉證第二十二附婦人陰挺論

第十卷

雜病方第二十三

禽獸蟲魚禁忌第二十四

果實菜穀禁忌第二十五

金匱要畧淺註卷九

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園註

梁鳳岐

婦人妊娠病脈證治第二十

男

元犀靈石 蔚古愚 全校字

師曰婦人

經斷後而

得平

和之脈

陰其後為

陰脈

視閉前

小弱

是胎元

其人渴

非上焦有熱乃

不能食

非

家有病乃惡

無寒熱

外無表邪也

名口

妊娠

凡一切

心陽食也

邪也

名口

凡一切

補

補

瀉之劑皆未盡善唯以

桂枝湯主之於法六十日

胎已成而氣干

上當有此證設有醫

者不知為孕而誤藥之為也

治之逆者

却一月

先見此證若

加吐下者

當明告其一誤不可再誤前為藥告茲

則絕之

易所謂勿藥有喜是也

尤在溼云平脈脈無病也即內經身有病而

無邪脈之意陰脈小弱者初時胎氣未盛而

陰方受蝕故陰脈比陽脈小弱至三四月經

血久畜陰脈始強內經所謂手少陰脈動者



妊子千金所謂三月尺脈數是也。其人渴妊子者內多熱也。一作嘔亦通。今妊婦二三月往往惡阻不能合是已無寒熱者無邪氣也。夫脈無故而身有病而又非寒熱邪氣則無可施治。惟宜桂枝湯和調陰陽而已。徐氏云桂枝湯外證得之為解肌和營衛內證得之為化氣調陰陽也。今妊娠初得上下本無病因子宮有礙氣溢上下故但以芍藥一味因

其陰氣使不得上溢。以桂甘薑棗扶上焦之陽。而和其胃氣。但令上之陽氣充。能禦相侵之陰氣足矣。未嘗治病。正所以治病也。否則以渴為熱邪而解之。以不能食為脾不健而燥之。豈不謬哉。六十日當有此證者。謂妊娠兩月。正當惡阻之時。設不知而妄治。則病氣反增。正氣反損。而嘔瀉有加矣。絕之謂禁絕。其醫藥也。婁全善云。嘗治一二婦。惡阻病吐。

前醫愈治愈吐。因思仲景絕之之旨。以炒糯  
米湯代茶。止藥月餘。漸安。又一本絕之謂  
當斷絕其病根。不必泥於安胎之說。而狐疑  
致誤也。亦通。

婦人

行經時。經未淨。或遇冷氣。房事六淫邪氣  
冲斷其經。則餘血停滯。疑聚成塊。結於胞

中名為癥病。如

宿有癥病

或不在子宮。則仍行經。而  
受孕。經斷。即是孕矣。乃

斷未及三月。而得漏下不止。胎

無血以動。若在

臍下。則胎真。臍上者。此為

每月湊集。癥氣。痼阻

欲落矣。今動。之新血。因

其不入於害。其血無所入而下。漏其實非胎病。  
 胞之為也。雖然經斷原有胎與衄之異。欲  
 知其的證。必由今之三月。上遡  
 前之三月。統共以六月為準。若  
 問而前三月經水順利。應時。而無前後參差。其  
 知其前。若前之三月。其期經水  
 胎也。遲早不定。便知今之經水  
 月之所積。衄而非也。然既有胞。何以又為漏下。而  
 入。胞養胎。而所以血不止者。其癥不去。故也。不  
 下走不止。所以血不止者。其癥不去。故也。不  
 去。則胎終。當下其癥。以桂枝茯苓丸主之。  
 不安。必當下其癥。以桂枝茯苓丸主之。

此為妊娠宿有癥病。而出其方治也。

桂枝茯苓丸方

桂枝

茯苓

丹皮

桃仁

去皮尖熬

芍藥

各等分

右五味末之煉蜜丸如兔屎大每日食前服  
一丸不知加至三丸

婦人懷妊六七月脈弦發熱有似其胎愈脹乃

與身不痛而腹痛背不惡寒而惡寒甚少腹陣陣作如被

扇所以然者子臟開而不能闔而風故也夫臟



入其陰內勝則其弦為陰氣而發熱且當以附為格陽矣胎脹者熱則消寒則開也

子湯温其臟

此為胎脹少腹如扇者出其方治也

李氏云子臟即子宮也臍下三寸為關元左

二寸為胞門右二寸為子戶昔人謂命門為

女子繫胞之處非謂命門即子臟也金匱明

明指出少腹何荒經者之聚訟紛紛也

師曰婦人有漏下者妊娠經來俗謂之微經也有四五六月墜胎謂之半

產半產後傷海因續下血都不絕者有妊娠下

血者如前之因假令妊娠無瘕而下腹中痛

者者同有之為胞阻胞阻者胞中之氣血不膠艾湯主之

則而言之凡婦人經水淋瀝及胎產前後下血

之而固止者皆衝任脈虛陰氣不守也此方皆可補

此為胞阻者。而出其方治也。然此方為經水不調胎產前後之總方。

### 膠艾湯方

乾地黄

六兩

川芎

阿膠

甘草

各二兩

艾葉

當歸

各三兩

芍藥

四兩

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓內膠令消盡温服一升日三服不差更作婦人懷孕腹中疝痛當歸芍藥散主之此為懷妊腹中疝痛者出其方治也徐忠可云疝痛者綿綿而痛不若寒疝之絞痛血氣之刺痛也乃正氣不足使陰得乘陽

而水氣勝土。脾鬱不伸。鬱而求伸。土氣不調。則痛綿綿矣。故以歸芍養血。苓木扶脾。澤瀉瀉其有餘之舊水。芫蕪以其欲遂之血氣。不用黃芩。疴痛因虛。則稍挾寒也。然不用熱藥。原非大寒。正氣充。則微寒自去耳。

當歸芍藥散方

當歸

芫蕪

芍藥

各三兩

一觔

茯苓

白朮

澤瀉

各四兩

半觔