

救急選方

全

R2-51

38

救

方

急

二

選

卷

中醫之精湛淵博。漸爲世界所注意。然歐美之所研究者藥物而止。日本則進乎理論之探討。歐美之所弋獲者僅當最近期間。日本則遠在明治維新之前。因維新而廢漢醫。因廢漢醫而感受西方醫學之不完美而復有復興皇漢醫學之舉。則其甘苦備嘗。中西醫價值之比較。尤爲親切顯著焉。是故我國醫界欲求改進。最適宜之參攷。厥爲日本漢醫之述作。本局有鑒於此。爰有皇漢醫學編譯社之組織。廣求彼土之名著。以供他山之攻錯。先印聿修堂醫學叢書十三種。書爲丹波元簡畢生心血之所聚。攷古精覈。持理平正。方藥純粹。審定謹嚴。求之我國。鮮出其右。宜乎楊守敬稱其有三美。洵非虛語也。印竣爲述崖略。以告世之愛護而有志中醫者。嗣後會當陸續編譯。以期蔚爲大成。發揚中醫。鞏固中醫。倘其嚆矢乎。

中華民國二十四年十月上海中醫書局謹誌

救急選方序

華元化曰。人有危病。急如風雨。命醫不及。須臾不救。觀其橫夭。實可哀憐。先府君有深慨於斯。因撰國字方書三卷。寬政初。鏤版於醫學以傳。於是自通邑大都。以及窮陬僻壤。藉此而全活者。陸續尤多。乃爲世之鴻寶焉。而又將別編一書。以資醫家應急之便。有志而不果。無何罹沉疴。今年夏五溘逝。簡泣血之餘。念所以仰承先志。質性鈍嗇。不能紹述其萬一。尙何有所發揮也。嘗歷觀今代醫師。孰不研其學而逞其技。以理療危險之疾難。而至其稍斃者。則有宿食在上脘。宜用鹽湯若瓜蒂涌吐之。而却用備急。升降乖錯。闕焉而死者。有中風脫證。當與參附峻補之。而認爲發痧。挑血而立斃者。霍亂不辨乾溼。驚風不別急慢。疔瘡灼艾。火燒貼膏之類。亦間有焉。又至其最下者。則違卒暴之病。少異於尋常者。瞞貽不知所出。孟浪處措。或至殞命。歸之于天。恬不爲怪。爲醫如斯。不獲罪於冥冥者幾希。此無他。因不講明救卒拯急之術於素常也。而世所傳如

救急易方。雖名曰救急。其實不論病之緩急。採輯方藥單省。倉卒易辦者。以具各門。不足崙爲危急諸疾之備也。簡丁艱以來。臥病者五閱月。其間時時披閱架藏諸書。於危證門中。遴擇最簡捷者。勒爲上下編。名曰救急選方。唯空摺撫不精。掛一漏百。未知副先志否。九原叵起。趨庭無期。徒增慟哭而已。然竊意斯書諸方。悉是前賢所詒。已述其明驗。而有試之于今。其效應如影響者。後進之士。常熟此編。能諳其證理。預備其藥劑。則奏回天之功於逡巡咄嗟之間者。或有之矣。雖然。古人有言曰。病之變狀。不可一概言之。所以醫方千卷。猶未盡其理。若至臨其變。則當推未盡之理而運用之。圓機之妙。在於神悟矣。

享和紀元冬十一月望丹波元簡廉夫撰

救急選方凡例

一是書端爲拯急救危之備焉。凡閒暇之時。宜繙閱之。知某法可以療某病。某物可以理某證。留心記憶。或預畜。或預製。一遇危急。察脈揣腹。審辨甄別。卽與拯救耳。卒病暴疾。或有萬無生機。而翻然致甦者。則呻吟窘迫。呼吸危亡之際。須竭心力。死中求活。此仁人之心術。先府君所以深望於醫家輩。簡區區。所以葺此書之一大關鍵也。

一病有陰陽塞脫之不同。倉猝之際。或難辨認者。間揭其厓略。以爲蒙學指南。一中風脚氣之類。證候多端。茲彙輯倉皇拯救諸方而已。其稍涉輕緩。可以從容調理者。概置不錄。

一輯仲景而降。歷代諸方。旁及

本邦所傳。有一證而臚列數方者。非驚博也。地異產殊。時移物換。此之所有。彼之所無。欲因便取材耳。是乃拯急救危之本意也。

一每方各註所出書目。然多隨見採摘。未遑一一尋究。恐未免差錯。且如拯救諸法。有疎于前而詳于後者。今特採其詳。而切乎施用者。不拘於出典之前後。又如本草綱目附方。盡載出典。而其元書佚于今。而無由乎讎對詳明者。姑以本草附方四字概之。

一金瘡癰撲疔瘡。獨輯內科方。至如貼敷膏散等。責在瘍醫。故一概不錄。一分兩升合。隨時更變。輕重不等。今每方直依元書而載之。不敢以意改易。用者當視病淺深。察藥柔峻。酌古準今。以從俗便。

一彙本未繕及門洊催傳佈。葢工入梓。如其遺漏。當爲續方而嗣刻。

丹波元簡識

救急選方目錄

卷上

諸卒死門

中惡門

五絕死門

卒中風門

脫陽門

諸厥門

癰癩門

中寒凍死門

中暑喝死門

霍亂門

攪腸沙門

脚氣衝心門

諸卒失血門

卒心腹痛門

急喉痹門

小便急閉門

卒暴雜證門

附轉筋卒

牙關緊急暴盲

舌卒腫目睛突出瘡毒內攻傷寒并熱霍亂

婦人急證門

小兒急證門

附積氣卒疝奔驚豚

卷下

疔瘡急證門

破傷風門

諸咬傷門

誤吞諸物門

諸物入肉門

中飲食毒門

總三十門

金瘡癰撲門

湯火傷門

諸物入耳門

諸物哽噎門

中藥毒門

附入鼻
人被物
擲着目

附兒頭
入白
指入筒

救急選方卷上

第 肆 修 堂 醫 學 叢 書
十 一 種

丹波元簡廉夫 撰

諸卒死門

三物備急丸金匱主心腹卒暴百病。若中惡客忤。五腹脹滿卒痛如錐刺氣急口

噤。停尸卒死。

大黃兩一

乾薑兩一

巴豆一兩去皮心
熬外研如脂

右藥各須精新。先搗大黃乾薑爲末。研巴豆納中。合治一千杵。用爲散。蜜和丸。亦佳。密器中貯之。莫令歇氣。○主心腹諸卒暴百病。若中惡客忤。心腹脹滿。卒痛如錐刺。氣急口噤。停尸卒死者。以煖水若酒服大豆許三四丸。或不下。捧頭起灌。令下咽。須臾當瘥。如未瘥。更與三丸。當腹中鳴。卽吐下便瘥。若口噤。亦須折齒灌之。案古今錄驗。司空三物備急散。療卒死及感忤。口噤不開者。卽本方爲散。服如大豆二枚。

還魂湯金匱救卒死客忤死。

麻黃 三兩

杏仁 七十箇

甘草 一兩

右三味以水八升。煮取三升。去滓分令咽之。通療諸感忤。○裏實者。用備急丸。表實者。用還魂湯。鑑金

救卒死方。匱金雄雞冠。割去血管。吹納鼻中。○薤搗汁灌鼻中。

又方。後肘半夏末。如大豆許。吹鼻中。案此千金療五絕法。心下溫者。一日亦可治。

又方。上同灸臍中百壯。○又方。令人痛爪其人人中。取醒。○又方。以細繩圍其人

肘腕中。男左女右。伸繩從背上大椎度以下行脊上。灸繩頭。一云五壯。又從此

灸橫行各半繩。此凡三灸。各灸三壯。即起。○又方。灸鼻下人中三壯。○又方。

灸兩足大指爪甲聚毛中七壯。此華陀法。一云三七壯。

又方。集祕方驗方燒炭火一杓。以醋澆之。令患人鼻受醋氣。即甦。

救卒死而壯熱者。匱金礬石半斤。以水一升半。煮消。以漬脚。令沒踝。

救卒死而張目反折方。匱金灸手足兩爪後各十四壯。了飲以五毒諸膏散。有巴豆者。

救卒死而四肢不收失便者方。匱金馬屎一升。水三斗。煮取二斗。以洗之。又以牛

洞一升。溫酒灌口中。灸心下一寸。臍上三寸。臍下四寸。各一百壯。差。

小兒卒死。

附本草

無故者。取葱白納入下部。及兩鼻孔中。氣通。或噫即活。

卒死。或先有病痛。或居常倒仆。奄忽而絕。皆是中惡之類。

後肘

取葱中央心。刺鼻。

令入七八寸。無苦。使目中血出。乃佳。一云。耳中血出佳。○又方。令二人以衣。

壅口。吹其兩耳。極則易人。亦可以葦筒吹之。並捧其肩上。側身遠之。莫臨死。

人上。○又方。以葱刺耳。耳中鼻中血出者。勿怪。無血難療。之有血者是活候。

也。○又方。視其上唇裏弦。有青息肉。如黍米大。以針決去之。瘥。○又方。以綿。

漬好酒。納鼻中。手按令汁入鼻中。並持其手足。莫令驚動也。○又方。取皂莢。

如大豆。吹其兩鼻中。噫則氣通矣。○又方。灸其唇下宛宛中。名承漿。十壯。大。

良。

備急療卒死而口噤不開者。

臺外

縛兩手大拇指。灸兩白肉中二十壯。

集驗。療卒死而有脈形候。陰氣先盡。陽氣後竭故也。方。

臺外

嚼薤哺灌之。

驚怖卒死。

附本草

溫酒灌之。即醒。

療火盜兵戈。驚氣入心。不能言語者。危證簡便蜜陀僧末一錢。清茶調下。驚則氣亂。

陀僧之重。以去怯而平肝也。

小兒驚死。醫法指南用生慈姑汁和白蜜灌之。

偶見人斬血籍籍。驚愕卒死者。本朝經驗溫酒灌之。醖醋亦可。

療火燒悶絕不識人。以新尿冷飲之。及冷水和蜜飲之。口噤絞開與之。千金

療因回祿煙薰致死者。古今醫鑑生蘿蔔搗汁頻咽。并嚼塗火瘡。

附免烟薰死法。醫林要集居民逃避石室中。賊以煙火薰之。欲死。迷悶中。摸索得

一束蘿蔔。嚼汁下咽而甦。又炭煙熏人。往往致死。含蘿蔔一片。著口中。

煙氣不能毒人。或預曝乾為末備用。亦可。或新水搗爛乾蘿蔔飲之。亦

可。

又法。李樓怪症方一口呵地。即不死。

退烟散。本朝金驗方預服免烟薰死。蒿雀數個。去腸。實硃砂末。浸蘿蔔自然

汁一宿。取出。內瓦器中。鹽泥固濟。煨存性。研末。每服五七分。白湯及冷

水下。又療產後血暈。○又法葡萄多食免死。成膏爲備尤良。

療笑死

壽域神方

凡口有微氣。心下溫者。用食鹽成塊者二兩。火燒令通赤。候冷研

細。以河水一大碗。同炒至二五沸。放溫分三次服之。後以鵝翎探於喉中。吐

去熱痰三五升。後服黃連解毒湯三二服。則笑自定。人可活矣。案張子和解

不休半年。用此法。醫統云。黃連解毒湯。加半夏竹瀝薑汁。療喜笑不休。極效。○喜笑欲死者。鍼列缺二穴。在手大指後

臂上三寸。及大陵二穴。在掌後橫紋中。鍼三分。立效。

療入井塚悶冒方。外臺取其水。灑人面。令飲之。又以灌其頭及身體。卽活。若無水

取他水用也。

又方

壽世保元

以水噴其面。并含水。調雄黃末一二錢。入水噴之。

又方

本經朝驗

急解患人衣。偃臥溼地上。以醋噴其面。蓋以草薦。半時許。卽甦。

救暈鍼法

鍼灸聚英

假令鍼肝經氣暈。以補肝經。鍼入復甦。○甘草一二錢。水煎灌

下。本經朝驗

又方

玉機微義

暈鍼着。奪命穴。救之。男左女右。取之不同。却再取右。女亦然。此穴正

在手膊上側筋骨陷中。蝦蟆兒上。自肩至肘。正在當中。

醫學綱目云。在曲澤上一尺。針入三分。

鍼暈者。神氣虛也。不可起鍼。以鍼補之。急用袖掩病人口鼻。回氣。內與熱湯飲之。即甦。良久再鍼。甚者。鍼手膊上側陷中。即蝦蟆肉上。惺惺穴。或三里。即甦。若起鍼壞人。

門入

入浴暈倒。

本朝經驗

以冷水暝面。及澆周身。苦酒一鍾。灌口鼻中。或醒後。衄者。蘇子

降氣湯。調辰砂末飲之。

苓朮湯。

三因

治暑溼鬱發。或入浴暈倒。口眼喎邪。手足譫曳。皆溼溫類也。

附子

茯苓

白朮

乾薑

澤瀉

桂心

右等分。水煎服。

凡人暴死。多是疔毒。急取燈遍照其身。若是小瘡。即是其毒。宜急用萬靈奪命

丹之類。

瘍醫大全。方出疔瘡門。

中惡門

朱犀散

效得

治中惡中忤鬼氣。其證暮夜或登廁。或出郊野。或遊空冷屋室。或人所不至之地。忽然眼見鬼物。鼻口吸着惡氣。驚然倒地。四肢厥冷。兩手握拳。鼻口出清血。性命逡巡。須臾不救。此證與尸厥同。但腹不鳴心脇俱煖。凡切勿移動其屍。即令親戚圍繞。燒麝香安息香樟木之類。直候醒知事。方可移歸。

犀角末

錢五

麝香

硃砂

錢各二半

右爲末。每服二錢。井水調下。如無前藥。用雄黃末。服一錢。煎桃枝湯調灌。

走馬湯

附金匱方

療中惡心痛腹脹。大便不通。

杏仁

枚二

巴豆

枚二

右二味。以綿纏。搥令碎。熱湯二合。捻取白汁。飲之。當下。老小量之。通治飛尸鬼擊。

又方

外臺

仰臥。以物塞兩耳。以兩個竹筒。納死人鼻中。使兩人痛吹之。塞口傍無令氣得出。半日所死人噫噫。勿復吹也。

又方後肘灸兩足大拇指上甲後聚毛中。各灸二七壯。即愈。○又方。灸右肩高骨

上。隨年壯良。

中惡之證。因冒犯不正之氣。忽然手足逆冷。肌膚粟起。頭面青黑。精神不守。或錯言妄語。牙緊口噤。或頭旋暈倒。昏不知人。即是卒厥客忤。飛尸鬼擊。弔死問喪。入廟登塚。多有此病。蘇合香圓灌之。方見中風候稍甦。服調氣平胃散。要訣

白豆蔻

丁香

檀香

木香

各二兩

藿香

甘草

各八兩

砂仁

四兩

蒼朮

八兩

厚朴

陳皮

各二兩

右姜棗水煎。入鹽一捻。

五絕死門

療五絕死方。

千金

夫五絕者。一曰自縊。二曰墻壁壓。三曰溺水。四曰斃寐。五曰

產乳絕。皆取半夏一兩。細下篩。吹一大豆許。納鼻中。即活。心下溫者。一日亦