

疫

痧

草

疫痧草自敘

余聞之父老曰肺胃蘊熱則發痧痧症輕自古無專書又曰瘟疫之症險變幻不測傳染無己者也顧瘟疫未嘗曰發痧發痧未嘗曰爛喉爛喉發痧實起于近年也發痧何以名疫爲爛喉而傳染于人也發痧何以爛喉凡人口鼻之氣上通于天天有鬱蒸之氣霆霧之施人自口鼻吸入着于肺胃肺主咽喉故疫痧多兼爛喉也疫氣者今昔之所同有也而近日疫氣何以發痧爛喉蓋今人氣稟不逮古人抑且起居失調所以疫厲之毒乘虛而干肺胃以致爛喉發痧也爛喉發痧興症必險氣息傳染死者甚衆良可哀也夫疫痧之症見象不一當汗當清其機甚微道不端鄙陋觀其象察其機偶有所得而遂筆之于書其草率無文故名曰疫痧草

嘉慶六年歲次辛酉仲秋虞山陳耕道自序于思誠廬

重刊陳氏疫痧草序

余家業兒醫四世先大父鳴岐公治疹痘最有聲於時自秉鴻從兄卽世而刀圭失傳然里中諸名家常與往還以余亦素心於方脈間有來診者固亦未嘗不實事求是也昨夕外科沙君耀榮幼科劉君德林持虞山陳氏疫痧草示余曰方今痧氣流行役使遠邇我輩從嘉慶戊辰癸酉兩次治疫痧後俱奉是書爲圭臬試輒有效惟原版遠在姑蘇吾淮珍藏無多偏僻邱墟從來未見非重鈔付梓廣爲布送恐痧毒燎原救之不及我輩轉於心自疚也頃有宋翁耀廷怵惕靡遑引爲已任己捐貲若干亟鳩鐫木之工求吾子序其簡端並可發明一二余聞之辟席謝不敏然耀榮德林兩先生虛衷而不自私實力以求普化宋翁向稱長者婆心傾助俾是書傳之枌榆羣生登之仁壽皆樂善君子也可多得哉可多得哉余維辰戌之歲初之氣民厲溫病卯酉之歲二之氣厲大至民善暴死終之氣其病溫寅申之歲初之氣溫病乃起丑未之歲二之氣溫厲大行子午之歲五之氣其病溫巳亥之歲終之氣其病溫厲又冬傷於寒春必病溫溫之爲病衆矣夫傷寒之邪從足太陽入溫熱之邪從手太陰入世以治傷寒之法治溫熱如鑿枘不合而汗下並行助虐滋甚葉天士溫熱論極精細

近時吳鞠通溫病條辨更爲眩備雖其說未必盡驗而初病忌辛溫癰瘍禁升提溫毒如咽痛喉腫耳前後兩頰腫均用普濟消毒飲去升麻柴胡初起并去芩連洵金鍼度人也顧疫癰爛喉向無專條而最傳染最迅速善治猶難矧誤投藥餌乎陳氏是書觀象察機體會而出序言疫氣吸自口鼻著於肺胃今人氣稟不逮古人抑且起居失調故疫厲乘虛以致爛喉發癰而險惡可哀也余因之有感矣金匱真言論曰夫精者身之本也故藏於精者春不病溫岐伯曰不相染者正氣存內邪不可干蓋疫氣穢濁未有不因少陽而自能上騰者如果少陰不虧少陽自伏經旨固明示人也且少陰主君火少陽主相火兩火相然故喉病至潰爛是書謂正陰虛而疫毒盛誠爲危疾有以也要而言之溫病熱變本速疫癰爛喉尤亟防內陷臨是症者於陳氏疎達清化兩劑間詳審而運用之則關鍵在手存活不少矣沙君又袖瘍醫大全第三十三卷所論癰瘍宣毒發表不可驟用苦寒亦攸關生命也沙君又謂是書未立吹嗽藥方當擇善而補綴於後吁余何知醫聊述所聞與是書互證并以質之

沙君劉君

道光十八年歲實戊戌春二月之杪松巢萬鏞書於慈竹凌寒草堂

重刊陳氏疫痧草序

疫痧草者虞山陳氏所著吾浦萬杏村先生及沙劉兩君所續刻也自遭兵燹鋟板無存去秋予晤劉君漢臣劉君謂予曰近來天道南行恐疫痧復作篋中贍有疫痧草一帙擬卽措貲重刊爲先患之防未幾是證果行且多天札予服劉君之先見而亦搜得一編見其辯證之精詳製方之精當尤爲壽世良編思有以副劉君救世之志焉適晤陸君曜堂爲述劉君前意促以共襄此舉陸君亦憫斯證之險聞予藏有是編索而閱之大加歎服因以共成其事嗟夫劉君固治未病者也陸君亦計將來者也一則觀象察幾爲豫防之計一則婆心濟世殷樂善之懷此兩人者洵可風矣予非業醫者緣兩君翻刻是書並商於予予遂樂爲之序板旣成命手氏藏之所願有心濟世者見是書而廣爲流傳未始非活人之一助也

光緒辛巳夏五月袁江虎臣程人彪謹序

疫癥草目錄

疫癥辨論章

辨論疫癥名義

辨論疫邪所干臟腑

辨論疫癥正陰不足

辨論避疫氣

辨論發癥有疫無疫

辨論疫邪迅速一感即發

辨論疫癥愈後宜謹慎調攝

疫癥見象章

發熱

得汗

不熱

不得汗

癥達

辨論疫癥治法

辨論疫毒感染

辨論疫氣所結

辨論疫邪所由來

辨論疫邪所干臟腑不同傷寒

辨論治疫癥法不同治傷寒

辨論時癥見象治法

形色

癰發癰沒

舌色

毒涎

神煩

軀睡

鼻煤

失音

便閉

肌癢

唇

咳嗽

目赤

部位

脉象

爛喉

穢氣

神昏

鼻瘻

牙關拘急

呃逆

便溏

肌燥

齒乾

不咳嗽

嘔

氣促

面色

鼻衄

溺濁

腹痛

牙疳

虛癆

附見象總論

疫癰湯藥章

疏達之劑有小序

葛根湯

豉香散

清散之劑有小序

譴語

惡寒

嘔惡吐衄

渴

毒泡

遺毒

妊娠發癰

加減葛根湯

葛犀湯

犀豉飲

清化之劑有小序

犀角地黃湯

犀羚二鮮湯

奪命飲

清肺飲

不奪之劑有小序

雙解散

四虎飲

救液之劑有小序

五鮮飲

育陰煎

附湯藥總論

經驗吹藥十寶丹

又嗽喉神方

又敷方

又牙疳神方

又驅癰避邪法

疫痧草辨論章

辨論疫痧名義

輕駿按時痧不傳染而
疫痧易傳染而重
瘡達則喉爛輕痧同源異派
則喉爛劇不必拘拘伏派
治喉只要化疫透痧
自可化險爲夷矣

痧。方書名癰疹。浙人呼爲瘡子。其病輕。自古無專書也。至石頑醫通始有癰疹一種。其書曰。
癰疹者。手足太陰陽明蘊熱所致。邇來癰疹變幻百出。其危有甚於痘者。書中諸論極詳。至
喉爛之說。疫毒之名。未之加也。而近年發痧。大半爛喉。且復重險。何也。感疫毒也。感疫輕則
喉爛輕而痧亦輕。感疫重則喉爛重而痧亦重。重者最易傳染。往往一家連斃數口。可謂險
而又險也。

辨論疫痧治法

瘡按爛喉疫痧。雖以
喉爲主。第痧達則邪
有出路。喉爛自鬆。痧
伏則疫邪內閉。喉爛
增劇。予見以爲喉之
輕重。係乎痧之達伏。
精氣神乃人身三寶。更
細若神傷。猶可治。而
傷氣傷神。則更沉療。

吉凶。

辨論疫邪所干臟腑

駿按疫毒入於肺胃。猶可使其化癥從皮毛。肌肉以泄其邪。若直犯心包。則至危。或牛黃丸。紫雪丹。或可挽救。萬一。

爛喉。疫癥。疫毒自口鼻吸入。干於肺胃。盛者直陷心包。口鼻之氣通於天。天有鬱蒸之氣。霾霧之施。人自口鼻吸入。著於肺胃。肺主咽喉。故疫癥多見爛喉也。至於神昏。其疫毒已陷心包。如暑氣之歸心矣。

辨論疫毒感染

疫癥之毒。有感發。有傳染。天有鬱蒸之氣。霾霧之施。其人正氣適虧。口鼻吸受其毒而發者爲感發。家有疫癥。人吸受病人之毒而發者爲傳染。所自雖殊。其毒則一也。

辨論疫癥正陰不足

發癥有正虛。有陰虛。正陰虛而疫毒盛。誠爲危疾也。正虛疫盛者。灼熱無汗。喉爛。神昏。癥隱成片。而脉細如絲。軟如綸。正氣欲脫。疫邪直干臟腑矣。陰虛疫盛者。無汗灼熱。神昏。喉爛。癥不虛者。疫邪不能所奉。其人壽足。見正陰不虛者。疫邪不重。而正虛也。若疫重而正虛。誠爲危候。其斃可立。虛而待然。一息尚存。可扶正以助。汗正以安。坐視可也。豈容以唯立。可挽教萬一。

辨論疫氣所結

潤按此則言疫悉本天時地氣失常立論。至若人事全未道及如明末流寇張獻忠李自成暴戾恣睢殺人盈野屍穢鬱蒸釀成巨疫吳又可因而著溫疫之論此又非著天時地氣所關學者弗可弗審。

疫厲氣也。厲氣何自而結。結于天應寒而反大熱。或大寒之後繼以大熱。大熱之後繼以霾霧。大熱之後繼以大寒。大寒之後繼以淫雨。或河水泛而氣穢。或疾風觸而氣毒。或天久陰而鬱熱。或天盛暑而濕蒸。此疫氣之所由結也。然此特于有象求之。天之布疫也。象無可擬。或布一方。或布一家。有感有不感者數也。

辨論避疫氣

駿按避疫之法。內經正氣存內邪不可干之說最精。夫疫往往乘虛而襲。若經有疫。之區切忌。先自氣餒。不能屏則一吸而入。直達氣海。受疫轉深。尤忌掩鼻屏息設息。甲乙兩人同行。嘗見甲乙兩過。甲見之而掩鼻覺其臭氣衝腦。乙未見而談笑自然。毫無所覺。蓋人之呼吸有常度。一切外片時則偶然。若屏息外。則偶無所覺。蓋人之呼吸有常度。一切外片時則偶然。

醫者日至疫家。必有避忌之法。或曰。視疫病也。宜飽不宜飢。宜暫不食。宜日午不宜早晚。宜遠坐不宜近對。卽診脉看喉亦不宜與病者正對。宜存氣少言。夜勿宿于病者之家。鼻中可塞辟疫之品。以上之法皆有象之避也。至于無形之感觸。數也。無從而避之也。一日羣醫在疫家診病。一醫年最老。主人問曰。疫之傳染于人人所知也。而醫者日至疫家。必有避忌之法。或曰。視疫病也。宜飽不宜飢。或曰。診疫脉也。坐宜偏不宜對。或曰。醫至疫家不一。然所至之家俱暫而不久。一診之後。議論定方。未必卽在疫病之房。其氣不能攔入。若屏息外。則偶無所覺。蓋人之呼吸有常度。一切外片時則偶然。

感氣淺。所以傳染少也。老者默然。主人叩之。曰。諸公之說俱是。然余之言異乎諸子之說。疫

氣反得乘之避疫者不可不知

邪。厲氣也。厲氣不勝正氣。醫者至疫家。診脉定方。殫心竭慮。必求危病得安而後快。是正氣也。在我有正氣。在外之厲氣。何自而干之乎。余聞其言。心甚敬服。而筆之于書。

辨論疫邪所由來

駿按種痘取巧先天伏毒未盡發泄。誠有是理。此今之痧。所以重于昔之痧也。雖然未可一概而論。膏癰之輩。蓋覆過溫熱。先天數天時人事醞釀而生。水火之餘。人多於旱。久旱則傷陰。更暗傷陽。內伏陰。黎藿之輩。飢飽失常。污穢不潔。足以釀疫。更有久旱久潦。兵燹之後。人多餓。天時人事醞釀而生。此又關於定數。

疫痧之發。昔日少而近日多。昔日輕而近日重重者死。而死者多。不可不考其所由來也。其所由有四。疫毒。厲。千臟腑。氣稟薄。易吸受。種痘甚行。胎毒未清。起居不調。疫毒易干。疫氣今昔之所同有也。然往昔疫邪。未聞發痧。往昔發痧。未聞爛喉。疫痧者。疫毒直干肺臟。而喉爛。氣穢盛者。直陷心包。而神昏不救。瞬息之間。命遂夭殂。毒氣傳染。枉死甚衆。疫厲之重。良可哀也。然人之氣稟厚。正氣旺。精神強固。氣血充和。呼吸之間。疫毒無自而干。卽或氣稟薄。正氣弱。而能寡嗜慾。節飲食。調寒暖。以慎起居。使臟氣和諧。精神清暢。疫毒雖厲。究亦邪不勝正。否則疫毒之干。誠易易也。痘是借溫熱之邪。以發先天之毒。邪盛毒重。十斃五六時。痘纏縣盈村累巷。而種痘之法。俟其溫熱不蘊積之時。發其先天一二分之毒。種之得法。十不失一。簡便靈妙。無逾于此。種痘之法。是假人巧。以息危疾。而疫痧之行。又因人巧。而致危症。自出之痘。胎毒輕。則痘輕。胎毒重。則痘重。先天之毒。必盡達乃已。而種痘者。胎毒雖重。不過發的有此理。

其一二。其餘胎毒。仍蘊而未發也。毒未發而疫毒干之。則二毒混淆。若火燎原。津液爲之涸。臟腑爲之腐。得其疾者。危殆不救。疫癰之行。非因人巧而致危症乎。然因疫癰而舐種痘。則又非也。胎毒雖盛。氣稟雖薄。疫厲雖重。而能寡嗜慾。節飲食。調寒暖。消疫癰之患于無形者。亦未嘗無之。所謂人定可以勝天也。卽或寡嗜慾。節飲食。調寒暖。而終不免爲疫癰傳染者。天也。人不得而知之矣。

辨論發癰有疫無疫

潤按溫熱之邪何嘗不自口鼻吸入。特無疫毒之重耳。疫癰爛喉。原是溫熱之症。其症無疫者。輕有疫者。險無疫者。病雖重而死者少。究其由無疫而發癰。無疫而爛喉。則溫熱之邪僅在經絡。疎而達之。故易鬆解。若觸毒而發癰爛喉。一時俱見。則溫熱之毒深藏臟腑。故病重。病重者重用疎達。而癰反隱。神反昏。喉爛反盛者。往往有之。何也。溫熱之邪自肌表。感冒溫熱之毒。自口鼻吸入。肌表感冒者。邪在經絡。疎以達之。得汗卽鬆。口鼻吸入者。毒在臟腑。疎以達之所以反險也。

辨論疫邪所干臟腑不同傷寒

傷寒傳徧六經。而疫癰之邪不傳徧于六經也。其感冒疫邪在肺胃。甚者直陷心包。如嘔惡、

相徑庭。疫邪由口鼻而入首犯肺胃者甚。直陷心包以傷寒之法。治疫固誤。即以治溫之法。治疫亦尙有非兼辟穀解毒無以清其源也。

呃逆舌絳口渴牙關拘急等象。是邪據陽明。而陽明病象見也。如鼻搧。鼻煤。喉爛。氣穢。失音。丸頭等象。是邪犯太陰。而太陰之病象見也。如神煩。神昏。鼾睡。譫語等象。是邪干心包。而心包之病象見也。肺胃在身半之上。主乎口鼻。疫邪自口鼻而入。故其邪多據于肺胃。而心包與肺胃相近。宜乎陷心包之徑捷也。其餘他臟。或火盛而波及。未必疫邪據此矣。

辨論疫邪迅速一感卽發

疫之爲病。一感卽發。未發之前。安然無恙也。旣發之後。迅若雷電也。醫者。全在視其感疫之輕重。觀其正陰之虛實。正陰虛而感疫重。一發卽多犯象。感疫輕而正陰實。其發自有順機。其犯象也。其順機也。亦必身熱癰見。而后定之。不能因弟發癰。而決兄不發也。亦不能因兄發癰。而決弟之必發也。亦有兄發癰。而預使弟服藥。盍因弟發癰。而使兄他居之爲妙乎。他居之而亦發癰者數也。人不得而知之矣。若論如傷寒之有伏邪。而后發。何以病疫之家。兄發而弟亦發。此發而彼亦發。天然之巧。伏邪人聚于一家乎。若論感疫久之而后發。何以朝見兄病而夕卽弟病。更有親來視病。而卽染病乎。總之醫者。在乎視其感疫之輕重。觀其正陰之虛實。而定其病勢之順險。其險其順。能于一發之時。決而無悞。斯爲老眼。

辨論治疫痧法不同治傷寒

疫痧之火。迅如雷電。身熱一發。便見爛喉。神呆。痧隱肌赤。不分顆粒。其毒火炎炎。灼傷臟腑。在片刻間爾。安能如傷寒之傳變六經。歷日久哉。其治法必如傷寒之疎達既透。而后清之化之。則恐十死八九矣。治疫痧者。在疫火未肆之前。而先化其火。則其火漸化。其病漸鬆。在疫火既肆之后。而后化其火。吾恐化之無益矣。汗雖無身灼熱。痧雖隱無顆粒。脉雖鬱。喉已腐。舌雖垢。神已煩。疎不兼清。每多凶。達而兼化。每多吉。必如傷寒症之疎達既透。而后清之化之。豈非十死八九哉。故以治疫痧之法。治傷寒不可以。治傷寒之法。治疫痧亦不可。然善治疫痧者。必善治傷寒。善治傷寒者。必善治疫痧。善治疫痧傷寒者。亦必善治雜症。神而明之。存乎其人也。善治疫痧傷寒雜症者。推其理而齊家治國。何莫非擴而充之之道哉。范子曰。不爲良相。卽爲良醫。此之謂也。

辨論疫痧愈後宜謹慎調攝

潤按無形之邪每借
有質爲依附。痧後餘
焰尚存。不特堅硬。亦應
冷宜禁。即飲食亦

痧後調攝最宜謹慎。調攝不善。豈特痧後虛癆。種種惡症。隨其所犯而乘之。曾見食堅硬而腹脹死。食生冷而水腫死。如此之類。不可勝記。疫痧之症。毒火內熾。津液爲之涸。臟腑爲之

多頓少食防其食復
瘡後食堅硬生冷必
腹脹水腫而死乃胃
陰脾氣傷而未復之
故

駿按時瘡次于疫瘡
喉雖腐口不臭身雖
熱神不煩瘡雖密色
不暗辛涼疏達易透
易解反是則爲疫瘡
矣

傷其後病愈未久。或火雖退而正氣甚虛。或正既虛而餘火未淨。偶有所犯。則邪火復熾。正如搘糞牆折朽木。往往有直干臟腑而立斃者。夫疫瘡惡症。其愈甚難。瘡後不慎。其斃甚易。思既愈而復斃之可畏。自必謹慎調攝已。

辨論時瘡見象治法

時瘡次於疫瘡也。身乍熱而瘡細隱約。無汗脉鬱。喉爛神煩者。疫瘡也。身發熱而咳嗽神清。有汗喉不腐。數日後瘡點乃見。三三五五零星散布。又數日咳盛脉大。或兼便溏。瘡形轉大。轉多大塊。雲密肌膚赤焮。此爲大塊時瘡。次於細小疫瘡也。夫大塊瘡未必必無疫。必不死也。細小瘡未必必有疫。必死也。瘡雖細小。而熱不盛。神不昏。脉有胃氣。喉不腐爛。無疫毒之伏。非必死之症。然大塊之瘡無疫者多。死者少。細小之瘡有疫者多。死者衆。細小之瘡熱不盛。喉不腐者。俗名爲風瘡。非疫瘡也。不以此例也。大塊之瘡亦如疫瘡之易於傳人。而死者少。余故以時瘡目之。疫瘡治法已悉此。特以時瘡之見象治法言。時瘡者。風溫時邪在經絡。無疫毒干臟之患。身熱而有汗。咳嗽而神安。其發也遲。始則三五散布。繼則赤焮雲密。自發至退。常十