

痢症參字訣

保嬰要旨

引痘畧

溫熱

保辨

陳修園醫書五十種

二六

R2-51
34-4

春字

溫訣

三

春溫三字訣

成都張子培先生著

溫爲病。雖分類。

後世有風溫濕溫暑溫瘟疫等名。方書更創出大頭瘡等名。愈多治愈亂。予所論者風溫也。知此則一以貫之矣。

當顧名思其義。

既曰溫。則非寒矣。今醫之不能治此。由於不識其名耳。名且不識。從何施治。

仲景書發凡例。

仲景太陽篇一節。爲溫病之祖。傷寒論中特爲提出立論者。謂此症與傷寒迥異也。不出方者。謂書本爲傷寒而作。論少方少。恐其掛一漏萬也。論多方多。恐其強賓壓主也。

後之醫。仍寒治。

劉河間、張子和、李東垣、朱丹溪。辨焉不精。語焉不詳。然猶不敢妄用參朮薑附也。至張景岳、薛立齋輩。則妄用矣。仍是治寒法也。

方藥雜。死亡繼。

後人九味羌活湯、人參敗毒散、逍遙散、香蘇飲等。皆知不敢用麻桂而設。似已窺見

一斑。然而仍用辛溫。百治百死。不過較用參芪朮棗者。差緩須臾耳。傷心目三字作。

仲景本論祇九十二字。字字是溫。字字不是寒。今人以治寒法治溫。百治百死。卽有身體強壯。幸而不死者。則有拖延日時。傾破家產。邪熱久留於臟腑。新邪引動於經絡。至他年重感。亦必身死。滔滔皆是。喚醒無從。予目擊心傷。此所以有三字訣之作也。

何謂溫。溫是熱。

旣名曰溫。則非寒也。今醫強名此症爲寒火。名不正則言不順。事不成矣。

與傷寒殊懸絕。

如此辨明。而仍以寒法治溫病。用桂枝湯、麻黃湯、葛根湯、小柴胡湯。不肯用心。甘願殺人者。吾知其報在子孫矣。行道者宜何如之。兢兢哉。

初起時口渴別。

傷寒初起不渴。溫病初起卽渴。以此分別。然溫亦間有不渴者。但渴者多。不渴者少耳。

不惡寒。惟發熱。

仲景云。太陽病發熱而渴。不惡寒者。名曰溫病。共十六字。余後

按漢文簡質。此症初起。多有微惡寒者。斷無不發熱者。但二三日則全不惡寒。惟發熱矣。此症初起間有不口渴者。但二三日斷無不渴矣。且傷寒多左手脈大於右手。溫病脈多右大於左。溫病初起多兩寸脈大。右寸尤盛。

附子培註仲景原文

單行為原文。雙行為予註。

張子培曰。悟溫病者。古有劉河間等。今有薛生白等。然亦未將太陽病溫病五字分清。夫既曰太陽病矣。何得發熱云云。又曰溫病。今特拈出。以見狂瞽者之千慮一得。太陽病。或已發熱。或未發熱。必惡寒。前明發熱而渴。不惟無必且才惡寒。熱而渴。症如此者。太陽病也。吾得確而指其名曰溫。冬傷於寒。春必病溫之。溫病。

麻杏湯。有神力。

用麻黃湯桂枝湯者。無論矣。用人參敗毒散逍遙散者。亦以五十步笑百步也。亦可用銀翹散。桑菊飲。可謂此症暗室一燈。然予以爲不如仲景麻杏石甘一方爲如神也。故予每用銀翹桑菊二方。皆加生麻絨七八分。或一二錢。功效倍於本方百倍。但此症初起。麻黃可用。至二三日後。舌變胭脂色。則風盡化熱矣。麻黃斷斷不可用。用必危殆。以麻黃太熱故也。

或銀翹。或桑菊。

銀翹散爲辛涼平劑。桑菊飲爲辛涼輕劑。白虎湯爲辛涼重劑。吳鞠通法也。妥甚。以辛涼解表劑。

或謂傷寒宜解表。溫病忌發汗。夫傷寒解表。令出外也。然則溫病忌汗。令內入乎。不通之甚。蓋傷寒以辛溫解表。溫病以辛涼解表。解表同而辛溫辛涼大異焉。昧昧者。無論矣。乃高明之家亦出此語。甚矣積習之難除也。

誤辛溫變重病。

辛溫辛涼。乃此症之生死關頭也。時醫略而不講久矣。

小遷延。大殞命。

言誤治之害有如此者。但近日醫家不究見識之非。病家不悟醫人之誤。皆曰生死有命。吾亦曰生死有命而已。

口大渴。津液傷。

此症始終以救津液爲主。甘寒法也。陳修園謂四逆湯麻黃附子細心湯等。以附子而救津液。雖在傷寒。終屬強解。況溫病乎。今人一見溫病。陽極似陰。妄引陳氏言。竟用薑附。著眼著眼。

或白虎。承氣湯。

此症若先以辛涼解表。繼以苦甘化陰等法。無不愈矣。因誤治變重。非二湯力不能。

勝。

雖飲熱亦屬陽。

間有口大渴而飲熱湯。不肯飲冷。且畏飲冷。更有舌爲沸湯起泡者。此陽極似陰重症也。時醫一見飲熱。皆謂陰症。妄投桂附。下咽立斃。特爲拈出。切忌。切忌。

治之法。急下良。

急以三承氣湯選擇用之。或白虎亦有用者。但此法祇可用在風溫。若別症喜熱。多屬陽虛。本宜薑附。妄用承氣。立斃。慎之。

若譫語。舌紅黃。

此症全憑驗舌。初病多無苔。然舌色必紅。便宜辛涼解之。半表半裏則白。入裏則黃。甚則墨色。難治矣。

在包絡。非胃腸。

傷寒譫語。承氣下之。邪在腸胃也。此症邪在包絡也。非一下可解。竟用承氣。誅伐無過也。特爲拈出。

用紫雪。清宮湯。

輕症清宮湯。又清絡湯可愈。若重症則不可恃矣。須得紫雪。與至寶及牛黃。

紫雪、至寶丹、安宮牛黃丸三方。芳香解穢。清輕透絡。鎮重安神。寒涼退熱。眞此症起死回生神方也。

至病久。氣液損。

傷寒傷陽。故用甘溫。溫病傷陰。宜用甘寒。又此症之生死關頭也。切記切記。宜甘寒補而潤。

如復脈湯去薑桂大棗。竹葉石膏湯去半夏。甚去人參。甘寒法也。卽喻嘉言清燥救肺湯。亦可間用。若氣液傷損。兼大熱譫語。是體已虛。邪仍實之候。最爲危險。予每用炙草五六錢。以大補中氣。生地麥冬各一二兩。以滋陰液。大黃芒硝各四五錢。及七八錢。以蕩實邪。應手而愈多矣。但症危如此。必憑脈以驗症。脈弦者生。脈濇者死。脈弦爲陰氣未盡。脈濇爲陰血已竭。所謂陰症見陰脈是也。

卽下利二甲症。

傷寒下利。非白通四逆不能回陽。此症下利。只用龍牡鎮濇存陰而已。不用溫補也。然此就久下利而言。故用堵濇法。若在病初。身熱口渴。下利舌黃。胸痞脈數。此又溫邪下注大腸之症。所謂協熱而利是也。當用黃芩葛根桔梗豆卷之屬。以升泄溫邪。二症辨之不清。生死立判矣。變紛更。此大概。

予所閱歷者。有用大黃七八錢。芒硝四五錢。下至二十餘日而愈者。成都府庠生百善。叙州府庠生張正。是也。有先用芒硝大黃三五錢。服一劑而病大增。次日衆謂藥誤。予謂病重藥輕。硝黃各加一二倍而愈者。鹽署典史林竹齋。華陽監生江曉帆。是也。有病已大減。而爲寒阻遏。下不能通。先用理中微加附子一小劑。以驅其陰。腸痛卽止。更用六味湯加大黃以養陰蕩邪。一劑而愈者。則彭雲峰之長子也。有誤汗誤下。誤用滋膩。誤用苦寒。病至十五六日。壯熱不解。予自遠歸。遵喻嘉言先生法。用麻黃附子細辛湯一劑。而熱清去十之八九。後用回陽法。略帶滋陰。施治半年餘而愈者。則予子小培也。按後二法風溫中百難一見者不可輕用凡此者不可勝數。蓋此症變遷極速。極歧。茲不過言其大概。然而會心者。處處與傷寒對看。可卽始以見終矣。

知寒溫能涵蓋。

凡病不外陰陽。知治傷寒。能治陰病矣。知治溫熱。能治陽病矣。雖有陽極似陰。陰極似陽。陽七陰三。陰陽錯雜之不同。而理本一貫。認的陰陽。投無不利矣。

一切病迎刃解。

此二病萬病之綱也。綱舉則目張。萬殊可歸於一本。目張由綱舉。一本可發爲萬殊。卽以此症而推彼。如吳又可所論之瘟疫。是天地之厲氣。刀兵饑饉之餘。人從口鼻而受者。老子所謂大兵之後必有凶年。是也。其症大寒大熱。口渴身痛。脈浮洪而數。

全類傷寒風溫。惟初起滿口舌胎白而且厚。或有黃色。甚則黑矣。面如油垢。即是症。用達原飲如神。且非此無以搗銳而攻堅。彼陳修園吳鞠通舒馳遠輩。竭力訾詆胡爲哉。又如疙瘡瘟初起。與寒溫同。惟頭面疙瘡。如無名腫毒然。用銀翹桑菊二方加減。亦效。然不如升降散之靈妙敏捷也。又如溼溫初起。與前三症亦同。但舌上有苔而薄。胸膈痞悶。口渴不喜飲水。卽飲水亦不能多。受爲獨異。或四肢骨節麻木酸疼。法宜辛涼淡滲。如滑石木通杏仁半夏及苡仁厚朴竹葉菊花荊芥之屬。秋燥初起。以肌膚燥煖神氣衰少爲獨異。有外感者。蘇葉荊芥薄荷玉竹石膏梨皮麥冬貝母之屬。無外感者。喻氏清燥救肺湯。滋液救焚湯之屬。法宜辛涼清潤。一切外症。可由此正面推。卽一切內症。可由此反面推矣。但難爲不肯讀書不肯用心者望也。

附方

麻杏石甘湯

麻黃 四錢 杏仁 三錢 石膏 八錢 生甘草

張子培按分兩必須因病輕重加減。不可竟用古法。

辛涼平劑銀翹散方

連翹 一兩 金銀花 一兩 苦桔梗 六錢 薄荷 六錢 竹葉 四錢 芥穗 四錢 生甘草 五錢 淡
豆豉 五錢 牛蒡子 六錢

右杵爲散。每服六錢。鮮葦根湯煎香氣大出。卽取服。勿過煮。肺藥取輕清。過煮則味厚而入中焦矣。病重者約二時一服。日三服。夜一服。輕者三時一服。日二服。夜一服。病不解者。作再服。蓋肺位最高。藥過重則過病所。少用又有病重藥輕之患。故從普濟消毒飲時時輕揚法。今亦間有辛涼法者。多不見效。蓋病大藥輕之故。一不見效。遂改弦易轍。轉去轉遠。卽不更張。緩延至數日後。必成中下焦矣。胸膈悶者。加藿香三錢。護膈中。渴甚者。加花粉。項腫咽痛者。加馬勃。元參。衄者。去芥穗。豆豉。加白茅根三錢。側柏葉三錢。梔子炭三錢。咳者。加杏仁。利肺氣。二三日病猶在肺。熱漸入裏。加細生地。麥冬。保津液。再不解。或便短者。加知母。黃芩。梔子之苦寒。與麥地之甘寒。合化陰氣。而治熱淫所勝。

張子培曰。按此病初起用此方。每加麻黃一二錢。功效倍捷。但三四日後舌變紅黃。則不可用矣。

桑菊飲方

杏仁 二錢 連翹 一錢 薄荷 八分 桑葉 二錢 苦桔梗 二錢 黃菊花 一錢 甘草 八分 葦根 二錢

右水二盞煮取一盃。日二服。二三日不解。氣粗似喘躁。在氣分者。加石膏。知母。舌絳暮熱。邪初入營。加元參二錢。犀角一錢。在血分者。去薄荷。葦根。加麥冬。細生地。玉竹。

丹皮各二錢。肺熱甚。加黃芩。渴者加花粉。

白虎湯方

石膏 八錢 知母 三錢 生甘草 錢半 白粳米 四錢

調胃承氣湯方

大黃 四錢 炙甘草 二錢 芒硝 二錢

小承氣湯方

大黃 四錢 厚朴 二錢 枳實 一錢

大承氣湯方

大黃 四錢 厚朴 三錢 枳實 三錢 芒硝 三錢

紫雪丹 有張子培按方原

滑石 一斤 石膏 一斤 寒水石 一斤 磁石 水煎二斤去渣入後藥 犀角 五兩 沈香 五兩 丁香 一兩

升麻 一兩 元參 一斤 羚羊角 五兩 木香 五兩 炙甘草 半斤

以上八味並搗剉。入前藥汁中。煎去渣。入後藥。

朴硝硝石各二斤。提淨。入前藥汁中。加火煎。不住手將柳木攪。候汁欲凝。再加入後

二味。

辰砂 三兩 麝香 一兩 研細。合成。退火氣。冷水調服一二錢。

清宮湯

元參心

三錢

蓮子心

五分

竹葉捲心

三錢

連心麥冬

三錢

連翹心

二錢

犀角尖

二錢

加減法。熱痰盛。加竹瀝梨汁各五匙。咯痰不清。加括囊皮一錢五分。熱毒盛。加金汁人中黃。漸欲神昏。加銀花三錢。荷葉二錢。石菖蒲一錢。

清洛湯

羚羊角

三錢

川貝母

二錢

連翹

二錢

連心麥冬

四錢

知母

二錢

石斛

二錢

青蒿

二錢

花粉

二錢

至寶丹

犀角

一兩

硃砂

一兩

琥珀

一兩

玳瑁

一兩

牛黃

五錢

麝香

五錢

以安息重湯燉化。

和諸藥為一百丸。蠟護。

安宮牛黃丸

牛黃

一兩

鬱金

一兩

犀角

一兩

黃連

一兩

硃砂

一兩

梅片

二錢

麝香

五錢

真珠

五錢

山梔

一兩

雄黃

一兩

黃芩

一兩

金箔衣

右為極細末。煉蜜為丸。每丸一錢。金箔為衣。蠟護。虛者人參湯下。脈實者銀花薄荷湯下。每服一丸。兼治飛尸卒厥五癰中惡。大人小兒瘰癧之因於熱者。大人病重體實者。日再服。甚至日三服。小兒服半丸。不效再服半丸。

復脈去薑桂湯

炙甘草 六錢 乾生地 六錢 生白芍 六錢 麥冬 五錢 存心 阿膠 三錢 火麻仁 三錢

竹葉石膏去參半湯

鮮竹葉 三十片 石膏 八錢 麥冬 五錢 去心 炙甘草 二錢 粳米 八錢

清燥救肺湯

霜桑葉 三錢 石膏 二錢 甘草 一錢 生 黑芝麻 三錢 人參 七分 麥冬 一錢 存心 杏仁 一錢 去皮

真阿膠 一錢 枇杷葉 一錢 炙 痰多加貝母 血枯加生地黃 熱甚加犀羚二角

二甲湯

生牡蠣 八錢 生鼈甲 四錢 再加龜板四錢 名三甲湯

達原飲

檳榔 二錢 厚朴 一錢 草薢仁 五分 白芍 一錢 知母 一錢 黃芩 一錢 生甘草 五分

升降散

白殭蠶 酒炒 二錢 蟬蛻 一錢 薑黃 五錢 生大黃 四錢 細末分四服 冷黃酒一盃 蜂蜜五

錢沖下

資液救焚湯

生地黃 二錢 取汁 連心麥冬 二錢 取汁 生犀角 三錢 磨汁 生薑汁 二錢 匙 真阿膠 一錢 炙甘草 一錢 麻

仁五分 柏子仁七分 人參一錢五分 紫石英一錢 滑石一錢 寒水石一錢 打碎三分 末五

味子五分 味可以不用

右除生地麥冬犀角生姜四汁及阿膠共八味。用名山泉水子培按新汲水亦可。四茶盃。緩煎至一茶盃半。渣入四汁及膠。再緩火畧煎。至膠化斟出。入牛黃末五釐。分二三次熱服。

張子培曰。按諸方不止治一溫病。而治溫病者亦不止此數方已也。然能由此數方對面旁面側面而會通焉。則謂數方為萬病之權輿可也。僅溫病云乎哉。不然。刻舟求劍。即溫病亦一步不可行也。

春溫三字訣終

痢疾

症訣

三