

續名醫西類案

續名醫類案卷三十四

錢塘魏之琇編集

海昌王士雄孟英
定州楊照藜素園
同校

時毒

此症感四時邪毒之氣其發于鼻面耳項咽喉赤腫無頭或結核有根寒熱頭痛狀如傷寒此乃時行溼毒之氣發於頭面所謂大頭瘟也以其能作膿出毒故入外科

少宰李蒲汀患時毒用發散之藥耗損元氣患處不消體倦惡寒食少口乾用益氣湯加桔梗及托裡消毒散而愈

秋官陳同野患時毒元氣素弱脈微細而伏此形病俱虛也用參朮芎歸陳皮柴胡升麻炙草以升舉陽氣用牛蒡元

參連翹桔梗以解熱毒二劑腫頓消而脈亦復矣苟以脈微細爲屬陰以腫赤爲屬陽而藥之鮮有不誤者

一婦人時毒潰後腫赤不消食少體倦膿清色白乃脾肺氣虛也先用六君加桔梗芎歸後用益氣湯加桔梗而斂春官袁谷虛之妹患時毒表散過度腫硬不痛脈浮大按之而短此真氣絕也辭不治後果歿

一男子患此症腫痛發熱作渴脈實便秘以五利大黃湯下之諸症悉退以葛根牛蒡子湯四劑而痊

一男子患此症表裡俱解腫痛尙不退以葛根升麻湯二劑而腫消

一男子患此症，腫痛發寒熱，脈浮數，以荆防敗毒散二劑少愈，以人參敗毒散二劑勢減半，又二劑而痊。

一男子患此症，耳面赤腫作痛，咽乾發熱，脈浮數，先以荆防敗毒散二劑勢退大半，以葛根牛蒡子湯四劑而痊。

一婦人患此症，表邪已解，腫尚不消，診之數脈滑而數，乃瘀血欲作膿也，以托裡消毒散潰之而愈。

一男子患此症，焮腫脹痛作渴，煩熱便秘，脈數按之尤實用，防風通聖散一劑諸症頓退，以荆防敗毒散加元參牛蒡黃芩二劑而痊。

一老人冬月頭面耳項俱腫痛甚，便秘脈實，此表裡俱實病。

也。飲防風通聖散不應，遂砭患處，出黑血，仍投前藥，卽應。又以荆防敗毒散而瘳。蓋前藥不應者，毒血凝聚上部，經絡藥力難達故也。惡血既去，其藥自效。或拘用寒遠寒，及年高畏用硝黃，而用托裡，與夫尋常之劑，或不砭泄其毒，專假藥力，鮮不危矣。徐靈胎曰：通聖散乃治表裡俱熱之方，所謂兩解法也。須審定內外俱熱之症，乃可消息施用。又曰：荆防敗毒散爲時毒主方，惟人參不宜輕用。

一男子患此症，表裡俱解，惟腫不消。以托裡消毒散四劑，膿成針之而愈。

一婦人患此症，腫痛用硝黃之劑，攻之稍緩，翼日復痛。診之外邪已退，此瘀血復作膿也。用托裡消毒散潰之而愈。

一男子頭面腫痛。服硝黃敗毒之劑。愈甚。診之脈浮數。邪在表。尙未解。用荆防敗毒散二劑。勢退大半。更以葛根牛蒡子湯四劑而痊。內經曰。身半以上腫。天之氣也。身半以下腫。地之氣也。乃邪客心肺之間。上攻頭目而爲腫。此感四時不正之氣爲患。與夫膏粱積熱之症不同。硝黃之劑。非大便秘實。不可用。若不審其因。不辨其虛實。表裡概用攻之。必致有悞。常見飢饉之際。芻蕘之人多患之。乃是胃氣有損。邪氣從之爲患。不可不察。常治邪在表者。用葛根牛蒡子湯。人參敗毒散。或普濟消毒飲。子邪在裡者。五利大黃湯。梔子仁湯。表裡俱不解者。防風通聖散。表裡俱解而

腫不退者犀角升麻湯如腫甚者砭患處出惡血以泄其毒。或用通氣散取嚏。以泄其毒。十日外自愈。若嚏出膿血。即愈。欲其作膿者。用托裡消毒散。欲其收斂者。用托裡散。此法最爲穩當。五七日咽喉腫閉。言語不出。頭面不腫。食不知味者。不治。

此乃時行慳毒之氣發於頭面。所謂大頭瘟也。以其能作膿出毒。故入外科。

一男子患此症。服表散藥。愈熾發熱。便秘診其脈沈實。此邪在裡也。以大黃湯下之。裡症悉退。以葛根牛蒡子湯浮腫亦消。惟赤腫尙存。更以托裡藥潰之而愈。齊氏云。時毒者爲四時邪毒之氣。而感之於人也。其後發于鼻面耳項咽喉。赤腫無頭。或結核有根。令人增寒發熱。頭痛或肢體痛。

甚者恍恍不寔咽喉閉塞昧者將謂傷寒便服解藥一二日腫氣增益方悟始求瘍醫原夫此症古無方論世俗通爲丹瘤病家惡言時毒切恐傳染考之于經曰人身忽經變赤狀如塗丹謂之丹毒此風熱惡毒所爲與時毒特不同耳蓋時毒初起狀如傷寒五七日間乃能殺人治者宜精辨之先診其脈滑數浮洪沈緊弦瀉皆其候蓋浮數者邪氣在表也沈瀉者邪氣深也氣實之人急服化毒丹以攻之熱實不利大黃湯下之其有表症者解毒升麻湯以發之或年高氣軟者五香連翹湯主之又於鼻內噓通氣散取十餘噓左右看病之人每日用噓藥噓之則不傳染

其病人每日亦用噓藥三五次。以泄熱毒。此治時毒之良法也。經三四日不解者。不可大下。猶宜和解之。服犀角連翹散之類。至七八日大小便不通。利頭面腫起高赤者。可服托裡散。黃芪散。宜鑱砭割出血。泄其毒氣。十日外不治自愈也。此病若五日以前精神昏亂。咽喉閉塞。語聲不出。頭不腫。食不知味者。必死。治之無功矣。然而此疾有陰有陽。有可汗。有可下。常見粗工。但云熱毒。就用寒涼。殊不知病有微甚。治有逆從。不可不審也。

徐考功年逾三十。耳面焮腫。寒熱拘急。脈浮洪。此時毒症也。邪在表。以荆防敗毒散。加牛蒡元參治之。漸愈。更以升麻

葛根連翹桔梗。川芎銀花牛蒡而平復。

疔

羅謙甫云丙午歲予居藁城人多患疔瘡縣尹董公謂予曰
今歲患疔瘡者極多貧民無力醫治近於史侯處得數方
用之者無不效官給藥錢君當捨手治之遂諾其語董公
榜示通衢命予施藥如此一年全活甚衆其用保生錠子
千金托裡散神聖膏藥破棺丹凡四方保生錠金腳信二
錢雄黃三錢輕粉二錢硃砂三錢麝香一錢半巴豆四十
九粒蟾酥一錢爲細末用黃蠟五錢溶開將藥和成錠子

原书缺页

原书缺页

以泄其外。托裡散以補其內。八味丸以回其陽。則治之失宜。必致不救。慎之慎之。

長洲庠蘇子忠。鼻梁患疔。症屬表邪。但氣血俱虛。不勝發散。遂以補中益氣爲主。佐以防風白芷而愈。

張所望。治理安寺一僧。患水疔。走黃絕水穀者已三日。衆莫能治。延所望入視。曰。毒已入內。奈何。須下一針方可。因向瘡頂刺入寸餘。始聞痛聲。曰。生矣。隨以膏塗之。復投丹藥數粒。拔其疔根。寸許堅黑如鐵。遂愈。

錢塘縣志

立齋治一男子。足患疔。作痒惡心。嘔吐時發。昏亂脈浮數。明灸二十餘壯。始痛。以奪命丹一服。腫起。更以荆防敗毒散。

而愈

一男子患疔發熱煩躁脈實以清涼飲下之而愈。

二男子胸患疔遍身麻木脈數而實急針出惡血更明灸數壯始痛服防風通聖散得利而愈。

一男子左手背患疔是日一臂麻木次日半體皆然神思昏潰遂明灸至二十餘壯尙不知痛又三十餘壯始不麻至百壯始痛以奪命丹一服腫始起更用神異膏及荆防散敗毒散而愈。

一老婦足大指患疔甚痛令灸之彼不從專服敗毒藥致真氣虛而邪氣愈實竟至不救蓋敗毒散雖能表散瘡毒然

而感有表裡所發有輕重體段有上下所稟有虛實豈可一概而用之耶。且至陰之下藥力之所難到。而假藥力則緩不及事。不若灸之爲良。故下部患瘡皆宜隔蒜灸之。痛則灸。至不痛不痛則灸。至痛若灸之而不痛者宜明灸之。及針疔四畔去惡血。以奪命丹一粒入瘡頭孔內。仍以膏藥貼之。若針之不痛。或無血者。以針燒赤頻烙患處。以痛爲度。或不痛眼黑如見火光者。此毒氣入臟腑也不治。若患在手足紅絲攻心腹者。就于絲盡處刺去惡血。宜服荊防敗毒散。若絲近心腹者。宜挑破瘡頭去惡水。亦以膏藥貼之。如麻木者服奪命丹。如牙關緊急或喉內患者並宜

噉一二丸。凡人暴死多是疔毒。用鑑照看遍身若有小瘡。卽是宜急灸之。俟醒更服敗毒藥。或奪命丹。人汗入肉食之。則生疔瘡。不可不慎。

劉禹錫纂柳州救三死方云。元和十一年得疔瘡。凡十四日。益篤。善藥傳之。皆莫知長樂賈方伯教用蜚螬肉。一夕而百苦皆已。明年正月食羊肉又大作。再用亦如神效。其法一味貼瘡半日許。可再易。血盡根出遂愈。蜚螬心腹下度取之。其肉稍白是也。所以云食羊肉又大作者。蓋蜚螬食羊肉故耳。用時便禁食羊肉。其法蓋出葛洪肘後方也。本草韓光治疔腫人也。正觀初衛州徐使君訪得此方。用艾蒿一

擔燒作灰入竹筒中淋取汁一二合和石灰如麵漿以針刺瘡中至痛即點之點三遍其根自拔亦太神驗正觀中

用治三十餘人得差故錄之

千金方

綉坡公曰疔瘡全看部位如部位不佳者

甚為難治觀其毒將走之症用針破其四圍插入拔疔之藥其浮腫處用針刺之出其惡血此法甚妙

繆仲淳治顧博士伯欽內人左耳患疔時方孕令先以白藥

子末雞子清調塗腹上護胎次以夏枯草甘菊貝母忍冬

地丁之屬大劑飲之一服痛止疔立拔胎亦無恙白藥子

療馬病者

廣筆記

馬銘鞠治顧聖符幼弟患髻疔醫者先用火針圍腫腫脹至目與鼻俱隱入肉牙關緊急用患者耳垢齒垢刮手指甲