

東醫西寶鑑

卷二十



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之八

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

癰疽下

腸癰腹癰

關元穴名屬小腸天樞穴名屬大腸丹田穴名屬三焦其穴分隱痛者為疽上肉微起者

為癰也

靈樞

○腸癰為病小腹腫而強按之則痛

小便數似淋時時汗出發熱而復惡寒身反甲錯

腹皮急如腫狀甚者腹脹大轉側有水聲或遠臍

生瘡膿從瘡出或有出臍中者惟大便秘下膿血者

自愈仲景

○淫熱鬱積腸內成癰脉遲緊者宜大

黃牡丹湯或五香連翹湯

方見上

下之脉乳澀者

四物湯

方見血門

加桃仁紅花玄胡索木香脉洪

數者三仁湯小腹疼尿澀者膿滯也宜牡丹散入

門○腹皮急按之濡身無熱乃陰冷所成宜牡丹

散或內托十宣散加茯苓甚者敗醬散小腹痞堅

按之痛身有熱乃結熱所成宜大黃牡丹湯或桃
仁承氣湯方見寒門黃黑散入門○腸癰冷熱證

雲母膏為丸牛膝湯吞下利去瘀膿即愈或蠟礬

丸亦佳方見上○腹癰者生於肚腹皮裏膜外左

關脉洪數而腹痛甚者是也治法同腸癰入門

腸癰難知脉滑可推數而下熱腸癰何疑遲緊未

膿下以平之洪數膿成不下為宜脉訣○跌陽脉

滑而數知當尿膿也仲景○腸癰之脉滑而數滑

則為實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降

榮滑上升榮衛相

干血為敗濁脉經

大黃牡丹湯

治腸癰脉遲緊膿未成可下之大黃芒

硝各一錢半牡丹皮桃仁瓜蒌仁各二

錢半右剉作一貼水煎服有膿即下膿無膿即下

血○一名大黃湯一方有冬瓜仁無瓜蒌仁神效

千金

三仁湯

治腸癰腸中疔痛縱非癰疑似間便可服薏苡仁二錢冬苳仁二錢半桃仁牡丹皮各二

錢右剉作一貼水煎服入

牡丹散

治腸癰冷證腹軟而痛時下膿血牡丹皮人參天麻白茯苓黃芩薏苡仁桃仁白芷當歸

川芎各一錢官桂甘艸各五分木香三分右剉作一貼水煎服入

敗醬散

治腸癰身無熱腹濡冷薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子炮五分右剉作一貼水煎服小

便當下膿血而愈入

黃黑散

治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙一兩取末二錢牛蒡子一兩取末一錢黑牽

牛子一兩取末二錢右和勻分二貼每取一貼蜜水調空心服以利為度

腸癰治驗

一婦腹痛百方不效孫兆診曰腹痛脉當沈細今反滑數此腸癰也雲母膏作丸溫

臂癰

酒吞下服一兩下膿血而安綱目。灸腸癰法屈兩肘正肘頭銳骨端是穴灸百壯下膿血而安千金。臂上手陽明經分生癰此得之八風之變者傷於風者上先受之宜服白芷升麻湯入門

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芩各四錢生黃芩三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢

酒紅花甘艸各五分右剉分二貼每取一貼酒水各半煎服東垣

醫癰

醫居小腹之後又在於下此陰中之陰也其道遠其位僻雖曰多血氣運不到血亦罕來中年後不可生癰纔有腫痛叅之脉證但見虛弱便與滋補

氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌丹心。○醫癰初起未成膿者隔蒜灸再用蔥熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者仙方

活命飲二方見上。腫硬者托裏消毒飲方見上。潰後宜加味十全湯方見上。尻醫生癰堅硬腫痛宜

內托羌活湯方見上

湯方見上

懸癰

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間初發如松子大甚痒漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃子即破若破而大小便皆從中出者為難治宜服國老膏精要。此疾管尾常服國老膏雖患亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救。初起作痛尿澀者仙方活命飲方見上去大黃服之膿已成者急鍼之久成漏者加味十全湯方見上蠟蜜丸方見上。穀道中生瘡取水中和芥葉細搗綿裹納下部日三即愈入門

國老膏

治懸癰橫紋大甘艸帶節一兩四寸切以山澗長流水一碗文武火慢慢蘸水炙自早至

午乾則投前水再炙直待水盡看甘艸中心潤透為度細剉好酒二升煎取一升空心隨量飲之三日一服二三服可保無虞此藥雖不即消過二十日後必盡消有人患此癰已破服兩貼瘡即合甚妙精要

便癰

俗名便毒實血疔也一名騁馬癰此奇經衝任爲病而癰見於厥陰經之分野其經多血故又名血疔或先有疳瘡而發或卒然起核疼痛而發皆熱鬱血聚而成初發宜疎利之卽散變膿後如常用托裏內補之藥正傳○便毒處所上不在腹下不在腿介乎兩者之中也直指○便癰生於腿腓小腹之間或一邊腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散方見寒門加大黃或雙解散復元通氣散方見氣門痛甚者仙方活命飲方見上仍戒房室行動入門○偏癰宜蘇方散牡蠣大黃湯千金內消散黃黑散五香連翹湯三方見上消毒飲玉燭散神奇散○便毒取大蜘蛛一箇研細熱酒調下山居○便毒初起射干三寸生薑如指大麝細順流水煎服以瀉爲度因用阿膠醋煮塗患處丹心○生山藥砂糖同搗塗上卽消又生薑一塊蘸米醋磨取千步峰泥付腫處卽消千步峰卽人家行步地也上高塊是也得效

蘇方散

治便癰木鼈子當歸尾赤芍藥白芷川芎射干大黃金銀花穿山甲沒藥蘇木甘艸各八

分右剉作一貼酒
水各半煎服 正傳

牡蠣大黃湯

治同上大黃牡蠣煨各二錢生甘艸一錢黃瓜萋一箇右剉作一貼水煎服 正傳

消毒飲

治偏毒三四日可消皂角刺金銀花防風當歸大黃瓜萋仁甘艸各一錢三分右剉作一

貼水酒各半煎服仍頻
提掣頂中髮立效 丹心

玉燭散

治偏毒腫痛大黃芒硝各三錢川芎當歸赤芍藥生地黃甘艸各一錢右剉作一貼水煎

空心服
正傳

神奇散

治便毒魚口瘡 便毒潰破者 牡蠣大黃各三錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿

山甲三片土炒木鼈子三箇去殼黃蠟三兩右剉分作二貼酒水各半煎服 同春

雙解散

治偏毒大黃黑丑炒頭末各一錢半官桂白芍藥澤瀉桃仁各一錢甘艸七分右剉作一

貼薑五片水煎服空心先小便快是熱從小便出也後大便利皆是稠毒得效

囊癰

者溼熱下注也有作膿者此濁氣順下將流入滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安勿藥可

也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開羣丸懸掛水出以歿炭末付之外以紫蘇葉包裹仰臥

養之○癰疽入囊者曾治數人悉以溼熱入肝經處治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫羣丸懸掛者

皆不灰○取紫蘇葉焙乾為末付之如燥香油潤之皮脫者青荷葉包之其皮自生丹心

附骨疽與白虎飛尸歷節皆相類但歷節痛則走注不定白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽

附骨疽

痛深按之亦無益○白虎飛尸亦能作膿著骨而生及其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一病但淺

深不同耳三四○附骨疽筋骨之內痛如錐刺外則全無赤腫突起初因露臥風冷或乘涼浴水寒

則全無赤腫突起初因露臥風冷或乘涼浴水寒

則全無赤腫突起初因露臥風冷或乘涼浴水寒

涇襲淡初起痛不能轉寒熱無汗經久寒鬱為熱
變而為膿膿成即用火鍼使毒不得內潰入門○
初起宜漏蘆飲子五香連翹湯方見上陳下之次
用內消升麻湯在尻臀宜內托羌活湯方見上在
腿內羌活防已湯在腿外托裏黃芪湯黃連消毒
飲方見上潰後久不愈宜蟾蜍膏赤朮丸平肌散
入門○初起大痛而肉色不變名附骨癰三生散
最妙兼用青皮甘艸節二味煎服綱目○附骨疽
與緩疽石疽賊風相入門
類宜辨而治之入門

緩疽石疽賊風辨

緩疽石疽皆寒氣伏於骨髓之間
其熱緩慢積日不潰久乃紫黑皮

肉俱爛故名曰緩疽○腫與皮肉相似疼而堅硬
如石故謂之石疽生商陸根搗爛和鹽少許塗付
日一換即軟○賊風由風邪搏於骨髓故其痛亦
徹骨遇寒則甚外證惡寒有汗痛處常欲熱熨失
治則變為攣曲偏枯○緩疽石疽宜服補虛托
裏溫熱之劑賊風宜服越婢湯疎通之劑入門

始發預防法

環跳穴痛不已防生附骨疽急用青艸
蒼柏湯服此不愈加麻黃一錢用二三

貼又不效恐疽將成急掘地坑以火燒紅沃以小
便令患人赤體坐其上以被圍抱下體使熱氣熏

蒸氣血腸

而愈入門

漏蘆飲子

治附骨疽初起宜服他惡瘡初起亦可服
大黃一錢半漏蘆白欬黃芩麻黃枳實升

麻赤芍藥朴硝甘艸各一錢

右剉作一貼水煎服入門

內消升麻湯

治附骨疽疎下後服此大黃升麻當歸
黃芩赤芍藥枳實各一錢半甘艸一錢

右剉作一貼

水煎服精義

羌活防已湯

治附骨疽發於太陽厥陰太陰分者羌
活川芎蒼朮各一錢二分防已木香連

翹射干白芍藥木通當歸尾蘇木甘艸各

七分右剉作一貼酒水各半煎服正傳

托裏黃芪湯

治附骨疽發於足少陽陽明分者當歸尾一錢七分柴胡一錢半白芷一錢二分

連翹鼠粘子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻甘草各五分右剉作一貼酒水各半煎服

正傳

蟾蜍膏

治附骨疽久不差膿汁敗壞或骨從瘡口出大蝦蟆一枚亂髮雞子大猪脂四兩右以猪

脂煎二物令稠去滓凝如膏貼之先以桑白皮烏豆前湯淋洗瘡口拭乾然後卻貼之

得效

赤朮丸

治附骨疽久不差赤朮一斤泔浸去油用川椒蔥白同煮黑色焙乾間香破故紙川練子

炒赤茯苓白芷桃仁各一兩右爲末蜜丸梧子大溫水下百丸

得效

平肌散

治附骨疽成漏久不合老狗頭骨煨露蜂房亂髮灰各二錢半新桑白皮末一錢二分半

右爲末入輕粉麝香各少許溼則乾糝乾則油調付之

直指

三生散

治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房蛇退亂髮各等分燒存性爲末每取三錢溫酒調

下空心
保命

青艸蒼柏湯

治附骨疽始作宜預防青皮一錢半甘
艸節五分蒼朮黃柏各三錢右剉作一

貼水煎和薑汁三匙空心飲之冬加
桂枝夏加條芩體虛加牛膝入門

流注骨疽

流者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素
有痰火或感風寒邪氣流行至其痰注之處

而發多生四肢或胃腹腰臀關節之處初起宜蔥
熨法方見下實者十六味流氣飲方見上兼服竹

瀝達痰丸

方見痰門通用榮衛返魂湯合二陳湯方見痰門

令其自消自潰若潰後久不斂宜以托裏為主更
佐以豆豉餅琥珀膏方見膿成以火鍼破之門入○

流注起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢經絡澀

於所滯而後為流注也蓋流注者傷寒之餘毒骨

疽者流注之敗證也同春○痰飲流注於背脊頭

項腋脇腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無

血潮雖或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿

或有薄血或出清水或如紫汁又有壞肉如敗絮
或又如瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不
硬破之亦無膿血鍼口努肉突出惟覺咽喉痰塞
作寒作熱榮衛返魂湯主之醫鑑○骨疽者由瘡
潰後氣血不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出盡方
愈蓋人身有正骨附骨傅合成形附骨出則愈後
如常正骨腐出則為終身廢疾隨腫硬之處潰後
久不愈則必出碎骨外用附子餅灸或蔥熨法祛
散寒邪補接榮氣則骨
自脫瘡自斂矣入門

榮衛返魂湯

主一切痰飲為患專治痰腫又治癰疽
發背流注腫毒赤芍藥木通白芷何首

烏枳殼茴香烏藥當歸甘艸各一錢右剉作一貼
酒水各半煎服醫林○一名追風通氣散一名通
順散又名何首烏散此方空與十宣散相間用之
並加忍冬藤入門○凡氣血逆於肉理令壅結為
癰疽此藥大能順氣勻血自然榮衛通順不生變
證尤合內疽入門○虛加炮附子實加大黃痰盛

疔疽

加南星半夏腫毒堅硬不穿加川芎麻黃蔥白全
蝎穿山甲流注加獨活流注者氣血凝滯加獨活
則可以動一身血脉血脉既動豈復有流注乎入
門○此藥治流注癰疽發背至於救壞病活死肌
彈患於未萌之前拔根於既愈之後大能順氣勻
血蓋氣陽也血陰也只調陽不和陰則氣耗而凝
肌必不活如五香連翹之類是也只和陰不調陽
則血旺而氣弱病必再作如內補十宣之類是也
此藥兼之真神

仙妙劑也

醫林

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治之百日
成○發於足傍名曰厲疽其狀不大初從小指發
急治之去其黑者不消輒益不治百日成○發於
足指名曰脫疽其狀赤黑者成不治不赤黑者不
成治之不衰急斬之否則成靈樞○膏粱之變足
生大丁內經○疔瘡初發突起如釘蓋故謂之疔
近世多見因食自死牛馬禽獸之肉而發或感襲
天地暴沴之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發

其形有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺人於一二日之內比之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍疔其毒尤甚入門○疔瘡發無定處為緩正傳手足頭面胷背骨節間最急其餘處為緩

疔疽形證

疔疽生黃疱中或紫黑色初發必先痒後痛先寒後熱四肢沈重頭痛心驚眼花若

大重則嘔逆為難治三因○瘡頭黑硬如釘四畔

帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光轉

為溼爛深孔透肌如犬鉞穿之狀入門○外證心

驚頭痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間

赤黑點點如珠直指○或不痛痒只麻木寒熱眼

中流火牙關緊急時時驚惕甚則嘔吐諸證中嘔吐最危

以鐵刺瘡不痛無血是其候也又中

陷如釘蓋撼之有根是疔也精義

疔疽治法

凡疔瘡毒氣攻心欲死以鐵刺瘡心若覺痛有血下錠子若累刺至心則皆不痛無

血者急刺百會穴痛有血者下錠子若無血以親

人熱血代之猶活三四宜用迴瘡錠子碧霞錠子

迴瘡蟾酥錠子精義。又法急以艾炷灸之鍼疔

四邊皆令血出以迴瘡鍼子絕之上用膏藥貼之

因服五香連翹湯千金漏蘆湯二方見上疎下之

若鍼之不痛無血者以猛火燒鐵鍼通赤於瘡上

烙之令如焦炭取痛為效亦絕前鍼子經一二日

膿潰根出服托裏湯散以取平復精義。治法急

用飛龍奪命丹或雄黃丸下之去其毒熱炙服化

毒丸及二活散正傳。實者初服賽命丹方見上

三丸以蔥酒發表虛者服保生錠子以解毒入門

○通治紫金錠返魂丹一捻金神效奪命丹蟾酥

丸獨蟾丸五聖湯還魂

散千金消毒散選用

紅絲疔

疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用

鍼於紅線所至處刺出毒血然後以蟾酥乳

香等膏於正瘡內塗之鍼時以病者知痛出血為

好否則紅線入腹必致危殆綱目。疔生兩足多

有紅絲至臍疔生兩手多有紅絲至心疔生面部

多有紅絲入喉者俱難治急鍼其絲出血以泄其