

活人慈航

家藏袖珍活人慈航女科細目目錄

婦人雜病

已下全圖

妊娠

產後

論經主衝任二脈

已下論經

論心脾為經血之主

論脾胃生血

論經不調由風邪客於胞中

論經不調有三

論三月一來為居經

論師尼寡婦異乎妻妾之治

論調經當抑氣

論調經先去病

論調經大法

論經候愆期

論經水異色

不月期而經先行

經過期後行

一月兩行

數月而經一行

經或前

經水多少

經水紫

色

經病疼痛

月水不利

月水不斷

過期不上

經病發熱

往來寒熱

熱入血室

調經脉法

附調經總論

經閉

血崩

帶下

求子

候胎

惡阻

胎動不安

妊娠經來

胎漏下血

子煩

心腹脹滿

即子懸

妊娠心痛

妊娠心腹痛

胎水腫滿

即子腫子滿子氣

妊娠傷寒

妊娠瘧疾

妊娠中風

子癰

子瘖子鳴

大小便閉

小便不通

子淋

逐月養胎

防胎自墮

產期

鬼胎

臨產坐草法 胎死催生

產後將調法

胞衣不下

血暈

惡露不下

惡露不絕

產後暴崩

產後心痛

產後腹痛

產後脇痛

產後腰痛

逆身疼痛

產後頭痛

產後發熱

產後乍寒乍熱似瘧

產後瘧疾

產後腹滿脹悶嘔吐

產後

哕逆

產後氣喘

產後鼻衄

產後泄瀉

乳少

吹乳 乳癰

隨小便而來渾濁如泔此胃中濁氣滲入胞中也白淫者
常在小便之後而來亦不多此男精吸入子宮而不攝
而自出也三者皆由胞門而來也李氏曰又有日夜流淫
如清米泔或如黏膠者謂之白崩與白濁大同多憂思過
度所致誠難治療用四七湯下白丸子咸喜丸之類按此即女亦有患者非關七情所致宜草薢分清飲加黃柏為是或導水丸益元散之類
淫熱傷陰滲入子宮所以下流而不疼痛萬氏治白濁用二陳湯加蒼朮益智升麻柴胡治中焦使淫熱不下流也日久者用

方

清白散 治帶下綿綿不止

當歸 川芎 白芍 生地 黃柏 椿根皮 貝母各錢

炮乾姜 甘草 各五分 炮乾姜從治也

赤帶加黃芩荊芥 久下加熟地牡蠣註此丹溪法然配四物似與瘦人有火者相宜

勝淫丸 治赤白帶因淫熱勝而下者

蒼朮 白芍 滑石 各兩 椿根皮 二兩 炮乾姜 二兩

地榆 桑枳殼 甘草 各三錢 為末糊丸服百丸

或加神麴黃柏 或加香附黃連白芷側柏葉治七情所

傷而脉數者

地榆散 治漏下五色一十二帶兼治下血 本草註一曰多赤二曰多白三曰月水不通四曰陰

蝕五日子臟堅六曰子門辟七曰合陰陽患痛八曰小腹寒痛九曰子門閉十曰子宮冷十一曰夢與鬼交十二曰五臟五虛

地榆 三兩 用醋水各半升煮食前服一合

註以三兩醋煎自得單方用法能治十二症亦一家病也

苦練丸 治赤白帶下甚妙 註下部痛者尤宜

苦練 小茴香 當歸 等分 酒糊丸桐子大服三五十丸

滲淫導痰飲 治淫熱痰積滲入下焦白帶不止

白朮 蒼朮 半夏 陳皮 茯苓 白芷 香附 各五錢

炙甘草煎服有熱加黃芩 血虛加芎歸 氣虛加參芪

及不愈加升麻柴胡升提之

註總治中州之溼蓋中焦清則無溼下流故帶自止豈有滲入下焦之理

萬安散

治女人赤白帶下或出白物如脂或有臭濁污水

并神效

註此氣實溼痰以利氣溫行導水

小茴香

木香

各五分黑丑牛一兩取頭末

為末生姜汁調

服二錢

取盡惡物為效未盡間日再服二錢忌熱物

導水丸

治溼熱鬱於下焦赤白帶下不止燥熱煩渴

大黃

黃芩

各二兩丑牛頭末

滑石

各四兩為末水丸

已上溼熱寬結

胃風湯

治風邪入於胞門或中經脉流傳臟腑帶下五色

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

白芍

肉桂

腹痛加木香

五積散亦可用

按此白帶下五色便是風邪胃風五積詳虛實而用俱效

蒼蘗參芎散

治婦人上有頭風鼻涕下有白帶

按此症亦少有存其方法也

辛荑 川芎 蒼朮 黃柏 南星 半夏 滑石

牡蠣 黃芩 水煎服 註此丹溪先生方以芩荑川芎而治頭風蒼柏星半滑牡而治白帶平正無奇令人可法

已上風寒

衛生湯 帶下不止脉微弱腹痛 註此亦建中法

黃芪 三兩 當歸 白芍 各 炙甘草 兩 每服半兩下苦練丸

註腹痛故無苦練丸

補中益氣湯 治勞役過度飲食不節損傷脾胃以致陽氣下陷白帶下久不止

六君子湯 治胃有痰飲食減少中氣不和時時帶下 按守補之藥原是治本

歸脾湯 治思慮過傷心脾以致健忘怔忡驚悸不寐忘情嗜臥不思飲食時常白帶不止

已上守補

養榮兔絲丸 治赤白帶下此藥不寒不熱得其和平助陰

生子 按腎旺則有子奇經入脉屬肝腎也此方補腎補血內兼溫清并調收下

肉蓯蓉 兔絲子 覆盆子 蛇床子 當歸 白芍

川芎各

牡蠣

烏鰂魚骨各

五味子各

防風

黃芩各

艾葉三

為末蜜丸桐子大鹽湯下四五十丸早晚服

補腎

補宮丸

治婦人諸虛不足久不妊娠骨熱形瘦崩中帶下

鹿角霜

白芍

白朮

茯苓

淮山

白芷

白薇

牡蠣

烏鰂魚骨

等分

糊丸

註此又別是一種意是不用歸地川芎者慮其溼滑行血也變局如此可不因事制宜 按此只重在崩中帶下以致形瘦骨熱不妊故用燥溼固濇以治崩帶補濇

丹溪方

治白帶真陰虛者

龜板

枸杞

黃柏各

香附

棗皮

苦參

貝母

椿根皮

白芍

各半兩

炮乾姜

各半

為末

糊丸

註丹溪治帶主於溼熱其意以腎主閉藏而下焦者肝腎主之然溼從中焦生故其方如此宜讀本草而熟思之應變無窮可為執方一洗塵補陰去熱溼

千金方 治帶下脉數者陰虛有熱也

生地黃 五兩

枸杞 一兩

水煎服

註此方有超見非真入不能立 按人瘦口乾口燥大便堅實乃宜

滋補陰液

補真固經湯

一婦白帶久漏服諸藥不效診得心胞尺脉

極微其白帶流而不止脉訣云崩中日久為白帶漏下多時骨水枯言崩中者始病血崩不已久下則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本經血海將枯津液俱亡乾枯不能滋養筋骨以本經藥行經藥為引為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而益津液以大辛熱之氣味補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺救其上熱傷氣以人參補之以微苦辛之藥佐而益元氣名曰補真固經湯

人參

乾姜

各錢半

黃芩

郁李仁

柴胡

炙甘草

各錢

陳皮

五兩

白葵花

土去原

水煎服

註東垣立方必原脉原症原藥然後沈思審處且又引前言為証故治病多效
今不能然何怪乎病之不瘳也此方以參姜益陽李仁葵花潤燥柴胡升清
於下陳皮和胃於中黃芩清肺熱非深思者
不能主此方名曰補真蓋以真氣為本

助陽湯 治白帶陰戶中痛控心而急痛身黃皮緩身重如

山陰中如冰一名升陽燥溼湯 按此症稀少註此治重在陰中如冰痛控

於心故用良姜為君乾姜為佐不用參朮者痛無補也柴防

足以去溼升陽葵李潤枯滋燥甘陳和中黃芩涼氣分之熱能與前方參之自

有解 準繩註二方葵花李仁之滑以潤燥蓋枯涸滯者宜之

柴胡 一錢二分

良姜 二錢 防風 郁李仁 乾姜 甘草 各一錢

白葵花 七朵 陳皮 黃芩 各五分 煎服

已上寒熱潤

固真丸 治白帶大下不止臍腹疼痛其寒捫之如冰陰中

亦然目中溜火上壅視物眊眊無所見齒皆惡熱飲痛須

得黃連末擦之其痛乃止惟喜乾食大惡湯飲此病皆寒

溼乘其胞內故喜乾而惡溼陰火肝經上溢走於標故上

壅目中溜火腎水浸肝而上溢故目中眊眊無所見齒惡

熱飲者是少陽陽明中伏火也當大瀉寒溼以丸藥治之
故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散以白石脂龍骨以枯
其溼以炮乾姜大辛熱瀉寒水以黃蘗之大寒為因用又
為鄉導故云古者雖有重罪不絕人之後又為之伏其所
主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也此柴胡為本經之
使以芍藥導之恐辛熱之藥太甚損其用經故微瀉之以
當歸之辛溫大和其血脉用藥之法備矣

石脂一錢 龍骨二錢 柴胡一錢 當歸三錢 乾姜炮四錢

黃柏五分 白芍五分 為細末糊丸每服三十丸白湯下

一流民婦白帶如流不止下極冷上極熱用此一料立愈真神藥也重在寒溼傷胞
寒熱非瀉

酒煮當歸丸 治癰疔白帶下注腳氣腰以下如冰雪中
火坑以重蓋厚衣猶冷小便不止與白帶長流而不禁固

肌肉消瘦面白目青目眊眊無所見身重如山行步欹側
腿膝枯細大便閉結心下痞悶懊懷飲食不下面垢背寒
小便遺不知此上中下三陽俱竭故嘔噦不止胃寒之極
也其脉沈緊而瀉按之空虛若脉洪大而瀉按之無力猶
為中寒之症况按之空虛乎按之不鼓是為陰寒之極也
其空虛乃氣血俱虛之極也

當歸一兩 小茴半兩 附子各七 良姜各七
註凡緊脉不拘浮沈均以為寒按之不鼓無問大小皆以為虛診者常須識此

炒鹽 丁香各半兩 全蝎三錢 柴胡三錢 升麻 木香各三錢

苦練子 炙甘各五分 延胡索四錢 酒糊丸服二十丸

註既曰氣血俱虛而本方中曾無一味補氣而血分藥又止有一味當歸豈真陽已竭即甘溫之味亦未易為力也若地能滯陽氣故亦不用妙在前四味用酒煮以酒糊丸者峻補其下使其陽氣生於九淵上於九天也其後九種或引之於降或佐之以升有開結透關之妙非精識病源究心藥石者不能到也然其力量洪大非善用者不敢前諸症皆寒症獨便秘心下痞懊懷似熱症按此方脉症皆果虛寒乃用然亦稀少

通陽

暖宮妙應丸 治婦人赤白帶下及子宮虛冷無子者

當歸 川芎 白芍 熟地黃 艾葉 丹皮 茯苓

龍骨 牡蠣 赤石脂 等分 糊丸

註四物合成劑又以艾葉暖其下茯苓滲其淫丹皮行其瘀宜乎暖宮得孕平補法

白芷散 治赤白帶下

白芷 三兩 海螵蛸 二兩 血餘 二分 為末酒下二錢

側柏地榆湯 治赤白帶下以致不能成孕

黃芪 側柏葉 地榆 烏鰂魚骨 牡蠣 白殭蚕 各

肉苁蓉 白芷 蛇床子 各半 煎服

註腎主閉藏赤白帶下者腎氣不固也白芷升陽明於血海餘皆補腎而有散有瀉有通其黃芪一味得非補入脉之表氣乎亦補瀉而鬆靈

神清

威喜丸 治婦人血海久冷白帶白濁白淫下部常溼小便

如米泔或無子

黃蠟

芎

四兩用猪苓二錢半煮二十餘沸去猪苓不用茯苓晒乾用

茯苓為末熔蠟丸彈子大空心細嚼滿口津生徐徐嚥服

以小便清為度

註味之淡者真過於黃蠟茯苓蓋淡味乃天之陰氣天氣降則水生水生則火有制用猪苓煮者欲滲之速以蠟丸者欲其降之深也

滲澤

如聖丹 治婦人經脉不調赤白帶下

枯白礬

蛇床子

等分

為末用醋為丸如彈子大用

臘脂為衣綿裹於陰戶中定坐半日熱極再換大抵月水不通赤白帶下多因子宮不潔服藥難效下取易痊且速效而不傷臟氣也

按月水不通可用赤白帶下宜審

俗下胎法用地棉根取一根直下者用水浸淫插入陰戶子門口內對時便產淫婦常用者

求子

胡氏曰男女交姤其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶為後天滓汁之物而一點先天真一之靈氣萌於情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎為要女以調經為先而又參之補氣行氣之說察其脉絡究其虧盈審而治之然後可孕

陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脉可知舍脉而獨言藥者妄也脉有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實實非正氣能實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐