

丹溪心法

卯

丹溪心法卷之四

新安王之學文

瘧五十六

○瘧病斷不可作風治而用風藥。有濕熱、濕疫氣虛、血虛、瘀血、濕熱東垣健步丸加燥濕降陰火、蒼朮、黃芩、黃柏、牛膝之類。濕疫二陳湯加蒼朮、白朮、黃芩、黃柏、竹瀝、姜汁。氣虛四君子湯加黃芩、黃柏、蒼朮之類。血虛四物湯加黃柏、蒼朮煎送補陰丸。亦有食積死血妨碍不得下降者大率屬熱用參朮四物湯黃柏之類。

附錄謹按五痿等証特立篇目所論致詳後代諸方獨於此証蓋多缺略攷其由皆因混入中風條內故也丹溪先生痛千古之弊憫世之罹此疾者多誤于庸醫之手有志之士必當究其心焉夫陳無擇謂痿因內藏不足所致誠得之矣然痿之所不足乃陰血也而方悉是補陽補氣之劑寧免實實虛虛之患乎且無擇以三因立法可謂諸方之冠其餘此証尤且未明况求於他者乎

附方

防已

酒洗

健步丸

東垣方

羌活

酒洗

柴胡

滑石

炒

甘草

瓜萎根

酒洗各半兩以上

澤瀉

防風

各二分

苦參

酒洗

川烏格一肉桂

五分

右為末酒糊為丸梧桐子大每服七十丸葱白煎

愈風湯

下見中風類

補陰丸

見諸虛類

清燥湯 治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動

黃芪

五分一錢

蒼朮一錢

白朮

橘皮

澤瀉

各半兩

人參

白朮參

升麻

格三

麥門冬

歸身

生下曲末

猪苓各二分

酒柏

柴胡

黃連各一分

五味子九箇

甘草炙二分

右每服半兩水煎空心服

厥五十七

附手足十指麻木

○厥逆也手足因血氣逆而冷也 因氣虛為主

有因血虛

氣虛脉細

血虛脉大

熱厥脉數

外感脉沉實

有疫脉弦

因疫者用白朮竹瀝

氣虛四君子

血虛四物

熱厥用承氣

外感用

雙解散加姜汁酒

有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰

於下膿或下血大脹有虛火加人參益氣湯

○手足麻者屬氣虛 手足木者有濕疫死血

十

指麻木是胃中有濕疫死血

得錄厥者甚也短也逆也手足逆冷其証不一
散之方書者甚多今姑撮大概且如寒熱厥逆者
則為陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則
發厥也不可作陰証而用熱藥治之精魂絕而死
矣思宜大小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者
始得之身冷脉沉四肢逆足踰卧唇口青或自利
不渴小便色白此其候也治之以四逆理中之輩

以得因冒犯不正之氣忽然手足逆冷脫膚粟起頭面青黃色神不守或錯言妄語牙緊口噤或昏不知人頭旋暈倒此是卒厥客許飛戶鬼擊吊死罔喪入朝登塚多有此病以蘇合丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣平胃散 痰厥者有寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯以生附湯以生附代熟附 虫厥者乃胃寒所生經曰虫者長蟲也胃中冷即吐虫蟲宜理中湯加炒川椒五粒欖榔也

榔山杏葉皮

川芎

故芷白水下

香附湯半姜

者與中風相似何以別之風中是溫氣中身冷以八味順氣散或調氣散如有疫以四知湯導痰湯服之

附方 八味順氣散

見中風類

調氣散

白豆蔻

丁香

檀香

木香各二

藿香

甘草淡恪

砂仁

四分

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

平胃散

蒼朮五斤

厚朴燒制

陳皮各三

甘草炒三

右為末每服五錢姜三片棗一箇煎服入鹽一粒
沸湯點服亦得

四七湯

厚朴二兩

茯苓四兩

半夏五兩紫蘇二兩

右每服四錢水一鍾姜七片棗一箇煎服

承氣湯

痢類

四逆湯

理中湯

姜附湯並見中寒類

烏梅丸

見心痛類

逍遙湯

見瘦類

症五十八

口瘡切不可作風治兼用風藥 大率與癟病相似
比癟為甚為虛宜帶補 多是氣虛有火兼疫宜用
人參竹瀝之類

附錄古方風瘡曰瘡也經云諸瘡項強皆屬於濕
土是太陽傷濕也又云諸暴強直皆屬於風是陽
明內鬱而陰行於外又曰陽瘡曰剛無汗陰瘡曰
柔有汗亢則害承乃制故濕過極反兼風化制之
然兼化者虛象實非風也

附方

葛根湯 治瘡病無汗而小便少反惡寒者名剛瘡

葛根

四錢

麻黃

三錢

桂枝

二錢

芍藥

二錢

甘草

三錢炙

右咬啞水二鍾生姜三片棗一枚煎服覆取微汗
桂枝加葛根湯 治瘧病有汗不惡寒者服之此名
柔瘧

葛根

四錢

生姜

三錢

桂枝

二錢

芍藥

甘草

各二錢

右作一版水二餚棗一箇煎服 二瘧皆可用小
續命湯加減服若胸滿口噤咬齒脚攣卧不着床
者以大承氣湯下之無疑矣

小續命湯見中肩類

大承氣湯見痢類

痛五十九

○驚與疫宜吐 大率行疫為主用齒運南星瓜薑半夏尋火尋疫分多分少治之無不愈者 分疫與熱 有熱者以涼藥清其心 有疫者必用吐藥吐後用東垣安神丸 大法宜吐吐後用平肝之刺青黛榮胡川芎之類龍會丸正宜服之 且如瀉因驚而得驚則神不守舍舍空而疫聚也

戴云痛者俗曰猪癩風者是也

附錄癇症有五馬牛雞猪羊且如馬癇張口搖頭
馬鳴牛癇目正直視腹脹雞癇搖頭反折喜驚羊
癇喜揚目吐舌猪癇喜吐沫以其病狀偶類之耳
非無疫涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐
搦口眼相引冒背強直叫吼吐沫食頃乃甦宜星
香散加全蝎三箇

附方

續命湯 主癇發頓悶無知口吐沫出四體角弓反
張自反上口噤不得言

竹瀝二升 生芥汁一升 龍齒末 生姜

防風

麻黃去節各

四兩

防已

附子

炮各二兩

石膏

桂二兩

右十味水一斗煮取三分分三服有氣加紫蘇陳皮各半兩

○但小兒癇千金有風食驚三種本事方又有喫陽癇慢脾風三証慢脾即食癇宜醒脾丸人參散古方三癇丸 治小兒百二十種驚癇

荆芥穗二兩白礬

生半帖一兩半

右為末麪糊為丸黍米大朱砂為衣姜湯下二十丸如慢驚用來復丹急驚三癇丸食癇醒脾丸可

也

本事人參散

治慢脾風神暑疫盛

人參半兩

圓白大南星

一兩切片以生姜汁并漿水各半蔭漬煮帶性晒

右為末每服一錢水一盞姜三片冬瓜仁搗細少許同煎取半盞作兩三次灌下

寧神丹 清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荆芥

僵蠶

獨活

遠志去心

犀角

麥門冬

吟

酸棗仁炒

辰砂各半兩

半夏

南星

石膏

各一兩

甘草

炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃

各三錢

珍珠

三錢

生半

黃連

各半兩

金箔

三十片

右為末酒糊丸空心服五十丸白湯下

東垣安神丸

黃連

一錢五分

朱砂

一錢

水飛

酒生半

酒歸身

炙甘草

各五分

右除朱砂水飛外四味搗為末和勻湯浸蒸餅丸
如黍米大每服十五丸食後津燕下

星香散

見中風類

頑狂六十

○癲屬陰狂屬陽癲多喜而狂多怒脉虛者可治實則死大率多因疫結於心胸間治當鎮心神開疫結亦有中邪而成此疾者則以治邪法治之原病式所論尤精蓋為世所謂重陰者癲重陽者狂是也大概是熱 癲者神不守舍狂言如有所見經年不愈心經有損是為真病如心經蓄熱當清心除熱如疫迷心竅當下疫寧志若癲哭呻吟為邪所憑非狂也燒蠶呂酒水下方寸七 卒狂言鬼語針大拇指指甲下即止 風癲引脇痛發則耳鳴用天門冬去心日乾