

印刷品

福建中医学院图书馆

地址：福州市模兜

醫門棒喝三集傷寒論本旨卷四

目錄

少陽篇

脉證提綱

脉證治法

合病并病脉證治法

太陰篇

脉證提綱

脉證治法

少陰篇

脉證提綱

寒邪脉證治法

死證

熱邪脉證治法

厥陰篇

脉證提綱

脉證治法

死證

醫門棒喝二集傷寒論本旨卷四

張仲景先師原文

會稽虛谷章楠編註

冀子陳祖望

山陰

允占

圖

卷四

少陽篇脈證提綱

少陽之爲病。口苦咽干目眩也。

素問云。傷寒三日。少陽受之。少陽主膽。其脈循脇。

絡於耳。故胸脇痛而耳聾。靈樞云：足少陽之脈是動則病口苦。善太息。心脇痛不能轉側。甚則面微有塵。足外反熱。今仲景標邪中少陽必有之證爲提綱。其餘諸證或有或無。以下各條分別標之。蓋邪中少陽。膽氣卽熱。而口苦咽干。其脈起於目銳眥。與肝爲表裏。目珠屬肝。故又目眩。肝膽氣鬱不舒。則善太息也。然陽明中風亦有口苦咽干。以熱由胃上咽而至口。不涉於肝。故無目眩。以此爲辨。

少陽中風。兩耳無所聞。目赤。胸中滿而煩者。不可吐下。吐下。則悸而驚。

風爲陽邪。易於化熱。熱鬱經絡。故耳聾。目赤。風動。則目眩矣。內經所謂諸風掉眩。皆屬於肝也。以有胸滿而煩之裏證。必當和解。若誤用吐下。熱仍不解。而反動肝傷血。則悸而驚也。此表風中少陽之證。內經言邪中於頰。則下少陽是也。

傷寒。脈弦細。頭痛發熱者。屬少陽。少陽不可發汗。發

汗則讖語。此屬胃。胃和則愈。胃不和則煩而悸。

太陽中風。則脈浮緩。傷寒。則脈浮緊。陽明。則脈大。
此脈弦細。以其頭痛發熱。故屬少陽。若無發熱。頭
痛。卽爲三陰經證矣。然陰經之邪。脈多沉。自與陽
經有別也。太陽頭痛。頭頂連項背。陽明頭痛。額前
連目下。少陽頭痛。額角連耳後。以經脈所行不同
也。太陽則發熱惡寒。陽明初感。亦有惡寒。得之一
日。卽惡寒自罷而反惡熱。少陽則有往來寒熱。陽

明與太陽相近。故可發汗。少陽在陽經之裏。陰經之表。故汗吐下皆禁。如發其汗。邪不能出。反使肝風鳴張。邪熱擾心而發譫語。肝風由胃上逆。故云屬胃。胃和氣順。其風亦熄而愈。否則風火交熾。則心煩而悸也。以上兩條。皆言風寒初中少陽之脈證。下條卽言邪由太陽傳於少陽者也。

傷寒三日。少陽脈小者。欲已也。

此言邪受太陽三日。傳少陽之期。其脈小而不弦。

細者可知邪勢外出爲欲已也。內經言邪中於陽則溜於經。邪中於陰則溜於腑。蓋言邪中衛陽則入於經。邪中陰經卽循經入臟。臟氣實而不受邪還歸於腑也。是故邪有直中六經者。有流傳變化者。仲景惟詳辨脈證。方知邪之所在而設治法。其由直中由流傳亦可因之以明矣。

少陽病欲解時從寅至辰上。

從寅至辰少陽經氣旺時則邪解矣。

少陽篇脈證治法

傷寒五六日。中風往來寒熱。胸脇苦滿。默默不欲飲食。心煩喜嘔。或胸中煩而不嘔。或渴。或腹中痛。或脇下痞鞭。或心下悸。小便不利。或不渴。身有微熱。或欬者。小柴胡湯主之。

此言不論傷寒中風。至五六日而現往來寒熱。以及心煩喜嘔等證者。是邪入少陽也。以少陽在半表半裏。邪逼於陰則寒。出於陽則熱。故往來寒熱。

也。胸脇皆少陽經脈所行之處。正當胃口。邪熱壅盛。故滿悶而默默不欲食。默默者昏倦也。邪熱擾而煩心。嘔則氣得暫寬。故喜嘔也。其餘諸證。或有或無。皆不可定。總由少陽經邪之所變現。故以小柴胡湯爲主治。又立隨證加減之法也。

傷寒中風。有柴胡證。但見一證便是。不必悉具。若胸中煩而不嘔。去半夏。人參加括蕒實一枚。若渴者。去半夏。加人參。合前成四兩半。括蕒根四兩。若腹中痛。

者。去黃芩。加芍藥三兩。若脇下痞。鞭去大棗。加牡蠣
四兩。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若
不渴。外有微熱者。去人參。加桂枝三兩。溫覆。取微汗。
愈。若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。干姜二
兩。

人身陽氣。由肝膽而升。從肺胃而降。邪客少陽。則
升降不利。柴胡味薄。氣清。專舒肝膽之鬱。以升少
陽之氣。黃芩味薄。苦降。涼而解熱。同升。復從肺胃

散逆止嘔。此三味通調陰陽以利升降之氣也。人參甘草補中。姜棗調營衛。則上下表裏之氣皆調達。故爲少陽和解之主方。凡見一證屬少陽者。卽可用柴胡湯和解。不必諸證悉具也。其有兼證者。須加減治之。若胸中煩而不嘔。以邪熱盛而氣不逆。故去半夏之辛溫。人參之甘補。而加芩實涼潤。苦降以清心也。渴者津液傷也。故去半夏之辛溫。滑利。加參助氣生津。天花粉滋液清熱也。腹中痛。

者。木邪犯土也。故去黃芩之涼苦。加芍藥平木。同甘草以和脾土也。脇下痞鞭者。膽連肝氣俱逆也。去大棗之壅滯。加牡蠣鹹寒以鎮肝逆也。心下悸而小便利。是營血傷。小便不利者。胃中停飲也。故去黃芩之涼。加茯苓補心氣。導水以利小便也。若不渴。內無熱也。外有微熱。表邪未淨也。故去參之補。加桂枝。合諸藥以解表。溫覆取微汗。可愈也。欬者。胃中水寒之氣逆肺也。故去人參。姜棗之助氣。

加干姜專散水寒五味斂肺以止欬也

凡柴胡湯病證而下之若柴胡證不罷者復與此胡
湯必蒸蒸而振卻發熱汗出而解

少陽病誤下則元氣傷而邪不解幸其無他變而
柴胡證不罷者復與柴胡湯和解蓋以人參助元
氣餘皆通調升降之藥故能使陽氣旋復蒸蒸而
振發熱汗出而解也

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴

者。小柴胡湯主之。

身熱惡風者。表邪未罷也。頸項強。脇下滿。手足溫而渴者。邪入少陽。各兼陽明也。故從小陽和解。以小柴胡湯主之。蓋陽明在前。少陽在側。太陽在後。前爲頸。後爲項。故太陽則項背強。少陽則頸項強。以其在側而兼前後故也。

服柴胡湯已。渴者。屬陽明也。以法治之。

本少陽證。服柴胡湯已。少陽證罷而渴者。其邪轉

屬陽明。是從裏出表之機。當以陽明法治之。可解也。若見陽明腑證。是爲入裏。又當用下法矣。
傷寒陽脈濇。陰脈弦。法當腹中急痛。先與小建中湯。不差者。與小柴胡湯。

寸部浮。部爲陽。尺部沉。部爲陰。陽脈濇者。氣虛而滯也。陰脈弦者。血虛而寒也。故當腹中急痛。先與小建中。辛甘助陽。酸甘和陰。以通血脈。若不差者。其弦脈爲少陽之邪。故與小柴胡。升發少陽。且以