

傷寒論註卷之二

南陽

張機

仲景原文

慈谿

柯琴

韵伯編註

崑山

馬中驥驥北較訂

麻黃湯證上

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之

太陽主一身之表風寒外束陽氣不伸故一身盡疼太陽脉抵腰中故腰痛太陽主筋所生病諸筋者皆属于節故骨節疼痛從風寒得故惡風風寒客于人

則皮毛閉故無汗太陽爲諸陽主氣陽氣鬱于內故
喘太陽爲開立麻黃湯以開之諸症悉除矣○麻黃
八症頭痛發熱惡風同桂枝症無汗身疼同大青龍
症本症重在發熱身疼無汗而喘

本條不冠傷寒又不言惡寒而言惡風先輩言麻黃
湯主治傷寒不治中風似非確論蓋麻黃湯大青龍
湯治中風之重劑桂枝湯葛根湯治中風之輕劑傷
寒可通用之非主治傷寒之劑也

脉浮者病在表可發汗麻黃湯脉浮而數者可發汗宜

麻黃湯

前條論症此條論脉言浮而不言遲弱者是浮而有
力也然必審其熱在表乃可用若浮而大有熱屬藏
者當攻之不令發汗矣若浮數而痛偏一處者身雖
疼不可發汗

數者急也卽緊也緊則爲寒指受寒而言數則爲熱
指發熱而言辭雖異而意則同故脉浮緊者

卽麻黃

黃症

脉浮而數浮爲風數爲虛風爲熱虛爲寒風虛相搏則
洒淅惡寒也

脉浮爲在表者何以表有風邪故也邪之所湊其氣

必虛數本爲熱而從浮見則數爲虛矣風爲陽邪陽浮則熱自發數爲陽虛陽虛則畏寒凡中風寒必發熱惡寒者風虛相搏而然也

諸脉浮數當發熱而洒淅惡寒若有痛處飲食如常者畜積有膿也

浮數之脉而見發熱惡寒之症不獨風寒相同而癰瘍亦有然者此浮爲表而非風數爲實熱而非虛矣發熱爲陽浮而惡寒非陽虛矣若欲知其不是風寒當以內外症辨之外感則頭項痛身痛骨節痛腰脊痛非痛偏一處也外感則嘔逆或乾嘔不得飲食如

常如此審之有畜積而成癰膿者庶不致誤作風寒
治則舉瘡家一症例之治傷寒者見脉症之相同皆
當留意也

瘡家身雖疼不可發汗汗出則瘕

瘡家病與外感不同故治法與風寒亦異若以風寒
之法治之其變亦不可不知也瘡雖痛偏一處而血
氣壅遏亦有徧身疼者然與風寒有別汗之則津液
越出筋脉血虛攣急而爲瘕矣諸脉症之當審正此
故耳

脉浮數者法當汗出而愈若身重心悸者不可發汗當

自汗出乃解所以然者尺中脉微此裡虛須表裡實津液自和便汗出愈

脉浮數者于脉法當汗而尺中微則不敢輕汗以麻黃爲重劑故也此表指身裡指心有指營衛而反遺心悸者非也身重是表熱心悸是裡虛然悸有因心下水氣者亦當發汗故必審其尺脉尺中脉微爲裡虛裡虛者必須實裡欲津液和須用生津液若坐而待之則表邪愈盛心液愈虛焉能自汗此表是帶言只重在裡至于自汗出則裡實而表和矣

寸口脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷

營營衛俱病骨肉煩疼當發其汗也

風寒本自相因必風先開腠理寒得入于經絡營衛俱傷則一身內外之陽不得越故骨肉煩疼脉亦應其象而變見于寸口也緊爲陰寒而從浮見陰盛陽虛汗之則愈矣

緊者急也卽數也緊以形象言數以至數言緊則爲寒指傷寒也數則爲熱指發熱也辭異而義則同故脉浮數浮緊者皆是麻黃症

脉法以浮爲風緊爲寒故提綱以脉陰陽俱緊者名傷寒太青龍脉亦以浮中見緊故名中風則脉但浮

者正爲風脉宜麻黃湯是麻黃湯固主中風脉症矣
麻黃湯症發熱骨節疼便是骨肉煩疼卽是風寒而
傷營衛俱病先輩何故以大青龍治營衛而傷麻黃
湯治寒傷營而不傷衛桂枝湯治風傷衛而不傷營
曷不以桂枝症之惡寒麻黃症之惡風一反勘耶要
之冬月風寒本同一體故中風傷寒皆惡風惡寒營
病衛必病中風之重者便是傷寒傷寒之淺者便是
中風不必在風寒止細分須當在有汗無汗上着眼
耳

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼痛八九日不解表症仍

在此當發其汗麻黃湯主之服藥已微除其人發煩目
瞑刺者必𩇛𩇛乃解所以然者陽氣重故也

脉症同大青龍而異者外不惡寒內不煩躁耳發于
陽者七日愈八九日不解其人陽氣重可知然脉緊
無汗發熱身疼是麻黃症未罷仍與麻黃只微除在
表之風寒而不解內擾之陽氣其人發煩目瞑見不
堪之狀可知陽絡受傷必逼血上行而𩇛矣血之與
汗異名同類不得汗必得血不從汗解而從𩇛解此
與熱結膀胱血自下者同一局也

太陽脉從自目內眦絡陽明脉于鼻鼻者陽也目者

陰也血雖陰類從陽氣而升則從陽竅而出故陽盛則衄陽盛則陰虛陰虛則目瞑也

解後復煩煩見于內此餘邪未盡故用桂枝更汗微除發煩是煩于外見此大邪已解故不可更汗仲景每有倒句法前輩隨文衍義謂當再用麻黃以散餘邪不知得衄乃解句何處著落

傷寒脉浮緊者麻黃湯主之不發汗因致衄

脉緊無汗者當用麻黃湯發汗則陽氣得泄陰血不傷所謂奪汗者無血也不發汗陽氣內擾陽絡傷則衄血是奪血者無汗也若用麻黃湯十汗液脫則斃

矣言不發汗因致衄豈有因致衄更發汗之理乎觀
少陰病無汗而強發之則血從口鼻而出或從目出
能不懼哉愚故亟爲校正恐誤人者多耳

太陽病脉浮緊發熱身無汗自衄者愈

汗者心之液是血之變見于皮毛者也寒邪堅斂于
外腠理不能開發陽氣大擾于內不能出玄府而爲
汗故逼血妄行而假道于肺竅也今稱紅汗得其旨
哉

衄家不可發汗汗出必額上脉緊急目直視不能眴不
得眠

太陽之脉起自目内眦上額已脫血而復汗之津液
枯竭故脉緊急而目直視也亦心腎俱絕矣目不轉
故不能眴目不合故不得眠

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不
可發汗以營氣不足血少故也

脉浮緊者以脉法論當身疼痛宜發其汗然寸脉雖
浮緊而尺中遲則不得據此法矣尺主血血少則營
氣不足雖發汗決不能作汗正氣反虛不特身疼不
除而亡血亡津液之變起矣○假令是設辭是深一
層看法此與脉浮數而尺中微者同義陽盛者不妨

發汗變症惟衄衄乃解矣陰虛者不可發汗止陽之變恐難爲力

太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下。麻黃湯主之。
三陽俱受氣于胸中而部位則屬陽明若喘屬太陽
嘔屬少陽故胸滿而喘者尚未離平太陽雖有陽明
可下之症而不可下如嘔多雖有陽明可攻之症而
不可攻亦以未離乎少陽也

陽明病脉浮無汗而喘者發汗則愈且麻黃湯。

太陽有麻黃症陽明亦有麻黃症則麻黃湯不獨爲
太陽設也見麻黃症卽用麻黃湯是仲景大法

右論麻黃湯脉症

太陽病。十日已去。脉浮細而嗜卧者。外已解也。設胸滿脇痛者。與小柴胡湯。脉但浮者。與麻黃湯。

脉微細但欲寐。少陰症也。浮細而嗜卧。無少陰症者。雖十日後尚屬太陽。此表解而不了了之。謂設見胸滿嗜卧。亦太陽之餘邪未散。兼脇痛。是太陽少陽合病矣。以少陽脉弦細也。少陽爲樞。樞机不利。一陽之氣不升。故胸滿脇痛。而嗜卧。與小柴胡和之。若脉浮而不細。是浮而有力也。無胸脇痛。則不屬少陽。但浮而不大。則不涉陽明。是仍在太陽也。太陽爲開。開亡。

反閤故嗜卧與麻黃湯以開之使衛氣行陽太陽仍得主外而喜寤矣與太陽初病用以發汗不同當小其制而少與之

右論麻黃湯柴胡湯相關脉症

麻黃湯

麻黃

二兩去節

桂枝

二兩

甘草

炙一兩

杏仁

七十

個去尖

水九升先煮麻黃減一升去沫內諸藥煮二升半溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法

麻黃色青入肝中空外直宛如毛竅骨節狀故能旁

通骨節除身疼直達皮毛爲衛分驅風散寒第一品
藥然必藉桂枝入心通血脈出營中汗而衛分之邪
乃得盡去而不留故桂枝湯不必用麻黃而麻黃湯
不可無桂枝也杏爲心果溫能散寒苦能下氣故爲
驅邪定喘之第一品藥桂枝湯發營中汗須啜稀熱
粥者以營行脈中食入于胃濁氣歸心淫精于脈故
耳麻黃湯發衛中汗不須啜稀熱粥者此汗是太陽
寒水之氣在皮膚間腠理開而汗自出不須假穀氣
以生汗也

服汗者停後服汗多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠也