

黃帝內經素問

一
函
冊

補注黃帝內經素問卷第

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

熱論

刺熱篇

評熱病論

逆調論

熱論篇第三十一

新校正云按全元起本在第五卷

黃帝問曰今夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死

皆以六七日之間其愈皆以十日以上者何也不知其

解願聞其故

寒者冬氣也冬時嚴寒萬類深藏君子固密不傷於寒觸冒之者乃名傷寒其傷於

四時之氣皆能為病以傷寒為毒者最乘殺厲之氣中而即病名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚至夏至前

變為溫病夏至後變為熱病然其發起皆為傷寒致之

故曰熱病者皆傷寒之類也新校正云按傷寒論云

至春變為溫病至夏變為暑病與王注異王注本岐伯

素問為說傷寒論本陰陽大論為說故此不同

對曰巨陽者諸陽之屬也榮衛於身故諸陽氣皆所宗

屬其脈連於風府風府穴名也在項上入髮際故為諸

陽主氣也足太陰脈浮氣之在頭中者人之傷於寒也

則為病熱熱雖甚不死寒青薄於皮膚陽氣不得散發

其兩感於寒而病者必不免於死藏府相應而俱帝曰

願聞其狀謂非兩感者之形證岐伯曰傷寒一日巨陽受之三陽

太陽脈浮脈浮者外在於皮故頭項痛腰脊強上文云

毛故傷寒一日太陽先受之

於風府略言也細而言之者足太陽脈從巔入絡腦還

出別下項循肩髃內俠脊抵脊中故頭項痛脊強

新校正云按甲乙經及太

素作頭項與脊脊皆痛二日陽明受之

以太陽人陽明主肉其脈俠鼻絡於目故身熱目疼而鼻

乾不得臥也

身熱者以肉受邪胃中熱煩故

乾不得臥也

受之少陽主膽

新校正云按全元起本膽作骨元起注

少陽之氣所榮故言主於

其脈循脅絡於耳故胃脅痛

而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者故可汗而

已

以病在表故可汗也

新校正云按全元起本藏作

諸陽而未入府故須汗發其

四日太陰受之

陰受也太

陰脈布胃中絡於咽故腹滿而咽乾五日少陰受之少

陰脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴六日厥陰

受之厥陰脈循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮三陰三

陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏不通則死矣死猶

言精氣皆斲也是故其死其不兩感於寒者七日巨陽

病衰頭痛少愈邪氣漸退經氣八日陽明病衰身熱少

愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹減如故

則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而噤十

二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣大氣

氣

謂大邪之氣也是故其愈帝曰治之奈何岐伯曰治之

各通其藏脈病日衰已矣其未滿三日者可汗而已其

滿三日者可泄而已此言表裏之大體也正理傷寒論

脈細沈數病在裏可下脈大浮數病為在表可發其汗

而脈大浮數猶宜發汗日數雖少即有裏證而脈沈細

數猶宜下之正應帝曰熱病已愈時有所遺者何也邪氣

隨脈證以汗下之衰去不盡如岐伯曰諸遺者熱甚而強食之故有所遺

也若此者皆病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱

相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實

調其逆從可使已矣審其虛實而補帝曰病熱當何

寫之則必已

禁之歧伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

是所謂戒食勞也熱雖少愈猶未盡除脾胃氣虛故未能消化肉堅食駐故熱復生復謂復舊病也帝曰

其病兩感於寒者其脈應與其病形何如歧伯曰兩感

於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾而煩

滿新校正云按傷寒論云煩滿而渴二日則陽明與太陰俱病則腹滿

身熱不欲食譫言譫言謂妄謬而不次也三日則

少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮而厥水漿不入不知人

六日死巨陽與少陰爲表裏陽明與太陰爲表裏少陽與厥陰爲表裏故兩感寒氣同受其邪帝

曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死

何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不

知人三日其氣乃盡故死矣

以上承氣海故三日氣盡乃死

凡病傷寒

而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑

當與汗皆出勿止

此以熱多少盛衰而為義也陽熱未盛為寒所制故為病曰溫陽熱大盛

寒不能制故為病

曰暑然暑病者當與汗之令愈勿反

止之令其甚也

新校正云按凡病傷寒已下全元起

本在奇病論中王氏移於此楊上善云冬傷於寒輕者

夏至以前發為溫病冬傷於寒甚者夏至以後發為暑

病

刺熱篇第三十二

新校正云按全元起本在第五卷

肝熱病者小便先黃腹痛多臥身熱

肝之脈環陰器抵少腹而上故小便

不通先黃腹痛多臥也
寒薄生熱身故熱焉

熱爭則狂言及驚脅滿痛手足

躁不得安臥

經絡雖已薄故云爭

受熱而神藏猶未納邪邪正相

上俠胃貫鬲布脅肋循

喉嚨之後絡舌本故狂言脅滿

痛也肝性靜而主驚駭故病則驚手足騷擾臥不得安

庚辛甚甲乙大汗氣逆則庚辛死肝主木故甚死於庚辛

也甲乙為木故

刺足厥陰少陽

厥陰肝脈少陽膽脈

其逆則頭痛

員員脈引衝頭也

肝之脈自舌本循喉嚨之後上出額與督脈會於巔故頭痛員員然脈引

衝於頭中也員

員謂似急也心熱病者先不樂數日乃熱

夫所以任治於物者

謂心病氣入於經絡則

神不

熱爭則卒心痛煩悶善嘔

頭痛面赤無汗

心手少陰脈起於心中其支別者從心系上俠咽小腸之脈直行者循咽下

抵胃其支別者從缺盆循頸上頰至目外眥故卒心痛

煩悶善嘔頭痛面赤也心在液為汗今病熱故無汗以

出新校正云按甲乙經外皆依兌王癸甚丙丁大汗

皆王注厥論亦作兌皆外當作兌王癸甚丙丁大汗

氣逆則王癸死心主火壬癸為水水滅火故甚死於壬

證經闕其文刺手少陰太陽陽少陰心脈太陽脾熱病者先頭重

頰痛煩心顏青欲嘔身熱胃之脈起於鼻交頰中下循

脣下交承漿卻循頤後下廉出大迎循頰車上耳前過

客主人循髮際至額顙故先頭重頰痛顏青也脾之脈

支別者復從胃別上鬲注心中其直行者上鬲俠咽故

煩心欲嘔而身熱也新校正云按甲乙經太素云脾

熱病者先頭重顏熱爭則瞤痛不可用俛仰腹滿泄兩

痛無顏青二字也

頰痛胃之脈支別者起胃下日循腹裏下至氣街中而

合以下脾氣街者腰之前故腰痛也脾之脈入腹

屬脾絡胃又胃之脈自交承漿卻循頤後甲乙甚戊己

下廉出大迎循頰車故腹滿泄而兩頤痛

大汗氣逆則甲乙死脾主土甲乙為木木伐土故甚死

已氣逆之證刺足太陰陽明太陰脾脈陽明胃脈新

經所未論校正云按甲乙經熱病下

篇云病先頭重顏痛煩心身熱熱爭則腰痛不可用俛

仰腹滿兩頤痛其暴泄善飢而不欲食善噫熱中足清

腹脹食不化善嘔泄有膿而苦嘔肺熱病者先漸然厥

無所出先取三里後取太白章門

起毫毛惡風寒舌上黃身熱肺主皮膚外養於毛故熱

毫毛也肺之脈起於中焦下絡大腸還循胃

口今肺熱入胃胃熱上升故舌上黃而身熱熱爭則喘

欬痛走胃膺背不得大息頭痛不堪汗出而寒肺居鬲

胃膺復在變動為欬又藏氣而主呼吸背復為胃中之

府故喘欬痛走胃膺背不得大息也肺之絡脈主會

之

中今熱氣上熏故頭丙丁甚庚辛大汗氣逆則丙丁死

痛不堪汗出而寒肺主金丙子為火火燠金故甚死於丙丁也庚刺手太

辛為金故大汗於庚辛也氣逆之證經闕未書陰陽明出血如太豆立已其絡脈盛者乃刺而出之

腎熱病者先腰痛脇痠苦渴數飲身熱其逆則項痛員員澹澹然筋循

中又腰為腎之府故先腰痛也又腎之脈自循內踝之後上腠內出膈內廉又直行者從腎上貫肝鬲入肺中

循喉嚨俠舌本故肝熱爭則項痛而強脇寒且痠足下

痠苦渴數飲身熱熱不欲言指勝胱之脈從腦出別下項又腎之脈起於小

後別入跟中以上膈內又其直行者從腎上貫肝鬲入

肺中循喉嚨俠舌本故項痛而強脇寒且痠足下熱不欲言也新校正云按其逆則項痛員員澹澹然筋循

甲乙經然骨作然谷其逆則項痛員員澹澹然筋循

脊內俠膂上至項結于枕骨與膀胱之筋合膀胱之脈
又並下于項故項痛員然也澹澹爲似欲不定也

戊己甚壬癸大汗氣逆則戊己死

腎主水戊己爲土土刑水故甚死於戊己

也壬癸爲水故

刺足少陰太陽

少陰腎脈太陽膀胱脈

諸汗者至

其所勝日汗出也

氣王日爲所勝王則勝邪故各當其王日汗

肝熱病者左

頰先赤

肝氣合木木氣應春南面正理之則其左頰也

心熱病者顏先赤

心氣合火

火氣炎上指象明候故候於顏額也

脾熱病者鼻先赤

脾氣合土土王於中鼻處面中

故占肺熱病者右頰先赤

肺氣合金金氣應秋南面正理之則其右頰也

腎熱

病者頤先赤

腎氣合水水惟潤下指家明候故候於頤也

病雖未發見赤色

者刺之名曰治未病

聖人不治已病治未病不治亂治未亂此之謂也

熱病從

部所起者至期而已

期為大汗脾戊己肺

庚辛腎壬癸是為期日也如肝甲乙心丙丁

也其刺之反者三周而已

反謂脾

病反取其氣也如肝病刺

刺肺肺病刺肝者皆是反刺五

藏之氣也三周謂三周

於三陰三陽之脈狀也又太陽

病而刺寫陽明陽明病

而刺寫少陽少陽病而刺寫太

陰太陰病而刺寫少陰

少陰病而刺寫厥陰如此皆為

反取三陰三陽之脈氣

也重逆則死

先刺已反病氣流

傳又反刺之是為重逆

一逆刺之尚至三

周乃已況其重逆而得

生邪諸當汗者至其所勝日汗大出也

王則勝邪故各當

其王日汗新校

正云按此條文注二十四字與前文重

復當從刪去甲乙經太素亦不重出

之寒水乃刺之必寒衣之居止寒處身寒而止也

在胃

陽氣外盛故飲寒乃刺熱

熱病先胷脅痛手足躁刺足

退則涼生故身寒而止鍼

陽氣外盛故飲寒乃刺熱

熱病先胷脅痛手足躁刺足

退則涼生故身寒而止鍼

退則涼生故身寒而止鍼

陽氣外盛故飲寒乃刺熱

熱病先胷脅痛手足躁刺足

退則涼生故身寒而止鍼

退則涼生故身寒而止鍼

陽氣外盛故飲寒乃刺熱

少陽補足太陰

此則舉正取之例然足少陽木病而寫

木傳於土也

胃脅痛巨虛主之巨虛在足外踝下如前

陷者中足少陽脈之所過也刺可入同身寸之五分留

七呼若灸者可灸三壯熱病手足躁經無所主治之旨

然補足太陰之脈當於井榮取之也

新校正云詳足

太陰全元起本及太素作手太陰楊上善云手太陰上

屬肺從肺出腋下故胃脅痛又按靈樞經云熱病而胃

脅痛手足躁取之筋間以第四鍼索筋於肝不得

索之於金金肺也以此決知作手太陰者為是病甚

者為五十九刺

五十九刺者謂頭上五行行五者以越

八者以寫胃中之熱也氣街三里巨虛上下廉此八者

以寫胃中之熱也雲門髃骨委中髓空此八者以寫四

支之熱也五藏俞傍五此十者以寫五藏之熱也凡此

五十九穴者皆熱之左右也故病甚則兩刺之然頭上

五行者當中行謂上星顙會前頂百會後頂次兩傍謂

五處承光通天絡卻玉枕又刺兩傍謂臨泣目窻正營

承靈腦空也上星在顙上直鼻中央入髮際同身寸之一寸陷者中容豆刺可人同身寸之四分新校正云
按甲乙經四分作三分水熱穴論注亦作三分詳此注
下文云刺如上星法又云刺如顙會法既有二法則當
依甲乙經及水熱穴論注上星刺入三分顙會刺入四
分顙會在星後同身寸之一寸陷者刺如上星法
前頂在顙會後同身寸之一寸五分骨間陷者中刺如
顙會法百會在前頂後同身寸之一寸五分頂中央旋
毛中陷容指督脈足太陽脈之交會刺如上星法後頂
在百會後同身寸之一寸五分枕骨上刺如顙會法然
是五者皆督脈氣所發也上星留六呼若灸者並灸五
壯次兩傍穴五處在上星兩傍同身寸之一寸五分承
光在五處後同身寸之一寸通天在承光後同身寸之
一寸五分絡卻在通天後同身寸之一寸五分玉枕在
絡卻後同身寸之七分然是五者並足太陽脈氣所發
刺可入同身寸之三分五處通天各留七呼絡卻留五
呼玉枕留三呼若灸者可灸三壯新校正云按甲乙
經承光不可灸玉枕刺入二分又次兩傍臨泣在顙

直目上入髮際同身寸之五分足太陽少陽陽維三脈
之會目窻正營遞相去同身寸之一寸承靈腦空遞相
去同身寸之一寸五分然是五者並足少陽陽維二脈
之會腦空一穴刺可入同身寸之四分餘並可刺入同
身寸之三分臨泣留七呼若灸者可灸五壯大桴在項
第一椎下兩傍相去各同身寸之一寸半陷者中督脉
別絡足太陽手太陽三脈氣之會刺可入同身寸之三
分留七呼若灸者可灸五壯新校正云按甲乙經作
七壯氣穴注作七壯刺瘡注熱穴注作五壯膺俞者
膺中俞也正名中府在胃中行兩傍相去同身寸之六
寸雲門下一寸乳上三肋間動脈應手陷者中仰而取
之手足太陰脈之會刺可入同身寸之三分留五呼若
灸者可灸五壯缺盆在肩上一寸橫骨陷者中手陽明脈氣
所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三壯
背俞當是風門熱府在第二椎下兩傍各同身寸之一
寸半腎脈足太陽之會刺可入同身寸之五分留七呼
若灸者可灸五壯驗今明堂中腧圖經不言背俞未詳
果何處也新校正云按王注水熱穴論以風門熱府