

R 26

2-2

御纂醫宗金鑑卷十六

編輯外科心法要訣目錄

嬰兒部

赤遊丹毒

胎瘤

紅絲瘤

胎癰瘡

痘癰

葡萄癰

胎驚丹毒

滯熱丹

嬰兒瘡瘍

垂癰

胎風

陰腫

臍突

脫肛

肛門作癰

遺毒

痘裏夾癰

痘疔

痘裏發丹

痘爛

痘風瘡

逐日人神所在不空鍼灸歌

十二時人神歌

十二支曰人神所在歌

十干日不空用鍼犯之病多反覆

九宮尻神圖

九宮尻神歌

升打靈藥固罐法

升打靈藥封罐口法

煉金頂砒法

製寒食麵法

御纂醫宗金鑑卷七十六

編輯外科心法要訣

嬰兒部

赤遊丹毒

胎毒初患赤遊丹腹肢先後內外參內服外貼兼砭血紅輕紫  
重黑難痊

註小兒赤遊丹之證皆由胎毒所致欲發之時先身熱詔叫

驚搐不寧次生紅斑山心漸入其色如丹遊走無定起於  
昔腹流散四肢者順起於四肢流入胸腹者逆或初生之  
後外用熱水洗浴兼以火烘衣物觸動內毒遂成此證治

之者先宜砭出惡血看血色紅者輕紫者重黑者死次宜  
牛羊肉片偏貼紅臺處微乾再易俟肉片不乾換如意金  
黃散用藍靛青汁調敷內初服大連翹飲次服消毒犀角  
飲大便秘結加生大黃三五分若煩躁唇焦面赤者宜服  
五福化毒丹若失治毒氣久復腹脹堅硬聲音嘶啞吮乳  
不下嚥者宜服紫雪散下之一二日間身輕腹軟熱退身  
涼砭處肉活乳哺如常者生反此者不治

大連翹飲

連翹去心

當歸

赤芍

防風

木通

渭石水飛

牛蒡子炒研

蟬蛻去足翅

瞿麥

石膏煅

荆芥

甘草生

柴胡

黃芩

梔子生研

車前子

各五分

水二鍾燈心二十根煎八分子與乳母同服

方大連翹飲赤遊丹歸芍防通滑勞蟬蛻石膏荆芥草柴  
芩榧子共車前

消毒犀角飲

犀角  
銙

防風各一錢

甘草生  
五分

黃連  
三分  
生

水二錘燈心二十根煎四分徐徐服之

方歌消毒犀角飲黃連防風甘草共和煎赤遊丹毒嘯驚搐氣

粗身熟服之安

五福化壽丹

黑參

赤茯苓

桔梗各二兩

牙消

青黛

黃連

龍膽草各一兩

甘草生五錢

人參

硃砂各三錢

米片五分

共研細末煉蜜爲丸如芡實大金鉗爲衣每服一丸薄荷

燈心煎湯化服

方 五福化毒消熱速瘡丹毒服卽除參芩桔草消水袋黃

連膽草黑參硃

如意金黃散

見腫  
瘍門

紫雪散

見舌  
部  
重舌

胎瘤

嬰兒初產患胎瘤胎熱瘀血是根由色紫漸大熟透刺放出膿  
汁自可瘳

註此證由胎前孕母積熱以致胞懿更兼血瘀滯結而成多  
生頭上及胸乳間初如李核漸大如餛色紫微硬漫腫不

甚疼痛嬰兒初生卽有者候過滿月熟透方可鍼之放出

赤豆汁或膿水汁其腫卽消初服五福化毒丹兼貼黃連

膏潰貼生肌玉紅膏生肌斂口若滿月後生者必待膿鼓

熟透鍼之若瘤皮含血絲者詳註於紅絲瘤

五福化毒丹

見赤遊  
丹毒

黃連膏

見鼻瘻  
鼻部

生肌玉紅膏

見消  
膿門

紅絲瘤

嬰兒初生紅絲瘤皮含血絲先天由精中紅絲腎伏火相搏患此終難瘳

註此證一名胎癰發無定處由小漸大嬰兒落草或二二歲之間患之瘤皮色紅中含血絲亦有自破者治法雖同胎瘤但此患由先天腎中伏火精有血絲以氣相傳生子故有此疾終變火證潰處亦難收斂

胎癰瘡

癰瘡始發頭眉間胎中血熱受風纏乾癰白屑濕淫水熱極紅  
暈類火丹

證

此證生嬰兒頭頂或生眉端又名奶奶癰瘡起自屑形如癰  
瘡由胎中血熱落草受風纏綿此係乾癰有誤用燙洗皮  
膚起粟搖瘡無度黃水浸滯延及徧身卽成濕癰俱服消  
風導赤湯乾者抹潤肌膏濕者用嫩黃蘋頭末與滑石等  
分撒之膿痂過厚再以潤肌膏潤之又有熱極皮膚火熱  
紅紫成片遊走狀如火丹治法不宜收斂只宜外發宜服  
五福化毒丹亦以潤肌膏搽之癰甚者俱用烏雲膏搽之

乳母俱忌

河海魚腥雞鴞辛辣動風發物緩緩自效

消風導赤湯

生地

赤茯苓各一錢

牛蒡

炒研

白鮮皮

金銀花

南薄荷葉

木通

各八分

黃連

酒炒

甘草

各三分  
生

燈心五十寸水煎徐徐服

方  
歌消風導赤醫胎癥疎風清熱勞黃連白鮮生地赤苓薄銀

花燈草木通甘

鳥雲膏

松香末二兩

硫黃末一兩

研勻香油拌如糊攤南青布上少半指厚捲成條線繫之  
再用香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭下用粗  
碗接之布灰陸續剪去取所滴藥油浸冷水內一宿出火

毒抹用

方烏雲膏擦胎癩瘡油拌松香末硫黃布攤捲紫香油泡火  
燃去灰用油良

潤肌膏

見項部白屑風

五福化毒丹

見赤遊丹毒

痘癰

痘癰毒留經絡中發無定處腫不紅留於肌肉爲治易結於骨節難成功

註此證因出大痘漿灌不足以致毒漿不得透發留結經絡之中隨處可生小如李者爲毒大如桃者爲癰漫腫不紅亦無焮痛身熱多煩若生單個者毒在肌肉屬順易治連發數處者船小載重屬險若結於骨節之間或成對發出者其毒已盛潰破之後滲泄氣血不能歛口屬逆初發不可強消俱宜服透膿散外敷烏龍膏膿熟鍼之加味太乙膏貼之若氣血虛弱者兼服保元湯潰後潮熱全退毒氣

方淨否則他處又發忌生冷硬麵發物

保元湯

人參

白朮  
土炒

當歸

黃耆各一錢

甘草三分

生薑一片紅棗肉二枚水二鍾煎八分食遠服

方

保元湯補真元氣脾胃虛弱服更宜人參白朮炙甘草當

歸薑棗共黃耆

透膿散

鳥龍膏

俱見腫  
瘍門

加味太乙膏

見  
瘍門  
潰

葡萄疫

葡萄疫同葡萄狀感受羸疫鬱凝生徧身發點青紫色毒攻牙齒類疳形

註此證多因嬰兒感受羸疫之氣鬱於皮膚凝結而成大小

青紫斑點色狀如葡萄發於徧身惟腿脰居多甚則邪毒攻胃以致牙齦齒爛臭味出血形類牙疳而青紫斑點其色反淡久則令人虛羸初起宜服羚羊角散久虛者宜服  
胃脾湯米泔水漱口以非疳散日擦四五次卽效近見中年之人下虛者亦患此證治法同前

羚羊角散

羚羊角

鎔

麥冬去心

黃芩

知母

牛蒡子炒研

防風

元參

各八分

甘草生

二分

水二鍾淡竹葉十片煎六分食遠服

方  
歌  
羚羊角散麥冬芩知勞防風草元參葡萄疫發初宜服煎  
加竹葉效如神

胃脾湯

白术土炒

遠志去心

麥冬

去心

沙參

茯神

陳皮

各六分

五味子

甘草炙

各五分