

00035

齊陽綱目



濟陽綱目目錄

卷九十三

小便不禁

論

治內熱小便不禁

茯苓琥珀湯

解毒四苓湯

治內虛小便不禁

四物合四苓湯

參芪湯

濟陽綱目

卷九十三

目錄

參朮湯

二苓丸

桑螵蛸散

既濟丸

水芝丸

益智丸

加味地黃丸

小兒絲子丸

一方

鷄膽散

一方

治虛寒小便不禁

衛真湯

大兔絲子丸

韭子丸

鹿茸丸

一方

秘元丹

縮泉丸

一方

一方

一方

濟陽綱目

卷九十三

目錄

十一

濟陽綱目卷九十三

涇陽張楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

小便不禁

原病式曰熱甚客於腎部，干於足厥陰之經，廷孔鬱結極甚，而氣不能宣，通則痿痺而神無所用，故液滲於膀胱，而旋溺遺失，不能收禁也。

戴氏曰小便多者，乃下元虛冷，腎不攝水，以致滲澀。

濟陽綱目 卷九十三 小便不禁

宜生料鹿茸丸，睡着遺尿者，此亦下元虛冷，治如前法，有盛喜致小便日夜無度，乃喜極傷心，心與小腸為表裏，宜分清飲，合四七湯煎服，再以辰砂妙香散，或小兔絲子丸間服，小便數者，頻頻欲去而溺不多，但不痛耳，此腎與膀胱俱虛，客熱乘之，虛則不能制水，宜補腎丸，六味地黃丸，熱又水道澀而不利，八正散，或五苓散加黃柏，知母，麥門冬，木通，大便秘，小便數者，是謂脾約病，脾約丸主之。

丹溪曰小便不禁者，屬熱屬虛，熱者五苓散加解毒。

虛者五苓散加四物。

王節齋曰小便不禁，或頻數，古方多以為寒，而用溫澁之藥，殊不知屬熱者多。蓋膀胱火邪妄動，水不得安，故不能禁而頻數來也。故年老人多頻數，是膀胱血少，陽火偏旺也。治法當補膀胱陰血，瀉火邪為主，而佐以收澁之劑，如牡蠣、山茱萸、五味之類，不可用溫藥也。病本屬熱，故宜瀉火，因水不足，故火動而致小便多，小便既多，水益虛矣，故宜補血，補血瀉火，治其本也。收之澁之，治其標也。

濟陽綱目 卷九十三 小便不禁

東垣云小便遺失者，肺金虛也，宜安臥養氣，禁勞役，以黃芪、人參之類補之，不愈當責有熱，加黃柏、生地黃。

吳氏曰下焦虛脫者，澁之，經云水泉不止者，是膀胱不藏也。仲景云下焦竭則遺溺失便，其氣不能自禁，制不須治，穴則愈。又云下焦不歸則遺洩，世用桑螵蛸、雞內金，虛滿腹切者，此膀胱切音，雞之腸胃也，膀胱鳥藏也，牛百葉牛肚亦名膀胱，之類是也。

李氏曰小便不禁，出而不覺赤者，有熱，白者氣虛。

實熱乃膀胱火動四苓散合三黃湯加五味子山茱萸少許虛熱四苓散合四物湯加山梔升麻虛乃腎與膀胱氣虛十全大補湯加益智仁或縮泉丸大宛絲子丸二苓丸遇夜陰盛愈多內虛自汗者秘元丹內虛濕熱者腎氣丸八味丸戒澤瀉附子加五味子杜仲破故紙倍山茱萸內虛寒冷者古桂附湯大宛絲子丸加肉桂頻數而少輕於不禁勞心者妙香散桑螵蛸散勞役傷脾者補中益氣湯脾約證見傷寒下虛內損則膀胱不約便溺自遺或尿後餘濟陽綱目

卷五十三

小便不禁

三

瀝皆火盛水不得安治宜補膀胱陰血瀉火邪為主而佐以牡蠣山茱萸五味子之類不可用溫藥古方補陰丸最妙婦人產後傷胞小兒胞冷鵝臘脂散主之

○治內熱小便不禁

茯苓琥珀湯

治膏梁濕熱內蓄不得施化

膀胱竅澁小便頻數而短少脉沉緩時時帶數

茯苓猪苓白朮

琥珀各半

澤瀉一兩

滑石七錢甘草炙

桂去皮各三錢

右爲細末每服五錢煎長流水一盞空心食前調下待少時以美膳壓之

解毒四苓湯二

治有熱小便不禁

白朮茯苓猪苓澤瀉黃連黃柏

梔子山茱萸各一錢五味子十五粒

○治內虛小便不禁二

四物合四苓湯三治虛弱不禁

白朮茯苓澤瀉猪苓當歸川芎

芍藥生地黃山茱萸各一錢五味子十五粒

濟陽綱目

卷五十三

小便不禁

四

右剉水煎空心服

參芪湯四

治氣虛遺溺失禁

人參黃芪各一錢炒水茯苓白朮當歸

熟地黃陳皮各一錢益智仁八分升麻

肉桂各五錢甘草三分

右剉加生姜三片棗一枚水煎空心服年老

之人虛寒遺溺者多加附子名參附湯補中

益氣湯加益智五味子亦可服

參朮湯五

治身體虛瘦遺溺失禁

人參八分 白朮炒 黃芪蜜水 山藥炒

白芍藥酒炒各一錢 山茱萸蜜水 酸棗仁炒各七分

甘草炙四分

右到一劑水煎空心服

二苓丸六 治心腎不足精神恍惚小便淋瀝

不禁

赤茯苓 白茯苓 各等分

右爲末以新汲水澄去新沫控乾別去地黃汁與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈子

濟陽綱目 卷五十三 小便不禁 五

大每服一丸空心鹽酒嚼下

桑螵蛸散七 治勞傷心腎小便頻數如米泔色

能安神定志有服此藥不終劑而愈

桑螵蛸鹽炙 遠志去心 龍骨 人參 菖蒲鹽炙

扶神去木 驚甲炙 當歸 各等分

右爲末每服二錢臨臥人參湯調服

既濟丸八 治小便不禁

兎絲子酒製 益智仁炒 茯苓 韭子炒

肉蓯蓉酒洗 當歸 熟地黃各五錢 黃柏鹽酒炒

知母鹽酒炒 牡蠣煅 石棗酒蒸去核各三錢

五味子一錢

右爲末麵糊丸如桐子大每服百丸空心鹽湯

下

水芝丸九 治上焦真氣虛弱小便頻數日夜

無度

蓮肉去皮不拘多少用酒浸一二宿猪肚一箇將蓮肉入肚中多半爲度水煮熟取出切焙

乾

右爲細末酒煮麵糊丸如芡實大每服五十丸

濟陽綱目 卷五十三 小便不禁 六

食前米飲下

益智丸十 治下元氣虛小便頻數

人參 黃柏酒浸各五錢 益智仁六錢 甘草一錢

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸五更

臨臥滾水酒任下

加味地黃丸十一 治內虛熱者小便頻數不禁

熟地黃八兩 山茱萸酒蒸去核 乾山藥各四兩

牡丹皮 白茯苓 澤瀉 牡蠣 五味子各三兩

右爲末地黃膏和煉蜜丸如桐子大每服百丸

空心滾湯下 一方六味丸去澤瀉加益智仁

小兒絲子丸 十二

石蓮肉二兩 兔絲子酒浸五兩 白茯苓一兩

山藥二兩 打糊

右爲末用山藥粉打糊丸如桐子大每服五十

丸空心用酒鹽湯任下

一方 十三 治小便遺失

阿膠炒成珠 牡蠣 鹿茸酒浸 桑螵蛸酒炙各等分

右爲末糯米糊丸如桐子大每服五十丸空心

濟陽綱目 卷九十三 小便不禁 七

鹽酒任下

鷄胞散 十四 治遺尿失禁

鷄胞一具並腸男用雌女用雄洗淨燒灰

右爲末每服二錢空心溫酒調服或加猪脾

燒灰

一方 十五 治遺尿失禁

破故紙爲末每服二三錢空心熱水調下又宜氣

海穴灸之

○治虛寒小便不禁 二

衛真湯 十六 治男婦元氣衰憊榮衛怯弱真陽

不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面

無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背倦心氣虛乏

精神不安驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕

痺夜多小便腫重冷痛牽引小腹足膝緩弱行步

艱難婦人血海久冷經候不調或過期不止或一

月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕

並皆治之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺

極之際補腎實藏男子攝血化精諸病未萌之前

濟陽綱目 卷九十三 小便不禁 八

皆能制治使不復爲梗

人參半兩 金釵石斛各五兩 白茯苓 木香

肉苳薹 山藥 熟地黃各三兩 牛膝童便酒浸一宿

生地黃各二兩 當歸 青皮去白 丁香各一兩

右爲細末每服三錢酒調下鹽湯亦得空心食

前服婦人諸病童便同酒調空心下

大兒絲子丸 十七 治內虛裏寒自汗不止小便

不禁

兔絲子 肉苳薹各二兩 黑附子 五味子

鹿茸 鷄脆胚 桑螵蛸 各一兩

右爲末酒糊丸如桐子大每服七十九空心鹽

湯酒任下 一方有牡蠣一兩

韭子九 十八 治老人下元虛冷小便不禁或成

白濁

韭子 炒六兩 鹿茸 酥炙 茯苓 酒浸 牛膝 酒浸

熟地黃 當歸 各二兩 兔絲子 酒浸 巴戟 去心各

杜仲 炒 石斛 去 乾姜 炮 桂心 各一兩

右爲末酒糊丸如桐子大每服一百丸空心鹽

濟陽綱目 卷九 三 小便不禁 九

湯溫酒任下 老人又宜八味丸加益智仁去

澤瀉

鹿茸九 十九 治久虛冷小便白濁滑數不禁

鹿茸 酥炙 牛膝 酒浸 五味子 各二兩 石斛

杜仲 姜汁 炒 巴戟 去 山藥 兔絲子 酒煮 搗爛

川練肉 澤瀉 各一兩 附子 炒 官桂 沉香 各半兩

右爲末酒糊丸如桐子大每服七十九空心鹽

酒下

一方二十 治男子婦人一切虛冷之疾活血駐

顏臧小便除盜汗治婦人久不生育似帶疾而非時有遺瀝並皆治之功效不可具述

蒼朮 切 川練子 茴香 吳茱萸 湯洗 破故紙

胡蘆巴 並炒各一兩 山藥 二兩 川姜 川烏

草烏 並炮各半兩

右爲細末醋糊丸如桐子大每服十五丸空心

溫酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日二服

秘元丹 二十一 治冷氣攻心腹痛泄瀉自汗遺溺

陽衰足冷真氣不足一切內虛裏寒等證

濟陽綱目 卷九 三 小便不禁 十

白龍骨 三兩 訶子 十枚 砂仁 辰砂 各一兩

右爲末糯米粥丸如菉豆大每服空心酒下一

丸臨臥冷水下三丸忌葱茶韭

縮泉丸 二十二 治脬氣不足小便頻數一日夜百

餘次

益智仁 天白烏藥 各等分

右爲末酒煮山藥糊丸如桐子大每服五七十

丸臨臥鹽湯下

一方二十三 治夜多小便

益智仁二十箇 赤茯苓二錢

右剉水煎臨臥熱服

一方二十四 治小兒小便不禁夜多遺尿

益智仁一兩 附子一兩 炒乾去灰

右爲末每用二茶匙米湯調下

一方二十五 治下焦虛冷小便數損無力

生薯蕷半斤刮去皮一刀切碎於鍋中煮酒沸下

薯蕷不得攪待熟加鹽葱白更添酒空腹服二三

蓋妙

濟陽綱目 卷九十三 小便不禁

十一

濟陽綱目目錄

卷九十四

大便燥結

論

脈法

治大便熱秘一

當歸潤燥湯一

大承氣湯三

枳榔丸五

濟陽綱目 卷九十四 目錄

東流飲七

消毒麻仁丸九

單枳榔散十一

治大便風秘二

疎風散十三

潤腸湯十五

又皂角丸十七

參仁丸十九

治大便氣秘三

大黃飲子二

潤腸丸四

牛黃散六

脾約丸八

玄明粉散十

潤腸湯十二

活血潤燥丸十四

枳殼丸十六

大麻仁丸十八

三和散 二十

六磨湯 二十一

升陽瀉濕湯 二十二

木香三稜散 二十三

潤腸丸 二十四

南木香丸 二十五

搜風潤腸丸 二十六

枳殼丸 二十七

橘杏丸 二十八

紫蘇麻仁粥 二十九

治大便虛秘 四

導滯通幽湯 三十

小麻仁丸 三十一

潤腸丸 三十二

滋腸五仁丸 三十三

茯苓潤腸丸 三十四

一方 三十五

濟陽綱目

卷九十四 目錄

二

厚朴湯 三十六

治大便冷秘 五

半硫丸 三十七

備急大黃丸 三十八

治大小便不通 六

顛倒散 三十九

倒換散 四十

八正散 四十一

鐵腳丸 四十一

加味二陳湯 四十二

迴生神膏 四十二

一方 四十五

車狗散 四十六

蟻蠅散 四十七

蝟牛膏 四十八

濟陽綱目卷九十四

涇陽張 梅蔭庭註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚 恩錫三續梓

大便燥結

東垣曰金匱真言論云北方黑色入通腎開竅於二陰藏精於腎又云腎主大便大便難者取足少陰夫腎主五液津液潤則大便如常若飢飽失節勞役過度損傷胃氣及食辛熱味厚之物而助火邪伏於血

濟陽綱目

卷九十四 大便燥結

一

中耗散其陰津液虧少故大便燥結燥然結燥之病不一有熱燥有風燥有陽結有陰結又有年老氣虛津液不足而燥結者治法云腎惡燥急食辛以潤之結者散之如少陰不得大便以辛潤之太陰不得大便以苦泄之陽結者散之陰結者溫之仲景云小便利而大便硬不可攻下以脾約丸潤之食傷太陰腹滿而食不化腹響不能大便者以苦泄之如血燥而不能大便者以桃仁酒製大黃通之風結燥而大便不行者以麻子仁加大黃利之如氣澁而大便不通者

以郁李仁、枳實、皂角仁潤之。大抵治病必究其源，不可一藥用巴豆、牽牛之類下之，損其津液，燥結愈甚，復下復結，極以至引導於下而不通，遂成不救，噫，可不慎哉。

丹溪曰：秘結有虛者，有風者，有濕者，有火者，有津液不足者，有寒者，有氣結者，切不可一例用芒硝、大黃、利藥、巴豆、牽牛，尤不可用。久病腹中有實熱，大便不通，宜用潤腸丸微利之，不宜用峻利之藥。古方有脾約證，制脾約丸，謂胃強脾弱，約束津液，不得四濟。陽綱目

卷十四 大便燥結 二

布，但輸膀胱，故小便數而大便難。曰：脾約與此丸以下脾之結，燥腸潤結，化津液入胃而愈。然既曰脾約，必陰血枯槁，內火燔灼，熱傷元氣，故肺受火邪而津竭，必竊母氣以自救。金耗則土受木傷，脾失轉輸，肺失傳送，宜大便秘而難，小便數而無藏蓄也。理宜滋養陰血，使陽火不熾，金行清化，脾土清健，津液入胃，脾潤而通矣。今此丸用之，熱甚而氣實，與西北方人稟壯實者，無不安。若用之東南方人，與熱雖盛而氣血不實者，雖得暫通，將見脾愈弱而腸愈燥矣。須知

在西北，以開結為主；在東南，以潤燥為主。一老人因內傷挾外感，自誤汗後，以補藥治愈，脈尚洪數，予謂洪當作大，論年高誤汗，後必有虛證，仍與參芪歸朮、陳皮、甘草等，自言從病，不曾更衣。今虛勞逆痛，不堪欲用利藥，予謂非實秘，為氣困，因誤汗而虛，不得充腹，無力可努，仍用前藥，間以肉汁粥，及鎖陽粥與之，濃煎蔥椒湯，浸下體，下軟塊五六枚，脈大未斂，此血氣未復，又與煎藥。二日小便不通，小腹滿悶煩苦，仰臥，則點滴而出，予曰：補藥未至，倍參芪，服二日，小便通，至半月而愈。

濟陽綱目 卷九十四 大便燥結 三

葉氏曰：秘結之證，多面黃，其候有風，有冷，有氣，有熱。有老人津液乾燥，婦人分產亡血，及發汗利小便，病後血氣未復，皆能作秘，不可一例用芒硝、利藥。巴豆、牽牛，尤不可用。風秘者，由風搏肺，藏傳於大腸，故傳化難。或其人素有風病者，亦多有秘，宜升麻、防風、羌活、荆芥煎湯，入竹瀝，吞脾約麻仁丸。冷秘，由冷氣橫於腸胃，凝陰固結，津液不通，胃道閉塞，其人腸內氣攻，喜熱惡冷，即仲景所謂陰結病也，宜理中湯

加官桂枳壳吞半硫丸。氣秘由氣不升降穀氣不行其人多噎宜蘇子降氣湯或木香枳榔丸。有氣作痛大便秘塞用導劑而便更不通又有氣秘強通雖通復閉或迫之使通因時下血者此當順氣氣順則便自通又當求溫煖之劑。熱秘面赤身熱腸胃脹悶時欲得冷或口舌生瘡此由大腸熱結虛者潤腸丸實者承氣湯。老人虛秘及出汗利小便過多產後亡血一切病後血氣未復而秘者並宜潤腸丸宿食留滯結而不通腹脹氣急木香枳榔丸。熱藥

濟陽綱目

卷九十四 大便燥結

四

多秘惟硫黃煖潤而疏通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄。

李氏曰燥結兩字不同燥有風燥熱燥火燥氣血虛燥結有能食脉實數者爲陽結不能食脉弦微者爲陰結亦有年高氣血虛結者。燥屬少陰津液不足辛以潤之結屬太陰有燥糞苦以瀉之凡結後仍服潤血生津之劑免其再結再通愈傷元氣。燥結因肝木自旺或肺風入大腸者曰風燥搜風順氣丸因藏府積熱或久病鬱熱者曰熱燥四順清涼飲當歸

龍蓄丸因脾胃伏火便閉不食者曰血燥四物湯加大黃桃仁或爲丸服大便偏秘者導滯通幽湯小便偏秘者導氣除濕湯陰虛火燥者補中益氣湯通用四物湯川芎爲君天麥門冬爲臣瓜蒌爲佐升麻紅花甘草爲使風加秦艽或牛膝熱加黃芩血倍生地黃渴加天花粉五味子閉結加大黃郁李仁麻仁氣虛量加參芪陰虛加知母黃柏大抵宜甘寒潤劑忌辛香動火及一切發汗之藥經曰燥者潤之養血之謂也。濕熱拂鬱心腹脹滿有蟲積者枳榔丸凡燥

濟陽綱目

卷九十四 大便燥結

五

結有時者爲實無時者爲虛有藥石毒者大小便閉氣脹如鼓者三和散合三黃湯飲食毒者香連丸胃火者白虎湯。津少因發汗利小便過多及產後失血等證血液枯者五仁丸腎氣丸大補陰丸或導滯通幽湯加枳榔條芩陳皮氣虛者參仁丸補中益氣湯挾七情者古菴沉丸。藏寒則氣澁藏冷則血枯有痼癖冷氣結滯者古半硫丸古姜附湯五積散水令與之其病雖宜服陽藥若大便不通者亦當暫與潤劑微通大便不令閉結。七情氣閉後重窘迫者

三和散。六磨湯如脉浮。晝便難者。用陳皮杏仁等分。蜜丸服。脉沉夜便難者。換桃仁。痰滯不通者。一陳湯加枳壳枳榔。宿食秘喘者。須審寒熱。傷熱物者。二黃丸傷寒物者。丁香脾積丸。通用備急大黃丸。有脾胃伏火者。潤腸丸。治秘結須流行肺氣。蓋肺與大腸為表裏故也。枳梗湯加紫蘇或蘇子降氣湯。或蘇子麻仁膏。又如脾約證。胃強脾弱。約束津液。不能四布。但輪膀胱。故小便數而大便難。此脾約丸之由制也。但脾屬陰虛。火燔金耗。則肺失傳化。尤宜滋濟陽綱目

卷九十四 大便秘結 六

陰養血。在西北壯實者。以脾約丸開結可也。東南氣血虛者。潤燥為主。通用冷熱熨法。掩臍法。麻油導法。

陰按夫燥結之證。有虛實二者之分。或因風寒邪從外入。或因七情火自內起。此是濕熱沸熱燥結。有時乃為實也。實則宜蕩滌腸胃。開結軟堅。如大黃芒硝枳實厚朴承氣湯之類是也。或因病久。飲食少進。或因年高。將息失宜。此是血液枯涸。燥結無時。乃為虛也。虛則宜滋養陰血。潤燥散熱。如當歸地黃桃仁條

芩潤燥湯之類是也。若不審虛實而輕用藥。死生如反掌之易矣。可不畏哉。

脉法

脉多沉伏而結。陽結脉沉實而數。陰結脉伏而遲或結。老人虛人便結。脉雀啄者不治。

脉訣舉要曰。執厥脉伏時。或而數便秘必難治。不可錯。

又結之脉沉伏勿疑熱結沉數。虛結沉遲若是風燥必右尺浮肥。

濟陽綱目 卷九十四 大便秘結 七

治大便秘結一

當歸潤燥湯一 治大便秘結不通

升麻 生地黃 各一錢半 當歸尾 熟地 砂仁 大黃

桃仁 另研 麻仁 去殼 生草 各一錢 紅花 五分

右剉作一服水煎空心服 一方有黃蘗無紅

花

大黃飲子 治身熱煩燥大便不通

大黃 煨 二 杏仁 炒去尖 枳殼 炒 梔子 各一錢半

升麻 錢 生地 炒 人參 黃芩 各七分

甘草 炙五分

右剉一服加生薑五片豆豉二十一粒烏梅一箇水煎食前服

大承氣湯 三

治腸胃熱厥極深大便燥結以此下之

大黃 酒洗

芒硝 厚朴 枳實 各等分

右剉每服量證大小用水先煮厚朴枳實二物

至七分納大黃煮至五分去粗納芒硝煎一二

沸通口服以利為度不利再服 本方主芒硝

濟陽綱目

卷九十四 大便燥結

八

名小承氣湯 去厚朴枳實加甘草名調胃承

氣湯 本方加甘草名三一承氣湯皆可用

潤腸丸 四

治脾胃伏火大便秘澁或乾燥不

通全不思食及風結血秘皆令閉塞也以此潤燥

和血疎風自然通利

桃仁 湯泡去皮尖

麻仁 去壳各一兩

當歸稍

大黃 煨

羌活 各五錢

右除桃仁麻仁另研如泥外餘杵為細末煉蜜

丸如桐子大每服三五十九空心白湯下 如

風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦艽以利之 如脉澁覺身有氣澁而大便不通者加郁

李仁大黃以除氣燥

檳榔丸 五

治大腸濕熱氣壅不通心腹脹滿

大便秘結

大黃 酒洗

黃芩 枳實 煨 牽牛 炒

檳榔

羌活 麻子仁 炒去壳

杏仁 炒 白芷 各一兩

人參 五錢

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十九空心

濟陽綱目

卷九十四 大便燥結

九

白湯下

牛黃散 六

治上焦熱藏府秘結

大黃 一兩

白牽牛 頭末半兩

右為細末有厥冷用酒調下三錢無厥冷而手

足寒者蜜調下食後以微利為度

東流飲 七

治大便秘結閉塞

大黃 一錢或二錢或三錢

生桃仁 七枚

生芝蔴

細茶 各一

甘草 五分

右用長流水生搗碎服立效并水亦用

脾約丸 八

麻仁一兩二錢半 杏仁去皮尖炒 枳實炒 厚朴

赤芍藥各二兩 大黃四兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心米

湯下

消毒麻仁丸 九

杏仁二兩 大黃生五兩 山梔子十兩

右爲末蜜丸桐子大每服五十丸食前白湯下

玄明粉散 十 治血熱便秘

濟陽綱目 卷九十四 大便秘結 十

玄明粉 三錢 當歸 五錢

右煎湯調服

單樞椰散 十一 治腸胃有熱大便秘澀

樞榔 一味

右爲末每服二錢蜜湯調下

潤腸湯 十二 治虛老人大便閉結

蜂蜜 一兩 香油 五錢 朴硝 一握

右合一處水一鍾煎數沸溫服

○治大便風秘 二

疎風散 十三 治風毒秘結

枳殼炒 防風 羌活 獨活 樞榔 白芷

戴靈仙 蕤藜炒去刺 麻仁去殼 杏仁去皮尖

甘草 炙各一兩

右剉每服二錢半加生姜五片蜜一匙慢火煎

服

活血潤燥丸 十四 治大便秘血秘時常結燥

當歸酒洗 防風 大黃酒洗 羌活各一兩

桃仁二兩研如泥 皂角仁燒存性 麻仁二兩半研如泥

濟陽綱目 卷九十四 大便秘結 十

右除桃仁麻仁另研如泥外爲細末煉蜜丸如

桐子大每服五十丸白湯下三兩服後須以麻

子仁煮粥每日早晚食之大便日久不能結燥

也此藥以磁礮盛之紙包封毋令見風

潤腸湯 十五 治大便秘澀連日不通

麻子仁一盞半細研用水浸 荆芥穗爲末四兩

芝蔴微炒半盞研 桃仁湯浸去皮炒

右入鹽少許同煎可以代茶飲之以利爲度食

前服

枳殼丸 十六

治腸胃風氣壅盛大便秘實

大黃炒二兩

枳殼炒

木香不見火

皂角去黑皮少

香白芷

橘紅

桑白皮各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心米飲姜湯下

飲姜湯下

又皂角丸 十七

治大腸有風大便秘結年高人宜服

宜服

皂角炙去子

枳殼主積熱炒各等分

右爲細末蜜丸桐子大每服七十丸空心米飲

濟陽綱目

卷九十四 大便秘結

主

下

大麻仁丸 十八

治婦人腸胃風結大便秘

大麻子主去研膏

大黃

檳榔

木香

枳殼各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食前白湯下

湯下

麥仁丸 十九

治氣壅風盛便秘後重疼痛煩悶

麻仁 大黃各三兩

人參七錢

當歸一兩

右爲末蜜丸桐子大每服三十丸熱水下

○治大便秘三

三和散 二十

治七情之氣結於五藏不能流通

以致脾胃不和心腹痞悶大便秘澀

羌活 紫蘇

宣木瓜

沉香各一兩

木香

白朮 枳榔

陳皮

甘草炙各七錢半

川芎三兩

大腹皮 一兩

右咬咀每服五錢水煎食前服

六磨湯 二十一

治氣滯腹急大便秘澀

沉香 木香

枳榔

烏藥

枳殼

大黃各等分

右用熱湯磨細服之

濟陽綱目

卷九十四 大便秘結

主

升陽瀉濕湯 二十二

治隔噎不通逆氣裏急大便不行

不行

青皮

槐子各二分

生地姜酒炒

熟地砂仁炒

黃柏各二分

當歸身

甘草稍分

蒼朮五分

升麻七分

黃芪錢一

桃仁十箇去皮另研

右剉作一服水煎食前熱服

木香三稜散 二十三

治腹中有蟲面色痿黃一切積滯

積滯

黑牽牛半生半炒多用

大腹皮多用

枳榔

木香

雷丸 錫灰醋炒 三稜煨 莪朮煨 大黃各二兩

右爲細末每服三錢空心蜜水調下或砂糖水亦可須先將燒肉一片口中嚼之吐出後服藥

潤腸丸 二十四 治大腸風結氣澁

南木香錢二 青橘皮 枳榔 陳橘皮 各一兩

肥皂角五片醋黃魚去皮子五片生用去皮子二兩共爲末五片水一升煮取濃汁濾乾慢火銀石器內熬成膏

右四味爲末以皂角膏搜和成劑如硬少入蜜爲丸如桐子大每服三十丸空心溫水下

濟陽綱目 卷九十四 大便燥結 齒

南木香丸 二十五 治大便秘結

南木香不見火 枳榔 麻仁 枳殼 各等分

右先將枳殼去穰每箇切作四片用不蛀皂角

三寸生薑五片巴豆三粒畧搥碎不去壳用水

一盞將枳殼同煮和滾濾去生薑巴豆皂角不

用以將枳殼剉細焙乾爲末入前藥爲末煉蜜

丸如桐子大蜜湯下三十丸不拘時

搜風潤腸丸 二十六 治三焦不和胸中痞悶氣不

升降飲食遲化腸胃燥澁大便秘結

沉香 檳榔 木香 青皮 蘿蔔子炒 陳皮

白去 枳殼去穰炒 三稜煨 枳實炒 木通各五錢

郁李仁去皮一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服五六十丸木瓜湯下常服溫潤腸胃導化風氣一方有大黃

無木通米飲下

枳殼丸 二十七 治三焦結大小便不通穀氣不得

下行

枳殼炒 陳皮各二兩 枳榔半兩 木香 一錢半

濟陽綱目 卷九十四 大便燥結 圭

黑丑四兩半生半炒拌頭末一兩半餘不用

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服十五丸姜湯

下

橘杏丸 二十八 治老人虛弱人氣秘大便不通

橘紅爲末 杏仁浸去皮尖另研各等分

右和勻煉蜜丸如桐子大每服七十九空心米

飲下

紫蘇麻仁粥 二十九 能順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁

右二味不拘多少研爛水濾取汁煮粥食之

○治大便虛秘四

導滯通幽湯三十 治大便難幽門不通上衝吸

門不開噎塞不便燥秘氣不得下治在幽門以辛

潤之

當歸身 升麻 桃仁泥各一錢半 生地黃姜汁酒炒

熟地黃各一錢 甘草 紅花各五分

右作一服水煎食前調栳柳細末二錢稍溫服

一方有大黃無甘草治結燥腹痛加麻仁大

濟陽綱目卷九十四 大便燥結 七

黃名當歸潤燥湯

小麻仁丸三十一 能潤血燥大便不通

麻子仁 當歸 桃仁 生地黃 枳殼各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心白

湯下

潤腸丸三十二 治血枯大便閉澀

杏仁去皮尖炒 枳殼炒 麻仁另研 陳皮 阿膠蛤粉炒

炒 防風 當歸稍洗 肉蓯蓉酒洗 桃仁去皮尖炒

研另 生地黃各一兩

右爲末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心白

湯下 一方無蓯蓉以下四味

滋腸五仁丸三十三 治血液枯槁大腸秘澀傳道

艱難

桃仁 杏仁各去皮尖一兩 栳子仁兩半 松子仁一錢二分

郁李仁炒一錢 陳皮四錢另爲末

右將五仁別研爲膏入陳皮末研勻煉蜜丸如

桐子大每服五十丸空心米飲下

蓯蓉潤腸丸三十四 治發汗過多耗散津液大便

濟陽綱目卷九十四 大便燥結 七

秘結

肉蓯蓉酒浸焙二兩 沉香另研一兩

右爲末用麻子仁汁打糊爲丸如桐子大每服

七十丸空心米飲下

一方三十五 治大便虛秘而熱

白芍藥一兩半 陳皮 生地黃 歸身各一兩

條芩 甘草各一錢

右爲末粥丸桐子大每服七八十丸白湯下

厚朴湯三十六 治胃虛而閉不能飲食小便清利