

御纂醫宗金鑑

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣目錄

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鐵鍼入肉

鐵鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

骨骯咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘕

湯火傷

凍瘡

人齧傷

熊虎狼傷人

馬咬傷

瘋犬咬傷

馬汗驢涎入瘡

蛇咬傷

蜈蚣咬傷

蠍螫

蠶咬

射工傷

行多醫藥金
卷一十三
二
蚯蚓傷

天蛇瘡

蠅蝮傷

百蟲入耳

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

跌撲之證屬尋常復元活血湯最良已破亡血入
珍服未破血瘀大成湯

註此證有已破未破之分亡血瘀血之別如尋

常跌撲微傷皮肉疼痛未破者以復元活血
湯散瘀活血若損傷筋骨血流過多不止者

卽爲亡血急用花薤石散乾撒止血內服八
珍湯加酒炙骨碎補續斷紅花若從高跌墜
未曾損破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必
昏沉不醒二便秘結當以大成湯通利二便
其人自醒若便利不醒者灌獨參湯救之

大成湯

大黃 三錢

朴消

枳殼 各二錢

麩炒

厚朴 薑炒

當歸

紅花

木通

蘇木

陳皮

甘草 各一錢
生

水二鍾煎八分不拘時服服後二時不行渣

再煎加蜜三匙冲服

方歌

大成活瘀便立通消黃枳殼厚歸紅木通蘇

木陳皮草煎服不行加蜜冲

復元活血湯

當歸尾 二錢

柴胡 一錢五分

穿山甲

炙研

紅花

枯蘘仁

各七分

甘草

五分

桃仁

十七個

大黃

三錢

水二鍾酒二鍾煎一鍾食遠服以利爲度

方歌

復元活血跌撲證惡血流瘀積滯疼山甲柴

紅枯蘘草桃仁歸尾大黃行

化蘘石散

見發無定處血瘕

八珍湯

獨參湯

俱見

瀆

金瘡

金瘡須宜驗傷痕輕傷皮肉重傷筋外撒如聖桃花散血多入珍湯獨參

註

此證有金刃傷箭鏃傷磁鋒傷須看傷痕深

淺輕者皮肉破損血流不住以桃花散撒之
重者筋斷血飛係大脈已傷用如聖金刀散
撒上以絹帛紮住止而復流再撒若藥痂過
厚拘痛者以生肌玉紅膏塗傷處外貼陀僧
膏長筋止痛生肌治之無論輕重傷破出血

初服三黃寶蠟丸傷破微出血者服黎洞丸
若出血過多其人面黃眼黑不可專攻瘀血
宜用八珍湯甚者獨參湯先固根本二方俱
加蘇木紅花兼調瘀血此證雖係好肉暴傷
然驗衄法形證亦可以定生死如傷血過多
衄見虛細沉小和緩者生若衄見浮洪數大
實虛促者死被傷入肺者二七死左脇下傷
內者腸全斷者少腹下傷內者傷處繁多者
老人左股壓碎者傷破陰子者肩內耳後傷

透於內者死。凡傷天臆穴與眉角腦後臂裏
跳脈髀內陰股兩乳上下心下鳩尾及五臟
六腑之輸者皆死。腦後出髓而不能語目睛
直視喉中沸聲口急唾出兩手妄舉者亦死。
又有腹皮損破腸出者看腸若僅傷一半者
可治。先以大麥煮粥取濃汁溫洗其腸。以桑
皮尖茸爲線蘸花薑石散縫腸傷口。急於縫
處塗活鷄冠血。隨以清油塗腸令潤。將腸輕
輕納入腹內外用生人長髮密縫腹傷口之

裏肉留外皮撒月白珍珠散以待生肌歛口
若傷口大者不能外縫以陀僧膏護貼候自
潰膿卽按潰瘍門治法縫後勿驚笑以米飲
少少飲之漸增待二十日後再喫濃粥調理
而愈

三黃寶蠟丸

藤黃

四兩製法見
黎洞丸內

天竹黃

無真者九轉
南星代之

紅芽大戟

劉寄奴

血竭

各三兩

孩兒茶

雄黃 各三兩

朴消 一兩

當歸尾 一兩五錢

鉛粉

汞 卽水銀

乳香

麝香 各三錢

琥珀 二錢

各研極細末稱準和一處將水銀同鉛粉在
鐵鍋內火上熱研成末入前藥內共研勻用
煉淨黃蠟二十四兩放磁器內坐滾水中化
開將藥入內攪勻病重者每丸一錢病輕者
每丸五分熱黃酒調服倘受傷至重連服數

次服藥後飲酒出汗更妙又治一切惡瘡以香油化開敷之甚效

方歌

三黃寶蠟琥天竹大戟兒茶消寄奴雄竭藤
黃鉛粉汞乳歸麝碾去其粗蠟丸黃酒熱調
服外治惡瘡油化敷能療金瘡傷損證續筋
瘀散痛全無

黎洞丸

三七

生大黃

阿魏

孩兒茶

天竹黃

血竭

乳香

沒藥 各二兩

雄黃

一兩

山羊血

五錢無真者以小
子羊鮮心血代之

冰片

麝香

牛黃

各二錢五分
以上各研細末

藤黃

二兩
以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次去浮沉

取中將山羊
血拌入曬乾

取秋露水化藤黃拌藥搗千餘下如乾加煉

蜜少許爲九重一錢黃蠟封固每用一丸黃

酒化服外敷亦用黃酒磨塗此藥如在夏天
修和取天落水拌之爲丸

方歌黎洞金瘡跌撲傷發背癰疽諸惡瘡癰瘰癧刑

傷瘋犬齧蜂蛇蠍毒服敷良三七大黃米麝
魏兒茶天竹竭藤黃羊血牛雄黃乳沒秋露

和丸酒化強

桃花散

見發無定處血箭

如聖金刀散

見足部脫疽

生肌玉紅膏