

蘇沈良方

中

駒

卷之六

七

七

蘇沈內翰良方卷第三

論聖散子

昔予覽千金方三建散云於病無所不治而孫思邈特爲著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物効靈不拘常制至理開惑智不能知今予得聖散子殆此類也自古論病惟傷寒爲急表裏虛實日數證候應汗應下之類差之毫釐輒至不救而用聖散子者一切不問陰陽二感或男子女人相易狀至危篤速飲數劑而汗出氣通飲食漸進神宇完復更不

用諸藥連服取瘥其餘輕者心額微汗正爾無恙藥性小熱而陽毒發狂之類入口便覺清涼此藥殆不以常理而詰也若時疫流行不問老少良賤平旦輒煮一釜各飲一盞則時氣不入平居無事空腹一服則飲食快美百病不生眞濟世衛家之寶也其方不知所從出而故人巢君穀世寶之以治此疾百不失一予旣得之謫居黃州連歲大疫所全活者不可勝數巢甚祕此方指松江水爲誓盟不得傳人予竊隘之乃以傳蘄水龐君安時龐以醫聞於世又善著書故以授之且使巢君名

與此方同不朽也

聖散子啟

聖散子主疾功效非一去年春杭州民病得此藥全活者不可勝數所用皆中下品藥略計每千錢卽得千服所濟已及千人由此積之其利甚溥凡人欲施惠而力能自辦者猶有所止若合眾力則人有善利其行可久今募信士就楞嚴院脩製自立春後起施直至來年春夏之交有入名者逕以施送本院昔薄拘羅尊者以訶黎勒施一病比丘故獲報身身常無眾疾施無多寡隨

力助緣疾病必相扶持功德豈有限量仁者惻隱當崇
善因吳郡陸廣秀才施此方并藥得之於智藏主禪月
大師寶澤乃鄉僧也其陸廣見在京施方并藥在麥麴
巷住出此方陳無擇三因方云此藥似治寒疫因東坡
作序天下通行辛未年永嘉瘟疫被害者
不可勝數蓋寒疫流行其藥偶中抑未知方土有所偏
宜未可考也東坡便謂與三建散同類一切不問似太
不近人情夫寒疫亦自能發狂蓋陰能發躁陽能發厥
物極則反理之常然不可不知今錄以備療寒疫用者
宜審究其寒溫二
疫無使偏奏也

聖散子方

草豆蔻

去皮麴裹炮十箇
案館本作一箇

木豬苓皮去

石菖蒲

高良薑

獨活去蘆頭

附子

炮製去皮臍去

麻黃去根

厚朴

去皮薑汁炙

藁本

去瓢土炒

芍藥

枳殼

去瓢麩炒

柴胡

澤瀉

白朮

細辛

防風

去蘆頭

藿香

半夏

薑汁製

茯苓

各半兩

甘草

炙一兩

右剉碎如麻豆大每服五錢匕清水一鍾半煮取八

分去滓熱服餘滓兩服合爲一服重煎空心服

解傷寒小柴胡湯

柴胡二兩

黃芩

人參

甘草炙

生薑

各三錢案程本云各三分似誤

半夏

湯洗一兩半

大棗

十二枚破

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓再煎取

九合溫服三合日三服

案館本云取九溫服日三服似誤

此古法也

今可作粗散每服三錢棗三枚薑五片

館刻三片水一盞

半煎至八分溫服氣實疾勢盛者加至四五錢不妨

竝去滓此張仲景方予以今秤量改其分劑孫兆更

名黃龍湯近歲此藥大行患傷寒不問陰陽表裏皆

令服之此甚誤也此藥傷寒論雖主數十證大要其

間有五證最的服之必愈一者身熱心中逆或嘔吐

者可服

傷寒此證最多正當服小柴胡湯

若因渴飲水而嘔者不可

服身體不溫熱者不可服

仍當識此

二者寒者

案館本無寒者二字

寒熱往來者可服三者發潮熱可服四者心煩脇下

滿或渴或不渴皆可服五者傷寒已瘥後更發熱者

可服此五證但有一證更勿疑便可服服之必瘥若

有三兩證以上更的當也其餘證候須子細詳方論

案館本無方字

及脈候相當方可用不可一概輕用世人但

知小柴胡治傷寒不問何證便服之不徒無效兼有所害緣此藥差寒故也唯此五證的不蹉跌決效無疑此傷寒中最要藥也家家有本但恐用之不審詳故備論于此使人了然易曉本方更有加減法雖不在此五證內用之亦屢效今亦載于此若胸中煩而不嘔去半夏加人參合前成一兩栝蒌根一兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三分此一證最有驗常時腹痛亦療若脇下痞鞭去大棗加牡蠣一兩若心下悸小便不利去黃芩加茯苓一兩若不渴外有微熱者

去人參加桂三分溫覆微汗愈若效去人參大棗生薑加五味子半兩乾薑半兩元祐二年時行無少長皆效服此皆愈（案館本止此無下六十二字）常時上壅痰實只依本方食後臥時服甚妙赤白痢尤效痢藥中無如此妙蓋痢多因伏暑此藥極解暑毒凡傷暑之人審是暑喝不問是何候狀連進數服即解

治傷寒解表止頭痛麻黃丸兼治破傷風及一切諸風

麻黃六兩去節沸湯炮去黃水焙乾烏頭水浸三日頻換水去皮日乾炮去臍

天南星別擣半夏湯洗七遍

石膏

泥裏火燒通赤研已上各四兩

白芷

三兩

甘草

一兩炙

龍腦

半兩只用樟木龍腦但要發散不必南番龍腦

麝香

一分

右爲末水煮天南星爲丸如小彈子大每服一丸蔥

茶或

館本有茶字

酒嚼下薄荷茶

館本無茶字

亦得連二三服

此本予家白龍丸已編入靈苑後又加麻黃作六兩

寒水石

館本有用字

石膏末爲衣治傷寒至佳小小傷風

服之立瘥解表藥中此尤神速

治暑暈逡巡悶絕不救者

道上熱土

大蒜

右略等多少爛研冷水和去滓飲之卽瘥此方在徐州沛縣城門上板書揭之不知何人所施也治暑傷肌膚多瘡爛或因搔成瘡者

林才中嘗暑中臥病肌膚多瘡爛汁出有一乳姥曰此易愈取乾壁土揉細末傅之隨手卽瘥

治瘡木香丸

雞心檳榔

陳橘皮

去白各二兩

青木香

人參

厚朴

官桂

去無味者

大附子

羌活

荆三稜

獨活

乾薑炮

甘草炙

芎藭

川大黃剉微炒

芍藥各半兩

牽牛子

一斤淘去浮者揩拭乾熟
搗取末四兩餘滓不用

肉豆蔻六枚去殼
止瀉方用

右十五味爲末磁器盛之密封臨服用牽牛末二兩

藥末一兩同研令勻煉蜜爲丸如桐子大心腹脹滿

一切風勞冷氣臍下刺痛口吐清水白沫醋心痧癖

氣塊男子腎臟風毒攻刺四體及陽毒腳氣目昏頭

痛心聞嘔逆及兩脇堅滿不消臥時橘皮湯下三十

丸以利爲度此後每夜二十九女人血痢下血刺痛
積年血塊胃口逆手足心煩熱不思飲食薑湯下三
十丸取利每夜更服二十丸小兒五歲已上疝氣腹
脹氣喘空心溫湯下五七丸小者減丸數服凡胸腹
飽悶不消脾泄不止臨臥溫酒下取利食毒癰疽發
背山嵐瘴氣纔覺頭痛背膊拘緊便宜服之快利爲
度常服可以不染瘴疾凡瘴疾皆因脾胃實熱所致
常以涼藥解膈上壅熱并以此藥通利彌善此丸本
治嵐瘴及溫

館本

瘧大效李校理敦裕嘗爲傳刻石

于大庾嶺蒙效者不可勝數予伯氏任閩中嘗擁兵
捕山寇過漳浦軍人皆感瘡用此治之應時患愈予
在江南時值歲發瘡以此藥濟人其效如神皆以得
快利爲度又記凡久瘡服藥訖乃灸氣海百壯又灸
中脘三十壯尤善

治傷寒痞氣胸滿欲死枳殼湯

桔梗

枳殼炙去瓢
各一兩

右剉如米豆大用水一升半煎減半去滓分二服傷
寒下早則氣上膨胸世俗卽謂之結胸多更用巴豆

粉霜膩粉下之下之十有八七死此蓋瀉其下焦下

焦虛則氣愈上攻胸膈多致不救凡胸脹病只可瀉

膈若按之堅硬而痛此是結胸如胸有水須用大黃

甘遂輩下之陷胸丸之類是也若按之不甚硬亦不

館本有痛此名痞氣上館本虛氣熱鼓脹只可用黃

芩黃連大黃之類化之嘗有人患胸脹已危困作結

胸痞氣治皆不瘥文館本大夫以此湯飲之下黃水

一升許遂瘥予得此法用之如神若是痞氣莫不應

手而消凡傷寒胸脹勿問結胸痞氣但先投此藥若