

陳修園

公

餘

四

種

R2-51

50

時方妙用目錄

卷一

望色

聞聲

問症

切脉

中風

虛勞

卷二

腫症

單腹脹

臟脹

噎隔

反胃

痰飲

咳嗽

喘促

哮喘症

心腹諸痛

痛風

痺

腰痛

卷三

血症

癲狂癇

消渴

傷食

瘡疾

痢疾

時疫

暑症

濕病

頭痛

癰瘰

眩暈

眼目

耳聾

疝氣

痿

泄瀉

卷四

鶴膝風

脚氣

積聚

嘔吐噦

五淋癰閉

遺精

赤白濁

汗症自汗盜汗

怔忡驚悸健忘治同

婦人科

傷寒科

時方妙用卷三

閩吳航陳念祖修園甫著

男元元豹道彪古愚全校字

血症吐血 衄血 咳血 咯血 鼻衄 齒衄 大便血 小便血 血淋 血崩

經曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血血之
流溢半隨衝任而行於經絡半散於脉外而
充肌膚腠皮毛若外有所感內有所傷則血不
循經從上而湧則為吐血咳血咯血鼻衄齒

血。舌。衄。從。下。而。走。則。為。大。便。血。溺。血。婦。人。血。
崩。其。源。則。一。或。問。諸。書。皆。分。別。五。臟。六。腑。之。
血。而。施。治。茲。何。以。籠。統。言。之。余。曰。五。臟。有。血。
六。腑。無。血。觀。剖。諸。獸。腹。心。下。夾。脊。包。絡。中。多。
血。肝。內。多。血。心。脾。肺。腎。中。各。有。血。六。腑。無。血。
近。時。以。吐。血。多。者。謂。吐。胃。血。皆。耳。食。前。醫。之。
誤。凡。吐。五。臟。血。必。死。若。吐。衄。崩。下。皆。是。經。絡。
散。行。之。血。也。或。問。既。無。分。別。何。金。匱。以。瀉。

湯治心氣不足為吐血乎。曰百病不離於五臟六腑臟腑病以致血不循經而為吐血衄崩下。非吐血衄崩下之血從臟腑中脫出也。循經之經字作常字。解時醫誤解謂歸脾湯引血歸脾脾能統血即是歸經害人無算。余再為之喝醒一語曰隨者仍其隨之常行者仍其行之常散者仍其散之常充者仍其充之常。血循經常之道路則無吐血衄崩下之病矣。千

古無一人談及余於高士宗引而不發處細
繹斯論大為快事。

身熱脈大者難治。○身涼脈靜者易治。○
若喘咳急而上氣逆。脈見弦緊細數有熱。
不得卧者死。

一外感吐血先見頭痛惡寒發熱等症必取
微汗則愈宜

香薷飲加荊芥穗一錢。丹皮白芍各一錢。

五分三十

一夏令秋令感暑氣燥氣而吐血方治見咳
嗽門不贅

一內經云不遠熱則熱至。血溢血泄之病生
矣。凡人不避暑熱及過食煖炙之物以致
血熱妄行宜

四生丸百一

一瘀血而吐必先胸痛血色必紫或黑而成

塊脈必滯。宜

四物湯。加醋炒大黃。桃仁。丹皮。香附。各一

錢五分。○如紫血盡。鮮血見。即用六君子

湯。加當歸調之。九出高鼓峯心法

一傷寒及溫病。應發汗而不汗之內熱蓄血

及鼻衄吐血不盡。內餘瘀血。大便黑面黃

宜

犀角地黃湯。九十

九

一高鼓峯心法。於血症獨精。其云。除瘀血與
傷寒外。其餘俱屬七情饑飽勞力等因。必
見惡心。驗症分明一味固元湯主之。方用人參
炙芪歸身甘草煨薑大棗白芍水煎服血
症最繁。以一方統治。胡念齋深服之。○胡
念齋云。補藥可用溫藥。亦須急加附桂炮
薑隨宜。

一楊齋直指謂陽虛陰必走。大吐大衄。外有

寒冷之狀可用理中湯加南木香或甘草
乾薑湯其效更著又有飲食傷胃胃虛不
能傳化其氣上逆亦能吐衄亦宜上二方
○余用甘草乾薑湯其乾薑炮黑加五味
子二錢甚效從慎柔五書得來
一內經云血氣者喜溫而惡寒寒則泣而不流
溫則消而去之此數語為治血之要旨所
以楊仁齋高鼓峯方法神驗即張景岳用

熟地一兩。澤瀉附子牛膝各一錢五分。肉桂一錢。炙甘草二錢。水煎服。名為鎮陰煎。方雖駁雜。而溫藥較多。亦能奏效。褚氏遺書云。血雖陰類。運之者其陽和乎。陽和二字。指心肺而言也。心肺之陽宣布。如日月一出。燭火無光。凡諸般邪熱之氣。俱除。血無所擾。則循行常道矣。運之者三字。更妙。血不自運。必藉氣以運之。既已運。

矣。則隨衝任而行於經絡散於脈外充於
皮毛有經常之道可行何至妄行而為失
血之症耶。諸家俱贅此二句之妙絕未能
發明其旨甚矣。醫道之難也。高鼓峯雖未
能悟到此旨而固元湯與之暗合。慎柔和
尚以保元陽為主。亦不過取黃芪補氣以
生血而亦與此旨暗合。合之則效速。二公
所以名噪一時也。余於此千慮一得不敢

自秘。

保元湯

七

煨薑

三片

黑素

二枚

慎柔方無肉桂有

煨薑

三片

黑素

二枚

煨薑

三片

黑素

當歸補血湯六

一血症有不宜剛燥之劑者。或血虛煩渴燥

熱。睡寤不寧。五心煩熱。宜

聖愈湯六

一舌上出血如孔。鑽者。煎香薷汁服。外用槐

花炒研。摻蒲黃炭亦可。摻之。○齒斷血出。

用生竹茹四兩醋浸一宿含之。○牙縫出血。以紙維蘸乾蟾酥少許於出血處按之立止。○滿口齒血出。枸杞子為末煎湯漱之。然後吞下根亦可。○鼻衄用生茅花或根一兩煎服。已上症或統用

甘露飲

八十

滋腎丸

九十

一血淋尿血。用苧麻根十枚。水煎服。又用海
螵蛸。乾地黄。赤茯苓。各等分。為末。每服三
錢。以栢葉車前子煎湯下。又用亂髮燒灰。
入麝香少許。用米醋溫湯調下。如痛不可
忍。以藕汁。蘿蔔汁。白蜜調下。○又房勞傷。
小便尿血。宜鹿角膠半兩。沒藥。另研油頭。
髮繩各三錢。為末。茅根汁打麵糊丸。桐子
大。每服五十丸。鹽湯下。