

勾。發熱一日。

熱水洗熨之。如痒不上時。
先熱入葫蘆汁內乘熱氣以絹
如痒不止再用滑石水飛過蜜
散尤妙。




月上就有小疖。至五日內。兩
任臍四外。有疖者可治。若臍
如面上。身上稀少。雖臍內有
針挑撥之。点二妙丹。其臍內疔
為可治之痘。或發熱二日半。或
且部身上。衆痘若有紫黑色。平陷瘢
則好痘在痘疔羣內。隐隐發出。狀如
後即出。切不可一槩視之。身上面部俱
係之重耳。此痘症定然腹響。響者。腸鳴

小兒脾
氣虛作脾
氣虛作脾
之圖

也。書云。腹響腸鳴。應作瀉。即服木香散。去丁香。官桂倍加。訶子肉蔻。以防其瀉也。如氣虛。特再加黃芪。倍加人參。如渴甚。加麥冬。五味子。有嗽有痰者。加貝母。天花粉。桔梗之類。

血絲癆圖



此痘名為血絲癰。蓋疔中之最輕者。小兒發熱二三日。
此癰先出中陷灰紅。圍轉有紅絲相牽。把住衆痘當出。
不出當長不長。急用銀針挑之。点二妙丹。好痘即出。此
癰亦變為好痘矣。後得易收易癥而無害。使不挑撥。延
至四五日。衆痘不出。或腹脹而死。或煩躁不食飢餓而
死。又或至七八日。衆痘不見貫膿。彼痘腐爛痛甚而死。
者有之。挑撥須在五六日之前。再用四物湯並保元湯。
尤妙。煎時少入酒。使其血氣易成膿。人參黃芪托裏助
漿。三劑全愈。用水煎時。入黃酒少許。尤妙。使藥行胞內。

成膿速而易收匱。後無滯毒之患矣。

人參黃芪托裏升漿飲

人參 黃芪 各五分

當歸


熟地

甘草 各三分

糯米半分

水一盞薑一片煎五分服

乳便癬圖




此痘發熱三日。周身上面俱有綻點。獨小便頭上或兩胞上有兩個黑眼陷下些。且小便頭上浮腫。有痘疔宜急挑之。此乃致命之地。雖面稀少。身上明淨。惟小便上有一二枚。亦能致害。如不早挑。至九日十一日。小便先爛。餘皆潰腐無跡。縱然有生。亦無人道矣。凡看痘者。小便有否。後方用藥調治之。視之宜早。不可怠肆。如好痘不起長。用木香散服之。冬月寒冷時。出此痘者。方可。用木香散。夏月暑盛時。此方內去官桂附子丁香之類。寒則不可過用熱藥。熱則不可過用寒藥。溫補平和方。

為妙手。如兩乳上下亦有此疔。照前挑撥點藥即愈矣。
木香散

冬月加官桂附子丁香各一分
木香半分陳皮二分
人參各二分
半夏 前胡 腹皮 詞子 肉蔻各一分
茯苓二分五分
甘草一分 水一盞煎五分服

怪痘圖




此痘名為怪痘。小兒未熟。此痘見點。衆痘無形。此痘先出。衆痘未長。此痘先膿。其色黃而滿。其皮薄而易破。三日間急將銀針輕輕刺破去其膿漿方好。此痘只發於面上。兩額上。兩眉上。或人中上。脇上。兩尻上。兩股上。若不挑破去毒。待他熟破。毒水漫流。衆痘一派皆成薄皮。至七日八九日發痒。皮破為害不淺。為父母者不識此斑為害。皆謂痘癰貪膿。欣喜悞者常多。宜服保元湯。加當歸木香。此痘若面部稀少。身上灰白黑陷斑。手上稀少。面上尚有數顆光明者可醫。即兩腿雖多。

害於事。急用銀針挑撥。斑疔點、二妙丹。衆痘不尋
貫膿。宜服八珍散。內加木香。如渴熱去木香。如瀉不止
加訶子。或色白者只用四物湯。色赤用四君子湯。寒火
時用木香散可望生全。

八珍散

黃芪一錢人參 白芍藥各五分 當歸五分 白朮
川芎 熟地各三分 水一鍾煎半三次服

紫蛇皮癬圖



此痘發熱一日半先發點在四肢上下或兩腮。色衆痘當出不出當衣不長待熱甚一齊擁出其痘相
連前後心俱成一片狀如蛇皮其色灰黑不明面都隱
於皮膚而不顯及至四五日間若欲挑撥皮薄即破不
能含針雖挑無益勢必七日痒八日搔九日黑陷乾枯
不旋踵而告變矣若面部稀少有數顆明淨光澤者只
是肉眼有六七塊急挑點二妙丹再服八珍散與酒飲
之如破出血水者可服敗草散十中可救一二