

氣

血

風

寒

暑

濕

濟陽氏

醫方集解

卷中

醫方集解卷中

休寧訥菴注

易著輯

文丁

者

補中益氣湯

理氣之劑 經曰諸氣膾鬱皆由于肺 又曰怒則氣上喜則氣緩悲則思則氣消恐則氣下乍則氣收極則氣逆驚則氣亂勞則氣耗耳源出中焦總流于肺外護于表內行于裏周流一身頃刻無間出入升降晝夜有常冒常病于人或及至七情交攻五志並陵乘戾失常清者化而為濁行者阻而不通表失能衛而不和裏失營運而拂順氣外屬陽及勝則為火矣所司所謂五志過極皆為火丹溪所謂氣有餘便是火也入身有宗氣營氣術氣中氣元氣胃氣冲和之氣上升之氣而宗氣尤為主及其為病則為冷氣滞氣上氣逆氣虛寒變症矣每病之时宜保之參之和之順之病作之時當審其何症亦極虛寒而補之

補中益氣湯

治煩勞內傷身熱心煩頭痛惡寒懶言惡食脉洪大而

虛或喘或陽虛自汗

宜本湯加麻黃根浮小麥升柴俱宜蜜水炒

遇欲其引參者至表故又不可缺

或氣

虛不能攝血或癰痢脾虛久不能愈一切清陽下陷中氣不足之症

中

脾胃也藏府肢體皆稟氣于脾胃飢飽勞役傷其脾胃則衆體無以稟氣而皆病矣陽氣下陷則陰火上乘故熱而煩非實熱也頭者諸陽之會清陽不升則濁氣上逆故頭痛其痛或作或止非如外感頭痛不休也陽虛不能衛外故惡寒自汗氣虛故懶言脾虛故惡食脾胃虛則火上于肺故喘金受火剋不能生水故渴肺虛不能統血則血妄行而吐下清陽下陷則爲渴痢氣血兩虛則瘧不止名曰瘧瘧老也○李東垣內傷外感辨傷于飲食勞役七情六慾爲內瘧傷于風寒暑濕爲外感內傷發熱時熱時上外感發熱甚不休內傷惡寒得暖便解外感惡寒雖厚衣烈火不除內傷惡風不畏甚風反畏隙風外感惡風見風便惡內傷頭痛乍痛乍止外感頭痛連痛不休直待表邪傳裏方罷內傷有濕或不作渴或心火來肺亦作渴渴外感須二三日外表熱傳裏口方作渴內傷則熱傷氣四肢沉困無力怠倦嗜臥外感則風傷筋骨傷骨一身筋骨疼痛內傷則短氣不足以息外感則喘壅氣盛有餘內傷則手心熱外感則手背熱天氣逼于肺鼻者肺之外候外感傷寒則鼻塞傷風則流涕然能飲食口知味腹中和二便如常通氣逼于肺口者迎脈上表外感則人迎大子氣口右氣口脉主裏內傷則氣口人子人迎內傷證屬不足宜溫宜補宜和外感證屬有餘宜汗宜泄宜下若內傷之症悞作外感妄發其表重虛元氣禍如反掌故立補中益氣湯主之又有內傷外感兼症者若內傷重者宜補養爲先外感重者宜發散

爲惡此湯惟上焦瘀血中焦
濕熱傷食膈滿者不宜服

黃耆

蜜炙

半人參

甘草

炙多一錢

白朮

土炒

陳皮

留

當歸

五升麻

柴胡

三分

薑

三片

棗一枚

煎如血

不足加當歸

精神短少

加入參五味

肺熱咳嗽

去人參

加葛根

風藥多燥

葛根獨能止渴者以其

頭痛

加蔓荆子痛甚加川芎

腦痛加藁本

細辛風濕相搏

一身盡痛加羌活

防風有痰加半夏生薑胃寒氣滯加青皮蔻仁木香

益智腹脹加枳實

厚朴木香砂仁腹痛加白芍

甘草熱痛加黃連能食而心下痞加黃連

咽痛加桔梗有寒加肉桂

濕勝加蒼术陰火加黃柏知味陰虛去升柴

加熟地山茱萸大便秘加酒煨大黃咳嗽春加旋復

秋加吳茱萸冬加不

去根節麻黃天寒加乾薑泄瀉去當歸加

茯苓蒼术益智

此足太陰陽明藥也肺者氣之本黃耆補肺固表爲君脾者肺之本

生金肺胃一

東垣曰參耆甘草湯

虛肺氣先絕入參甘草補肺益氣和中

火之聖藥益煩勞則虛而生熱得甘溫以補元氣

補陽

而虛缺首退故亦謂之渴

白朮燥濕強脾當歸和血養陰爲佐

必兼和虛不然則虛已亢

升麻以升陽明清氣在升而復其本位

柴胡以升少陽清氣上行

陳皮同補藥則

陽升則萬物生清升則陰濁降加陳皮者以通利其氣

補獨用則渴解

生薑辛溫大棗甘溫用以和營衛開腠理致津液諸虛不足先建其中

中者何肺胃是也

李東垣曰肺胃虛者因飲食勞倦心火亢甚而乘其上位其次肺氣受邪須多用黃耆而入參甘草次之

脾胃一虛肺氣先絕故用黃耆

以益支毛而潤葵理不令自汗上喘氣

短故以人參補之心火乘脾用炙草甘溫以滋火熱而補脾元若肺胃

急痛往往虛腹中急縮宜多用之中滿者減之白朮甘溫除胃中之

熱利腰臍間血胃中清氣在下心加升麻柴胡以升之引參耆甘草目

溫之氣味上升以補胃氣之散而實其表又緩帶脉之縮急氣亂于中

清濁相干用去白朮皮以理之又助陽氣上升以散滯氣脾胃氣虛爲

陰火傷其生發之氣營血大虧血減則心無所養致令心滿而煩病名

口喚故加甘草微溫之劑生陽氣而景之法血虛以人參補之陽虛則

能生陰血更以當歸和之少加黃柏以救腎水瀉陰中伏火加煩猶不止少加生地黃補腎水水旺則心火日降李士材曰虛人感冒不任發散者此方可以代之東垣曰肌熱者表熱也服此湯一二服得微汗則已非正發汗乃陰陽氣和自然汗出也準繩曰凡四時傷寒通宜補散故丹溪治傷寒多用補中益氣湯氣虛者四君子加發散葉血虛者四物湯加發散葉東垣治風濕用補中益氣加羌活防風升麻葛根海藏治風濕無汗者用神木湯有汗者用白朮湯治剛屢神木湯加羌活蘇黃治承溼白朮湯加耆朮桂心治中陽脉弦細芤遲者用黃耆湯此皆仲景所謂辛苦之人觸冒之病傷寒是也明醫雜著云發熱有數種治各不同仲景論傷寒傷風此外感也故宜發表以解散之此麻黃桂枝之義也感于寒冷之月即時發病故用辛熱以勝寒如春溫之月則當寢以辛涼之藥夏暑之月則當寢以甘苦寒之劑又有冬溫此天時不正陽氣反泄用藥不可溫熱又有寒疫却在溫熱之時此陰氣反逆用藥不可寒涼又有瘟疫沿門閨境相似者此天地之屬氣常隨時令參氣運而治宜辛涼甘苦寒之藥以清熱解毒若夫飲食勞倦爲內傷元氣則真陽下陷內生虛熱故東垣發補中益氣之論用甘溫之藥大補其氣而提其下陷此用氣藥以補氣之不足也又有勞心好色內傷真陰陰血既傷則陽氣偏勝而衰爲火是謂陰虛火旺勞瘵之症故丹溪發陽有餘陰不足之論用四物加黃柏知母補其降而火自降此用血藥以補血之不足者也又有夏月傷暑之病雖屬外感却類內傷東垣所謂清暑益氣是也又有因暑熱而過食冷物以傷其內或過取風涼以傷其外北則非暑傷人乃因暑而致之病治宜辛熱解表辛溫

理中之藥也與傷寒治法相類者也外感之與內傷寒病之與熱病氣
虛之與血虛如水炭相反治之若差則輕病必重重病必死矣醫員曰
讀傷寒書而不讀東垣書則內傷不明而殺人多矣讀東垣書而不讀
丹溪書則陰虛不明而殺人多矣東垣脾胃論深明飢飽勞役發熱等
症俱是內傷悉類傷寒切戒汗下以爲內傷多而外感少只須溫補不
必發散如外感多內傷少溫補中少加發散以補中益氣爲主如內傷
兼寒者加麻黃兼風者加桂枝兼暑者加黃連兼濕者加羌活實萬世
無疆之利此東垣特淡陽而發熱之一門也然陰虛發熱者上之六七
八九俱陽寒今人一見發熱則曰傷寒須用發散發散而斃則曰傷寒之
法已窮余嘗于陰虛發熱者見其大熱而亦口渴煩躁與六味地黃丸
一人劑卽愈如下部惡寒足冷上部渴甚躁極或飲而反吐卽加內桂
五味子則加附子令飲以此活人多矣此丹溪發明陰虛發熱之外尚
遺未盡也

本方除當歸白朮加木香蒼术名調中益氣湯東垣治脾胃不調
胸滿肢倦食少短氣口不知味心和則舌知味及食人反出本方加白芍五味

子亦名調中健氣湯

東垣

治氣虛多汗餘治同前

東垣

治脾虛

東垣

治脾虛

東垣

治脾虛

東垣

治脾虛

東垣

治脾虛

加白芍五味之酸以收耗散之氣有發有收此東垣別開一路以資補中之妙者乎

本方加蒼术倍分半夏黃芩各三分名參采益胃湯

東垣

治因傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃

各三分名參采益胃湯

東垣

治因傷勞倦燥熱短氣口渴無味大便溏黃

東垣

治脾虛

本方去白术加草蔻神麌半夏黃柏名升陽順氣湯

東垣

治飲食發卷所

傷滿悶短氣不思食不知味時惡寒

東垣曰升柴辛甘升其清清升降則陰氣順矣參耆甘草當歸補其虛虛補則正氣順矣半夏陳皮利其膈膈利則痰氣順矣豆蔻神麌消其食食消則穀氣順矣東垣曰升

麻柴胡味薄性陽引脾胃清氣行于陽道以滋腎氣之和又引參耆甘草土行元實腠理使衛外爲固凡補脾胃之藥多以升陽補氣名之者此也又曰但言補之以辛甘溫熱之劑及味之薄者諸風藥是也此助

春夏之升浮者也此便是鴻秋收冬藏之藥也在人之身乃肝心也但言滯之以酸苦寒涼之劑併淡味滲泄之藥此助秋冬之沉降者也在人之身是肺腎也本方加炒艾神麌名益胃

升陽湯

東垣曰治婦人經水不調或脫血後食少水瀉

東垣曰晚血益氣古聖之法也故先補胃氣以助生發之氣

本方加黃柏生地名補中益氣加黃柏生地湯治陰少乘陽

發熱晝甚自汗短氣口渴無味本方加白芍細辛川芎蔓荆名順氣和

中湯

宿

鑑治清陽不升頭痛惡風脈弦微細本方加羌活防風細辛川芎

名調榮養衛湯

節

庵治勞力傷寒身痛身熱惡寒微渴汙出身痛脉以無

力

順氣祛

烏藥順氣散

嚴用

治中風遍身頑麻骨節疼痛步履艱難語言蹇澁口

眼咷邪喉中氣急有痰

風麻則氣壅壅于皮膚則頑麻壅于骨節則煩

病壅于經絡則語注行難壅于口面則咷邪壅

于胸喉

則痰喘

烏藥

橘紅二錢

麻黃去節川芎

枳殼炒一錢

薑茶去絲炮

桔梗

薑

甘草炙五分

加薑葱煎虛汗者去麻黃加薑者手足不能舉動加

防風續斷威靈仙狗繩加木瓜邢氣加午膝五加皮獨活

此手太陰定厥陰藥也風盛則火熾故有痰火衝逆而上此裏氣逆也然中風必由外感風寒而發內虛而外邪乘之此表氣逆也麻黃桔梗

肺家之藥發汗而祛寒川芎白芷頭面之藥散風而活血

活則血風散

松桔

利氣行痰

順氣正以行痰

病風則僵得清化之氣故

瘧黑晝溫經通陽甘草和中瀉火烏藥能通行亦滯諸氣此乃先解表氣而兼順裏氣者氣順則風散風邪卒中當先治標若氣虛病久者非

所宜也

厥逆痰壅口噤脉伏身溫爲中風身入爲中氣中風多痰濕中氣無痰以爲辨中氣因怒而得者尤多局方用此治之許

學士云暴恐傷陰暴喜傷陽憂愁不已氣多厥逆往往得中氣之症不可作中風治喻嘉言曰中風症多挾中氣慢角曰人之元氣強壯外邪焉能爲害必血氣先虛榮衛空疎邪乃乘虛而入若內因七情得者法當調氣不當治風外因六淫得者亦先當治氣後以所感六氣治之此良法也宜入味順氣故方用人參白朮茯苓甘草陳皮青皮白芷烏藥併不用前方枳梗麻黃蘆薈風寒正先治氣後治風之妙旨後人或謂不審雜入白芷不知曰芷杳而不燥止利榮衛之善藥也局方合兩方用人參白朮陳皮甘草乾薑川芎厚朴桔梗麻黃白芷更加葛根治感風頭痛鼻塞聲重尚爲合宜王機微義曰嚴氏此論迥出前人其用藥則未也何也四君子補脾胃藥更加白芷去手陽明經風烏藥通腎胃間氣陳皮理肺氣青皮泄肝氣若風果在于手陽明肺肝胃脅而氣實者可用但經有十二五藏之氣互有勝負此方安能盡其支乎況真氣先虛之人亦難用也

穎子降氣湯局

治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛喘嗽嘔血

或大便不利

肺爲氣主肺屬火盛故氣高炎湧或喘或嗽甚則嘔血也火炎津枯有升無降故大便不利又有氣痛便秘用通劑而愈不通或暫通復秘因而下血者亦當順氣氣順則自通當求溫煖之劑

蘿子 半夏 前胡 厚朴

薑炒橘紅

當歸

甘草

肉桂

五分

加薑

沉香能升降諸氣溫而不燥

煎一方無桂有沉香

此手太陰藥也蘿子前胡厚朴橘紅半夏皆能降逆主之氣兼能除痰氣行則痰行也數藥亦能發表既以疎內壅兼以散外寒也

風痰壅盛多挾外感

當歸潤以和血甘草甘以緩中下虛上盛故又用官桂引火歸元也

王微義曰此散鬱和中之劑半夏曰口鼻出血皆由上盛下虛有升無降橘紅氣升法當先順其氣氣降則血歸經矣宜蘿子降氣湯加入參芍膠各一錢下養正丹昂按方內多被氣發表之藥又有半夏肉桂血症亦當審用養正丹金石忌燥而成充覽非宜

木香順氣湯

東垣

治陰陽壅滯氣不宣通胸膈痞悶腹脹滿大便不通

胸膈痞悶者脾胃受傷中氣不運不能升降濁氣在上也腹脹滿者肝火盛也大便秘者清陽不升也

木香

東垣

大便不通

調中氣

木香

草蔻仁

炒

薑

分厚朴

四分

青皮

陳皮

半夏

吳茱

萸

泡乾薑

茯苓

澤瀉

二升麻

柴胡

當歸

分當歸

此足太陰陽明藥也木香厚朴青皮陳皮辛能行氣兼能平肝草蔻益智香能舒脾兼半夏燥能勝濕乾薑吳茱溫能散寒升柴之輕以升其陽冬瀉之淡以泄其陰益脾爲中樞使中樞運轉則清升濁降上下宣通而陰陽得位矣然胃氣乘其過燥故重用當歸以濡其益共成益脾消脹之功也

逆七情氣

四磨湯

嚴

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食

怒則氣上思則氣結憂愁不已氣多厥逆重則眩仆

急清悶妨食

軒則上氣喘

檳榔

沉香

烏藥

人參

等分濃磨煎

三回沸溫服

一方人參

枳殼一方去人參加枳實

木香白酒磨服名五磨飲子

治暴怒卒死名

枳殼

一方去人參

枳殼

木香

白酒磨服

名五磨飲子

治暴怒卒死名

曰氣厥

此手太陰藥也氣上宜降之故用檳榔沉香檳榔桂如錢石沉香入氣水獨沉哉皆能下氣適宜順之故用烏藥加入參耆降中有升瀉中摺補恐傷其氣也大實者仍宜枳殼

走
附
葛根丸

統治六鬱胸膈痞悶吞酸嘔逆飲食不消

六鬱氣鬱血鬱瘀火鬱溫鬱食鬱

也六者之中以氣爲志氣行則鬱散矣吞發嘔吐日于接火飲食不消由氣不運行丹溪曰氣升則食日降火鬱不言風寒者風寒鬱則爲熱也滑伯仁曰鬱者結聚而不得發越當升者不得升當降者不得降當變化者不得變化所以傳化失常而病見久氣鬱者胸膈痛溫鬱者周身痛或關節痛遇陰寒卽發疼鬱者動則氣喘小口沉滑熱鬱者皆脅便亦脉沉數血鬱者四肢無力能食食鬱者腹悶酸腹飽不能食寸口堅益○齊曰木鬱達之火鬱折之

上移奪之金移泄之水移折之

香附
附炒蒼朮

治浸淫

炒

厚朴

神曲

炒

厚子

黑

等分

糊爲丸如棗核

茯苓白芷火鬱加青黛麥芽加南星半夏桔梗酒不血鬱加桃仁紅花

氣鬱加木香檳榔食鬱加麥芽山楂砂仁挾寒加吳茱萸又或春加防風夏加苦參冬加吳茱萸經所謂升降浮沈則順之寒熱溫涼則逆之也

此手足太陰手少陽藥也吳鶴臯曰越鞠者發越鞠鬱之謂也香附開氣鬱蒼朮燥濕鬱撫芎調血鬱梔子解火鬱神曲消食鬱陳來章曰皆理氣也氣暢而鬱舒矣朱丹溪曰鬱爲燥淫燠乃陽明秋金之位肺屬金主氣主分布陰陽傷則失職不能升降故經曰諸氣膿鬱皆屬於肺久鬱病多在中焦中焦脾胃也水穀之海五臟六府之主四藏一有不平則中氣不得其和而先鬱矣此方藥兼升降者將欲升之必先降之將欲降之必先升之蒼朮辛烈雄壯固胃強脾能徑入諸經疏泄陽明之濕通行厥濬香附陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平撫芎足厥陰藥直達三焦上行頭目下行血海爲通陰陽而氣之使不但開中焦而已胃主行氣子三陽脾主行氣子三陰脾胃既布水穀之氣得行則陰陽藏府不受燥金之鬱皆由胃氣而得通利矣○或問冉溪曰脈訣云熱則生氣冷則生氣吾子引仲景之言而斥其非然則諸氣諸飲嘔吐吞酸反胃諸病將無寒症耶曰五藏各有火五志激之其火隨起若諸寒爲病必須身犯寒氣口食寒物

非若諸火病自內作所
以氣病寒者十無一二

行氣消痰

七氣湯

三因方亦名四七湯

治七情氣鬱痰涎結聚咯不出嚥不下胸滿喘急或

咳或嘔或攻

痛

七氣者寒熱喜怒憂愁惡也七情之病令人氣結痰聚陰陽不得升降故有痞滿喘咳衝痛等症

半夏

薑汁炒五錢

薑汁炒五錢

茯苓

四錢紫蘿一錢

加薑棗煎

此手足太陰藥也氣鬱則痰聚故散鬱必以行氣化痰爲先半夏辛溫除痰開鬱厚朴苦溫降氣散滿紫蘿辛溫寬中暢肺定喘消痰茯苓甘淡滲濕益脾通心交腎痰去氣行則結散鬱解而諸症平矣

本方加白芍陳皮人參桂心亦名七氣湯三因治七情鬱結陰陽反戾吐利交作寒熱眩運痞滿噫塞

四七湯

局方亦名七氣湯

治七情氣鬱痰涎結聚虛冷上氣或心腹絞痛或膨

脹喘急

針經云胃絡不和喘出于陽明之上並真元耗散喘出于腎氣之上并

溫中解鬱

人參 官桂 半夏

錢甘草分

加薑煎心腹痛加延胡索

能行血中氣滯

血滯

此手太陰藥也李士材曰夫七情過極皆傷其氣丹溪以越鞠丸主之

而此獨異者蓋鬱久則濁氣閉塞而清氣日薄矣故雖痛雖脹而不用

木香枳殼用人參以壯生氣之藏

肺

官桂以制謀慮之官

肝者將軍之官謀慮出焉

鬱久肝火必盛桂能平肝鬱久生痰半夏爲之驅逐鬱故不和國老爲之調停草况

桂性辛溫疏氣甚捷鬱結者還爲和暢矣湯名四七者以四味治七情

玉機微義曰經云寒則氣收宜辛故之甘緩之此治氣虛寒鬱藥也

代顏旋覆湯

仲景

治傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除

汗吐下後

大邪雖解胃氣弱而不和虛氣上逆故痞鞕噫氣卽俗所謂嘔氣也

旋覆花

卽金沸草三兩

代顏石

一兩

人參

二兩

甘草

三兩

半夏

半升

生薑

五兩

大棗

十二枚

資生良子氣

卷之七氣湯 四七湯

代顏旋覆

此足陽明藥也成氏曰鞭則氣堅旋覆之鹹以喚痞鞭怯則氣浮代頶之重以鎮虛逆代頶色赤體重久能養陰血止反胃辛者散也生薑之辛以散虛痞者

緩也人參甘草大棗之甘以補胃弱細目云病解後痞鞭噫氣不下利者用此湯下利者生薑瀉心湯活人云有旋覆代頶症或咳逆氣虛者先服四逆湯胃寒者先服理中湯

後服此湯爲良周易俊曰至每借之以治反胃噎食氣逆不降者神妙

丁香柿蒂湯

嚴氏

治久病呃逆因于寒者

按方書無呃字或作欬逆或作嘔氣仲景書中或作嘔說又曰

嘔氣者也海藏東垣皆以嘔爲乾嘔人多非之今從俗作呃逆此病有因痰阻氣滯者有因血瘀者有因火鬱者有因胃寒失下者此皆屬實有因中氣大虛者有因大下胃虛陰火上衝者此皆屬虛寒然虛實治法不一古方以此湯治寒呃雖病本于寒然亦有火也○呃在中焦穀氣不逆其聲短小得食卽發呃在下魚真氣不足其聲長大不食亦然

丁香 柿蒂 人參 錢 生薑

五錢 生薑一片

一方加陳皮半夏茯苓甘草良薑

此足陽明少陰藥也丁香泄肺溫胃而煖腎生薑去痰開鬱而散寒柿蒂苦澀而降氣人參所以輔真氣使得展布也火呃亦可用者蓋從治