

隨息居重訂霍亂論總目

病情第一

總義

熱證

寒證

治法第二

伐毛

取嚏

刮法

焯法

刺法

搨洗

治熱證

熨灸

治寒證

偵探

策應

紀律

守險

醫案第三

南鍼

夢影

藥方第四

藥性

方劑

隨息居重訂霍亂論第三醫案篇

海昌王士雄夢隱纂

甬上

呂慶熊

全校

南鍼

張戴人曰泰和閒余見廣濟院僧病霍亂一方士用附子

乾薑同煎放冷服之服訖嘔血而死

如此而死必是暑證
洄溪云暑證忌薑雖

與芩連同用亦有大害况
與附子同行禍更烈矣

頃合流鎮李彥直中夜忽作吐

瀉自取理中丸服之

洄溪云此是寒霍亂之方百
不得一誤用者害不旋踵

醫至謂

有食積以巴豆藥三五丸下之亦不動至明而死

縱有食積何必

下以巴豆遂平李仲安攜一僕一佃客至偃城夜宿邵輔之家

是夜僕逃仲安覺其逸也騎馬與佃客往臨穎追之時七

月天大熱炎風如箭埃塵漫天至辰時而還曾不及三時

往返百二十里既不獲其人復宿于邵氏齋忽夜閒聞呻

吟之聲但言救我不知其誰也執火尋乃仲安之佃客也

上吐下瀉目上視而不下胸脇痛不可動搖口欠而脫曰

四肢厥冷此正風溼喝三者俱合之證也

夜行風大兼感涼氣乘馬疾馳

更挾勞瘁

其壻曾聞余言乃取六一散以新汲水剉生薑調之

頓服半升其人復吐乃再調半升令徐服之良久方息

吐證

服藥往往不受必

至明又飲數服遂能起

生薑不煎但剉入新汲水中而

徐徐服始合法也調六一散取其微辛佐甘涼之劑以解風暑

而清溼熱略無助火之弊可爲用藥之法

調養三日平

復先清外感而後調其勞
瘁之傷可為治病之法

羅謙甫治一蒙古因食酒肉潼乳而患霍亂從朝至午精

神昏憤脈皆浮數暑邪未去按之無力所傷之物已出矣正氣已虛

卽以新汲水調桂苓白朮散徐徐服之妙隨作地漿水澄

取清者一杯再調服之尤妙吐瀉遂止次日微煩渴與錢氏

白朮散時服而愈脈證如是而所傷之物已出則知中氣傷殘暑邪未解故用補正清邪之治凡

虛人受暑而病此者卽以是案為法可也其理中四逆等方皆治陰寒致病非治暑也此等界限不清亦何足以言

醫耶

又治提舉公年近八十六月閒患霍亂吐利昏冒終日不

省人事暑邪內擾脈洪大有力一息七八至火勢衝激頭熱如火熱邪

上僭不足冷如冰肺氣不降非下虛也半身不遂胃氣大亂不能束骨利機關牙

關緊急熱入陽明之絡不是中風遂以甘露散瀉熱補氣安神明加茯

苓以分陰陽冰水調灌漸漸省事而諸證悉去後慎言語

虛證最要節飲食諸病宜爾無病人亦宜爾三日以參朮調中藥理正氣十

日後方平復

汪石山治一人年三十餘形瘦弱忽病土吐下瀉水漿不

入口七日自分死矣未服燥熱藥猶可不死診脈八至而數曰當夏

而得是脈暑邪深入也提舉以八十之年而脈八至此人七日不進水漿脈亦八至若非明

眼必以爲虛矣吐瀉不納水穀邪氣自盛也遂以人參白虎湯進

半杯良久復進一杯徐進覺稍安三服後減去石膏知母

而人參漸次加至四五錢

操縱有法

黃檗橘皮麥冬等隨所兼

病而佐使

制劑有法

一月後平復

暑盛元傷之治此案可法

一僕夫燕京人縱酒飲食無節病霍亂吐瀉轉筋煩渴幾

殆時六七月淋雨晝夜飲檐溜水數升而安

貧而無人服侍得飲此而

愈余亦曾見一人如是後生六子起家致富孫曾繞膝壽至九秩而終若富貴人患此則每為溫補藥所誤也干

金方云輕者水瘥

良然良然古良然我哉

此偶合古方余目擊其事

後路途中及六合縣見一人服新汲井水良愈

凡暑熱病渴喜冷飲

者但以新汲水或冬雪水徐徐飲之皆能向愈不但霍亂為然也今人雖明知其患熱而猶禁冷飲何耶

一人病霍亂欲吐不吐欲瀉不瀉心腹痞痛脈之沈伏如

無痛脈每

此乾霍亂也急令鹽湯探吐宿食痰涎碗許遂

瀉上竅得開下竅自通與六和湯愈

但得吐瀉即可治矣

孫文垣治程氏子先醉酒後御色

其平素縱恣貪涼可知矣

次早四肢

冷胃脘痛極脈僅四至或以鬱火治投以寒涼痛更甚三

日前所食西瓜吐出未化

傷冷已甚

乃翁以為陰證傷寒

凡人

病犯房事者雖不傷冷食亦謂之陰證

欲用附子理中湯

傷寒

輒以丁附薑桂殺之可慘也已

不決

此翁頗虛心延孫視之面色青慘叫痛而聲不揚坐

臥煩亂是霍亂兼虵厥證也先當止痛安虵後理霍亂可

免死也遲則誤事矣急用醋炒五靈脂三錢蒼朮一錢五

分烏梅三箇川椒炮薑桂心各五分水煎飲下痛減大半

恣啖生冷復傷于酒更誤于寒

涼之藥故以溫胃安虵得效 下午以大腹皮藿香半夏

橘皮山查茯苓五靈脂兩帖全安

仍以和中化滯理其脾胃而愈御色一端略不

置議洵可法也

江篁南治從叔于七月閒得霍亂證吐瀉轉筋足冷多汗

囊縮一醫以傷寒治之增劇

庸工常技

江診之左右寸皆伏不

應

上下否塞故脈伏而微

尺部極微口渴欲飲冰水

足冷囊縮似屬厥陰口渴亦似

少陰引水自救何以辨之曰直中陰溼無轉筋多汗證若少陰頭有汗則死矣

乃以五苓散與之

此治傷寒霍亂有表證之方江氏不察泥于熱多欲飲水句而誤也此時如用桂苓甘露飲則得矣

覺稍定

向午猶渴

囊縮乃暑熱入于厥陰故口渴欲飲冷非傷寒也而與傷寒藥渴何能已

以五苓加

麥冬五味滑石投之

始知為暑熱矣僅加麥冬滑石不足蔽辜而五味酸溫尤不宜用

更

以黃連香薷飲冷進一服

前方拘泥俗說妄用五味不知服後何如忽進此劑殊屬可笑

次早脈稍出按之無根且人脫形連投溫燥又以香呃忒

手足逆冷飲食入口卽吐桂朮五味香薷等藥見效矣大便稍不禁爲

灸丹田八九壯囊縮稍舒手足稍溫伏熱得火灸已繼以

理中湯二三服茫無頭緒若江氏者可謂蔽于古而不渴

猶甚咽疼熱不解時或昏沈理中湯又見效矣可乃以竹

葉石膏湯焦頭爛額之客投之而愈此案江氏初治原知爲熱止

吐形脫之時又不知清補兼施而艾灸理中幾至潰敗

幸而不用附子故未著尙能挽救然亦危矣讀者鑒諸

江少微治一婦人六月中旬病霍亂吐瀉轉筋一醫投藿

香正氣散此治襲涼飲冷兼寒加煩躁面赤揭衣臥地霍

正氣散溫散之劑也尙不可誤施于暑熱霍亂故誤投附

桂者每見下咽卽昏沈厥冷渾身青紫而死醫者猶謂陰

盛已極此等大熱之藥尙不克救再遇此證仍以此法投之至老不悟而死者之冤亦無從訴此余之所以述霍亂轉筋諸治法江診之脈虛無力身熱引飲此得之傷暑宜爲世告也

辛甘大寒之劑瀉其火熱以五苓散加滑石石膏吐瀉定

再與桂苓甘露飲而痊暑熱爲病脈多虛微澀弱絃細芤遲以熱傷氣也甚至隱伏不應指

或兩尺絕無皆邪滯經絡上下格拒使然不可誤認爲虛寒也亦有脈因火煽而反洪大滑數異常者此霍亂所以

無一定之診臨病極宜善審也

陳三農治一婦暑月方飯後卽飲水而睡睡中心腹痛極

肢冷上過肘膝欲吐利而不得吐利疔痛垂死六脈俱伏

令以藿香正氣散煎湯探吐一吐減半再吐而安此停食飲冷睡

臥當風而成乾霍亂也以對證之劑引吐又合機宜不必拘守鹽湯一法也

繆仲淳治高存之家僕婦患霍亂以砂仁一兩炒研鹽一

撮沸湯調冷服一劑愈

此治夏月貪涼脾胃不和之輕證也冬月感寒患此亦可用但宜溫

服余當自驗

傷冷物者加吳茱萸

張石頑云一少年新婚陡然腹痛麻脊

醫通謂之番沙即乾霍亂之因熱者

或令飲火酒半杯

此必疑其為陰證也而不知少年新昏最多火證何耶以不論貧富冬夏衣被

皆新而合歡成禮勞則火生也

腹痛轉劇旋增顛脹身發紅點

熱毒得酒愈熾若不

急從清解必七

與蘆根汁

解酒毒而清熱

得吐痛解復有鼻衄口

燥胸腹略見紅斑

血分熱極

啜童子小便稍安

清管妙品

又濃煎茵

豉湯

宣解惡氣穢毒之聖藥

仍入童便續與之得大吐汗出而痊

葉天士治一人霍亂後中氣大虛肝風內動心中空洞身

痛肢浮用異功散加木瓜薑棗按此以培中制木之劑而爲霍亂善後之治最可法也若見身痛肢浮而誤用表散之品則內風愈動脾土重傷因而致殆者多矣夫霍亂固是中焦土病而土病多由木侮故雖治寒霍亂必首察厥陰之動靜儻其人肝陰素虧內風暗動者薑附等極宜慎用卽當用者亦須妥爲駕馭毋使過劑設或無節雖不似熱霍亂之立時殞命亦必增劇而生枝節試觀仲聖治厥陰下利之用白頭翁湯其義自明蓋厥陰雖當兩陰交盡而具合晦朔之理陰之初盡卽陽之初生其本陰其標熱其體木其用火是以獨稱剛臟而爵以將軍顧名思義可

以悟其治矣世有治肝氣惟崇剛燥者驟則變瘕厥緩則成關格人但知病之日深而不知藥之所釀併及之以爲醫家病家兩鑑焉

懷抱奇治一男子恣飲梅水吐瀉無度手足厥逆面色慘晦聲音不出而脈沈伏小水點滴不通服藥入口卽吐醫告技窮余思梅味酸主收故小便癰閉而果得麝則敗麝又香竄走竅乃取麝半入臍中半入鼻孔病者卽以手拂其鼻曰此何物也少頃小水大下二三行忽如醉而醒夢而覺越日索粥漸安

此無外因者故但以敗果通竅卽能奏效其巧思正不可及也

童拭廬治陳氏婦盛夏病霍亂吐瀉腹中疝痛四肢厥冷

冷汗漤漤轉筋戴眼煩躁大渴喜冷飲飲已卽吐六脈皆
伏雖曰霍亂實臟厥也經云大氣入臟腹痛下注可以致
死不可以致生速宜救陽爲急遲則腎陽絕矣以四逆湯
薑附各三錢炙甘草吳茱萸各一錢木瓜四錢煎成冷服
日夜連進三劑四肢始和危象皆退口渴反喜沸湯寒象
始露卽于方中注以生津存液之品兩服而安按此案論
證用藥皆有卓識其真諦全在喜冷飲而飲已卽吐及服
熱藥後反喜沸湯也設能受冷飲者卽爲內真熱而外假
寒然熱證亦有胸下格拒不通雖喜冷飲飲已仍吐必細
細呷之始能受也亦有痰溼內盛雖渴而喜熱飲者皆不

可誤認爲寒也故必辨舌苔之色澤驗小水之有無始無
遁情案中未及尙欠周詳且大氣入臟非人人共患之疫
而疫氣流行之際亦閒有此一證故醫者必議病而用藥
毋執方以殺人是乃仁術

倪姓患霍亂吐瀉審知始不作渴四肢不逆脈不沈細

易治

之證

一醫用大順散兩帖漸至于此因見四逆復加附子脈

證更劇

我見實多

童曰此病一誤再誤命將殆矣若果屬寒投

熱病已今反四逆脈轉沈細欲伏乃釀成熱深厥深與熱

邪傳入厥陰者何異

辨證中肯

卽以竹葉石膏湯人參易西洋

參

是

加黃連滑石兩劑而安同時有陸姓患此醫用回陽

之劑日夜兼進

豈真欲其速死哉紙上談兵讀書無眼者往往如是不僅粗工爾也我見亦多厥

逆煩躁日增病人欲得冷水禁絕不與

可恨可歎

甚至病者自

起拾地上痰涎以解渴

可憐可慘

遷延旬日而死

能延旬日則欲得冷水時

若能轉計猶可活也

噫即使真屬陰寒陽回躁渴如是熱藥之性鬱

而無主以涼藥和之病亦立起不學無術曷勝浩歎

涼藥和之妙理未經人道

謝城

張氏女夏月患霍亂醫用薑附藿朴朮連等藥嘔吐雖止腹痛不已而痢五色至第八日童診脈細數沈部有力兩目單翳舌絳脣紅胸膈煩懣口渴引飲是暑穢之毒擾亂中宮而病霍亂苦熱雖能開鬱止嘔畢竟反助邪勢致變