

幼科證治準繩卷之七

金壇王肯堂字泰輯

脾

錢脾主困

實則困睡身熱飲水

虛則吐瀉生風

脾病因

脾泄瀉不思飲食

脾胃虛寒則面飢白目無精光口鼻氣冷

肌體瘦弱吐水腹痛不思乳食用益黃散下利用調中丸傷

風手足冷者脾臟怯也先用益黃散補脾後用大青膏發散

脾病見四季皆放餘四臟治之順者易治逆者難治脾法當

面赤目黃五臟相返隨證治之濕脾主濕白病則泄瀉多睡

耐重倦脾苦濕急食苦以燥之實則泄瀉赤黃睡不露睛

瀉黃散主之 虛則泄瀉色白睡露睛白朮散主之 肝乘脾

賊邪風瀉而嘔茯苓半夏湯主之 心乘脾虛邪壯熱體重而

瀉羌活黃芩蒼朮甘草湯主之 肺乘脾實邪能食不大便而

嘔吐嗽煎檳榔大黃湯下葶藶丸 腎乘脾微邪惡寒泄瀉理

中丸之類主之 劉凡脾之得病必察肝心兩臟之虛實根其

源之所起然後治療蓋肝是脾之鬼心是脾之母肝氣盛則鬼

勝心氣虧則脾家生氣不足盛者抑之則退虧者益之不乏所

以有抑脾氣益心氣兩藥診其脉肝心兩臟俱和則是脾自生

疾察其虛實而治之 匿前證實者病氣實而形氣虛也若面

色眊白吐瀉腹痛口鼻氣冷屬寒水侮土宜用益黃散若面青

唇黯吐瀉手足並冷此脾土虛寒用乾薑理中湯若面色痿黃

手足不冷此脾土虛弱用人參理中湯若傷風手足並冷吐痰咳嗽吐瀉腹脹此脾肺氣虛用五味異功散實脾氣加防風升麻散外邪若發於寅卯之時用六君柴胡升麻補脾土平肝木然面黃者脾之本色也面赤者火生土為順面青者木尅土為逆薑平其所勝以補元氣為善

術 脾欲緩急食甘以緩之甘草 以甘補之人參 以苦瀉

之黃連 脾虛以甘草大棗之類補之如無他證以錢氏益黃散補之虛則補其母心乃脾之母以炒鹽補心

益黃散

錢氏

又名補脾散 治脾胃虛寒

陳橘皮

壹兩

青橘皮

訶子肉

甘草

各半兩 剉炒

丁香

錢貳

右爲細末每服二錢水一盞煎至六分食前溫服

東垣云關孝忠編集錢氏方以益黃散補土又言風旺必尅脾土當先實其脾昧者不審脾中寒熱一例用補脾藥又不審藥中有丁香青皮辛熱大瀉肺金脾虛之證豈可反瀉其子爲寒水反來侮土中寒嘔吐腹痛瀉痢青白口鼻中氣冷益黃散神治之藥也如因服熱藥巴豆之類過劑損其脾胃或因暑天傷熱積熱損其脾胃而成吐瀉口鼻中氣熱而成慢驚者不可服之今立一方治胃中風熱名人參安胃散薛氏云脾土虛寒寒水侮之如東垣所云諸證宜用此方若因脾土虛弱吐瀉者用六君子湯加柴胡如不應或手足俱冷屬虛寒也更加木香炮薑若因乳母脾虛肝侮必治以前

藥若乳母鬱怒致兒患前證母服加味歸脾湯

人參安胃散 治脾胃虛熱

黃耆

錢貳

人參

陳皮

去白各壹錢

生甘草

炙甘草

各半錢

白芍藥

柒分

白茯苓

肆分

黃連

少許

右爲粗末每服二三錢水煎五沸去查溫服

四君子湯

六君子湯

二方見吐瀉

海脾實以枳實瀉之如無他證以錢氏瀉黃散瀉之實則瀉其

子肺乃脾之子以桑白皮瀉肺

瀉黃散

錢氏

又名瀉脾散

藿香葉

柒錢

山梔子仁

壹兩

石膏

半兩

甘草

二兩

防風

肆兩去
芳切焙

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服一錢至二錢水一盞煎至五分溫服清汁無時

薛前證若作渴飲冷卧不露睛手足熱甚或遍身發黃屬胃經實熱宜用瀉黃散若作渴飲湯卧而露睛手足並冷屬胃經虛熱宜用異功散若面青搐搦乳食少思肝乘脾也用秘旨補脾湯若面赤驚悸身熱昏睡心乘脾也用秘旨安神丸若面白喘嗽肢體倦怠肺乘脾也用補中益氣湯若唇黑泄瀉手足指冷腎乘脾也用益黃散病後津液不足口乾作渴宜用七味白朮散若乳母膏粱厚味七情鬱火所致當審其因而治其母

不乳食

薛經曰胃爲水穀之海六腑之大源也人身氣血腑臟俱出胃氣而生故東垣之法一以脾胃爲主所謂補腎不若補脾正此意也在小兒雖得乳食水穀之氣未全尤仗胃氣胃氣一虛則四臟俱失所養矣故丹溪謂小兒多肝脾之疾也若面色晄白目無睛光口中氣冷不食吐水肌瘦腹痛此胃氣虛寒之證用五味異功散或六君子湯主之若大便不實兼脾虛也加乾薑溫之中滿不利脾不運也加木香開之喜冷便秘胃實熱也用瀉黃散涼之命門火衰不能生上者用八味丸補之稟賦胃氣不足亦用此丸蓋下真陽充盛則上生脾元自能溫蒸水穀

矣

半胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脹痛口苦短氣惡心噯

氣吞酸面黃體瘦嗜臥體痛霍亂吐瀉等證

厚朴 薑汁 伍兩

陳皮

甘草 炙各 壹兩

蒼朮 米泔浸 焙入兩

右為末每服二錢薑棗水煎沸湯點服亦得當服調氣煖胃

化宿食消痰飲辟四時不正之氣

愚按前證若乳食停滯噯腐吞酸嘔噦惡心者宜服是方若

飲食既消脾胃虛弱嘔吐惡心者則宜四君子湯

調中丸 治脾胃虛寒

白朮

人參

甘草 炒各 伍分

八味地黄丸即六味地黄丸加肉桂附子各壹兩治稟賦命門

火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思及食而不化腹
膈疼痛夜多漩溺等證內經謂益火之源以消陰翳止此藥
也

錢氏益黃散

一名益脾散

治脾胃虛冷吐瀉

方見前

愚按前方若脾土虛寒或寒水侮土而嘔吐泄瀉手足並冷
或痰涎上湧腫而露睛不思乳食者宜用此方若脾土虛弱
吐瀉者用六君柴胡如不應或手足俱冷者屬虛寒加水香
炮薑若因乳母脾虛肝侮亦治以前藥若乳母鬱怒致兒患
前症者其母兼服八味歸脾湯

參苓白朮蓮肉主脾胃虛弱飲食不進多困少氣中滿痞噫嘔
吐逆此藥不寒不熱性味和平常服調脾悅色順正去邪

人參去蘆

白茯苓去皮

粉草

白朮

白扁豆炒去殼

山藥去黑皮

縮砂仁

薏苡仁

桔梗剉炒九味

蓮子肉去心

右剉焙爲末每服半錢至一錢用棗湯空心調服或溫米湯

亦可

健脾飲

健脾養胃理嘔吐治瀉痢及諸病後氣色虛弱有痰

惡心腹中微痛飲食減精神慢並宜服之

厚朴

去麤皮剉碎薑汁浸一宿慢火焙乾西入醋焙透仍以慢火炒

人參

去蘆各壹兩

白茯苓

去皮

肉豆蔻

半夏

湯煮透濾仍剉焙乾

益智仁

淨香附

良薑

剉片東薑土炒

訶子肉

各貳錢半

甘草

炙伍錢

右剉每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分無時服

霍香飲 理虛化痰及治脾胃不和飲食少進正氣除邪

人參 去蘆

半夏

湯煮透濾
剉片焙乾

赤茯苓

去皮

甘草 炙各
壹兩

蒼朮

去麁皮米泔水浸一宿濾乾
剉片用火炒至微黃色二兩

陳皮 去
白

藿香

去梗各
柴錢半厚朴
壹兩半
去麁皮製

右件咬咀每服二錢水一盞薑二片棗一枚煎七分空心溫

服或入燒鹽同煎

治小兒脾胃虛弱飲食少進

用人參白朮茯苓甘草等分爲末每服一錢鹽湯點服一方

加陳皮礞砂

治胃虛氣逆吮乳不食

用人參壹錢丁香藿香葉各半錢水半盞煎熟入乳汁少許

煎服

治胃弱吐逆手足心熱不進乳食

用陳紅麴參錢半白朮壹錢半麴炒甘草炙壹錢爲末每服半錢棗湯米飲下

治脾胃不和嘔逆惡心乳食不進

用厚朴薑製壹錢白朮半錢乾薑炮甘草炙各參分水一盞薑二片煎空心熱服

治宿食傷脾消食快膈

用硝砂仁枳皮三稜莪朮神麴麥蘖各半兩香附子壹兩各炒爲末麴糊丸如麻子大食後白湯下隨大小加減丸數

茅先生勻氣散

桔梗兩

甘草炙 兩

白薑壹分

硝砂仁

陳橘皮

茴香洗 各壹兩

為末半錢或一錢霜木灰煎湯調服紫蘇鹽湯亦得厚朴蒼

木良薑烏梅
名養脾湯

調理眾病醒脾散

木香

白朮並濕 炙 兩

人參

茯苓

草薢子

甘草炙

陳橘皮

厚朴綱 水 煮

紫蘇子

右等分為末一錢水六分薑一片棗半箇煎四分通口服

建脾散 治小兒胃氣

白茯苓去 皮

人參各壹兩

厚朴參 兩 用 薑 汁 炙 蒼朮米 泔 浸 宿 肆 兩

陳橘皮

去白 伍兩

甘草

生 貳兩半

草菓子

去皮 貳兩

右件為末每服一錢薑棗同煎隨大小分減服

調中飲子

治小兒諸疾

肉荳蔻

白朮

炮

人參

陳橘皮

去白

訶子

炮法 核

茴香

甘草

炙

硝砂仁

各半 兩

藿香

桂心

檳榔

各參 錢

右為末每服半錢一錢用薑棗煎水隨兒大小五分四分煎

通口服

寶童壯脾去積進食

京三稜

蓬莪茂

醋紙 裏煨

益智

去皮 各肆兩

甘草

炙肆兩半

陳皮

青皮

各貳兩

右為末湯點一錢不時服薑棗煎亦得

治患後脾胃虛弱煩熱恍惚睡中多驚氣急煩亂溫養脾胃消
進飲食勻氣清神調和臟腑神木散

白朮

人參

茯苓

石蓮肉

去心

鷲粟米

白扁豆

藿香

甘草

炙

等分細末半小錢棗湯調空心日午服

漢東觀音散少白朮
粟米多神麴白芷木

者

聖惠治脾胃不和見食欲嘔心胸壅悶前胡散

前胡

蘆根

各參分

桂心

分

人參

白朮

赤茯苓

枇杷葉

去毛炙

甘草

炙

厚朴

薑炙各半兩

龕羅一錢水一小盞薑少許煎五分不時量溫服

張渙集香煎

治脾胃虛不欲食羸瘦

藿香葉

厚朴

薑製

丁香

沉香

木香

各壹兩

白茯苓

白豆蔻

白朮

炮各半兩

右爲細末入麝香壹錢水一升蜜半斤大棗三十枚薑二十

片銀石器中慢火熬成膏去薑棗通風處陰乾每皂子大乳

前米飲下

調中散 治小兒冷熱不調致脾胃不和

木香

剉

人參

去蘆頭

青橘皮

湯浸去白焙乾各壹兩

丁香

白朮

白茯苓

大腹皮

剉

甘草