




丹溪心法附餘卷之一

外感門上

中風一 附中氣 預防中風

新安居士方廣 輯

丹溪心法

中風大率主血虛有痰治痰為先次養血行血或屬虛挾火痰一作與溼又須分氣虛血虛半身

不遂大率多痰在左屬死血少痰一作血在右屬痰有熱併氣虛左以四物湯加桃仁紅花竹瀝姜

汁右以二陳湯四君子等湯加竹瀝姜汁痰壅盛者口眼喎斜者不能言者皆當用吐法一吐

不已再吐輕者用瓜蒂一錢或稀涎散或鯁汁以鯁半斤入醬葱姜等物料水煮先喫鯁次飲汁後

以鵝翎探引吐痰用鯁者蓋引其風出耳重者用藜蘆半錢或三分加麝香少許薑汁調若口喎昏

迷者灌入鼻內吐之虛者不可吐初昏倒即掐人中至醒然後用痰藥以二陳湯四君子湯四物

湯加減用之氣虛卒倒者用參芪補之有痰濃煎參湯加竹瀝姜汁血虛用四物湯俱用姜汁

炒恐泥痰故也有痰再加竹瀝姜汁入內服能食者去竹瀝加荊瀝肥白人多溼少用烏頭附子

行經凡用烏附必用童便煮過以殺其毒瘦人陰虛火熱用四物湯加牛膝竹瀝黃芩黃柏有痰

者加痰藥治痰氣實而能食用荊瀝氣虛少食用竹瀝此二味開經絡行血氣故也入四物湯必

用姜汁助之遺尿屬氣虛以參芪補之筋枯者舉動則痛是無血不能滋養其筋不治也脉訣

內言諸不治證口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛髮直搖頭上竄面赤如裝或頭

面青黑汗綴如珠皆不可治

按內經已下皆謂外中風邪然地有南北之殊不可一途而論惟劉守真作將息失宜水不能制

火極是由今言之西北二方亦有真為風所中者但極少爾東南之人多是溼土生痰痰生熱熱生

風也邪之所軼其氣必虛風之傷人在肺臟為多 許學士謂氣中者亦有此七情所傷脉微而數或浮而緊緩而遲必也脉遲浮可治大數而極者死 若果外中者則東垣所謂中血脉中府中藏之理其放四肢不舉亦有與痿相類者當細分之局方風痿同治大謬發揮其詳子和用三法如的係邪氣卒中痰盛實熱者可用否則不可

入方

肥人中風口喎手足麻木左右俱作痰治

貝母

瓜蒌

南星

荊芥

防風

羌活

黃柏

黃芩

黃連

白木

陳皮

半夏

薄桂

甘草

歲靈仙

天花粉

多食溼麵加附子竹

瀝姜汁酒一匙行經

一婦手足左癱口不能言健啖

防風

荊芥

羌活

南星

沒藥

乳香

木通

茯苓

厚朴

桔梗

麻黃

甘草

全蝎

右為末湯酒下不効時春脉伏漸以淡鹽湯釐汁每早一碗吐五日仍以白木陳皮茯苓甘草厚朴葛蒲日服二貼後以川芎山梔豆豉瓜蒂萊菔粉釐汁鹽湯吐之吐甚快不食後以四君子湯服之以當歸酒芩紅花木通粘子蒼朮姜南星牛膝茯苓為末酒糊丸十日後夜間微汗手足動

而能言

一人癱左

酒連

酒芩

酒栢

防風

羌活

川芎

當歸

半兩

南星

蒼朮

人參

一兩

麻黃

甘草

三錢

附子

三片

右丸如彈子酒化下

一人體肥中風先吐後以藥

蒼朮

南星

酒芩

酒栢

木通

茯苓

牛膝

紅花

升麻

厚朴

甘草

附諸賢論

沙洄集曰人有卒暴僵仆或偏枯或四肢不舉或不知人或死或不死者世以中風呼之而方書亦以中風治之余嘗攷諸內經則曰風者百病之始也又曰風者百病之長也至其變化乃為他病無常方又曰風者善行而數變又曰風之傷人也或為寒熱或為熱中或為寒中或為癰風或為偏枯或為風其卒暴僵仆不知人四肢不舉者並無所論止有偏枯一語而已及觀千金方則引岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺解之者曰偏枯者半身不遂風痺者身無痛四肢不收風懿者奄忽不知人風痺者痺類風狀金匱要畧中風篇曰寸口脉浮而緊緊則為寒浮則為虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪喝僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經即克不勝邪入於腑即不識人邪入於臟舌即難言口吐涎沫由是觀之知卒暴僵仆不知人偏枯四肢不舉等證固為因風而致者矣故用大小續命西州續命排風八風等諸湯散治之及近代劉河間李東垣朱彥修三子者出所論始與昔人異矣河間曰中風癱瘓者非謂肝木之風實甚而卒中之亦非外中於風由于將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則陰虛陽而熱氣怫鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也多因喜怒悲恐五志有所過極而卒中者由五志過極皆為熱甚故也俗云風者言末而忘其本也東垣曰中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒

傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛或間有之亦是形盛氣衰而如此彥修曰西北氣寒為風所中誠有之矣東南氣溫而地多溼有風病者非風也皆溼土生痰痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主乎氣彥修主乎溼反以風為虛象而大異於昔人矣吁昔人也三子也果孰是歟果孰非歟以三子為是昔人為非則三子未出之前固有從昔人而治愈者矣以昔人為是三子為非則三子已出之後亦有從三子而治愈者矣故不善讀其書者往往致亂以予觀之昔人三子之論皆不可偏廢但三子以相類中風之病視為中風而立論故使後人狐疑而不能決殊不知因於風者真中風也因於火因於氣因於溼者類中風而非中風也三子所論者自是因火因氣因溼而為暴病暴死之證與風何相干哉如內經所謂三陰三陽發病為偏枯痿易四肢不舉未嘗必因於風而後能也夫風火氣溼之殊望聞問切之間豈無所辨乎辨之為風則從昔人以治辨之為火氣溼則從三子以治如此庶乎析理明而用法當矣惟其以因火因氣因溼之證強引風而合論之所以真偽不分而名實相紊若以因火因氣因溼證分出之則真中風病彰矣所謂西北有中風東南無中風者其然歟否歟

附脉理

脉訣舉要曰中風脉浮滑兼痰氣其或沉滑勿以風治或浮或沉而微而虛扶危溼痰風未可疎

附諸方

通關散 治卒中風邪昏悶不醒牙關緊閉湯水不下

細辛洗去土葉 猪牙皂角去子各一錢

右為末每用少許搐入鼻內候噴涕服藥 一方加半夏 一錢

不臥散 治中風卒倒不知人事用此搐鼻即甦

川芎一兩半 石膏七錢半 藜蘆半兩 生甘草二錢半

右為細末口擒水搗之

通頂散 治中風中氣昏憤不知人事急用吹鼻即甦

藜蘆 生甘草 川芎 細辛 人參各一錢 石膏五錢

右為末吹入鼻中一字就提頭頂中髮立甦有哽者可治無哽者不可治

搐鼻通天散 治卒暗中風倒地牙關緊急人事昏沉

川芎 細辛 藜蘆 白芷 防風 薄荷各一錢 猪牙皂角 刮去皮三箇

右為細末用蘆筒細藥每用少許吹入鼻中

破棺散 經驗方 治中風牙關已緊無門下藥

天南星末半錢 龍腦少許

右五月五日午時合每用半錢頻擦令熱牙自開

奪命散 楊氏家藏方 治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚

風證並皆治之

甜葶藶 香白芷 天南星 半夏 湯泡去滑 巴豆去殼不去油各等分

右為細末每服半錢用生姜自然汁一呷調下牙關緊湯劑不下者此藥輒能治之小兒以利痰

或吐為愈

解毒雄黃丸 和劑方 治中風卒然倒臥牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫閉

一應熱毒

鬱金二錢 巴豆去皮油 雄黃 研飛二錢半

足下金心去付余 卷一 中風

本方治中風飲食不進
右為末醋煮麵糊丸如菜豆大每服七丸用熱茶送下吐出頑痰立甦未吐再服如牙關急緊輪
開灌下

稀涎散 治中風忽然若醉形體昏悶四肢不收涎潮搐搦氣閉不通

光明晉礬 一兩

猪牙皂角

四箇服實不吐者去黑皮

石為末每服半錢溫水調下風涎自出又云每服一錢至二錢不妨須要研勻調服吐出痰涎便醒

獨聖散

二聖散

三聖散

四靈散 以上四方並治痰涎壅盛口眼喎斜不能言者用此吐出痰涎稍醒方可進藥其四靈散

又吐虛痰之劑也 方見吐法

以上諸方開闢竅之劑

麻黃膏

宣明方

治中風不省人事卒然倒地

石須王相日乙卯者採麻黃一秤揀去根一寸長取東流水三石三斗以無油膩鐺量大小盛五

七者可先煮五沸掠去滓逐漸添水盡至三五斗已來澆去麻黃淘在盆中澄定良久用細羅子

濾去滓取清者鐺內再熬至一斗再濾再澄取汁再熬至升半已來為度只是勤攪勿令著底恐

焦了熬時忌雞犬陰人澄時須蓋覆不得飛入塵土其藥放一二年不妨如膏稠用水解熬再勻

凡中風卒倒用此膏加入湯藥內服或用此膏丸藥

小續命湯

拔粹方

經云陽之氣以天地之疾風名之此中風者非外來風邪乃本氣病也凡人年逾

四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛則間有之亦是形
盛氣衰而如此法當和藏府通經絡便是治風然亦有賊風襲虛傷之者也治法輕重有三治各
不同中血脉外有六經之形證則從小續命加減中府內有便溺之阻隔宜三化湯等通利之外
無六經之形證內無便溺之阻隔宜養血通氣大秦羌湯羌活愈風湯主之中藏痰涎昏冒宜至
寶丹之類鎮墜若中血脉中府之病初不宜用龍射牛黃蓋射香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦
入腎治骨恐引風深入骨髓如油入麵莫之能出又不可一概用大戟羌花甘遂瀉大腸大便損
其陰血真氣愈虛和劑方云此藥治邪在血脉最妙

麻黃去節

人參去蘆

黃芩去腐

芍藥

甘草炙

川芎

杏仁去燉

防己

肉桂各一兩

防風去蘆一兩半

附子炮去皮

右咬咀每服一兩生薑三片水二盞煎至一盞去滓通口服如治中風不審六經之形證加減雖
治與不治無異也開則洒然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以續命湯加減隨證治之

麻黃

防風

杏仁

依本方加一倍宜針太陽經至陰出血崑崙舉蹻

桂枝續命湯拔粹方

治中風有汗惡風

桂枝

芍藥

杏仁

依本方加一倍宜針風府此二證太陽中風也

白虎續命湯拔粹方

治中風身熱無汗不惡寒

石膏

知母

一料中各加二兩

甘草

依本方加一倍

葛根續命湯拔粹方

治中風身熱有汗不惡風

葛根

桂枝

黃芩

依本方加一倍宜針陷谷刺厲兌針陷谷者去陽明之賊也刺厲兌者瀉陽明之實也此二証陽

明中風也

附子續命湯拔粹方

治中風無汗身涼

附子

加一倍乾姜加二兩甘草加二兩

宜針隱白穴去太陰之賊也此一證太陰經中風也

桂附續命湯拔粹方

治中風有汗無熱

桂枝

附子

甘草

依本方加一倍宜針大谿此一證少陰經中風也

羌活連翹續命湯拔粹方

無此四證六經混淆繫於少陽厥陰或肢節攣痛或麻木不仁宜服

小續命

八兩

羌活

四兩

連翹

六兩

右古之續命混淆無經今立分經治療又分各經針刺無不愈也治法厥陰之井大敦刺以通其

經少陽之經絕骨灸以引其熱此通經引熱是針灸同象治法之大體也服法並如前

三化湯拔粹方

治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨證治之內有便溺之阻隔復以此

導之

厚朴姜製

大黃

枳實

羌活等分

右咬咀每服三兩水三升煎至一升半終日服之以微利則已如內邪已除外邪已盡當從愈風

湯以行中道久服大風悉去縱有微邪只從愈風湯加減治之然治病之法不可失於通塞或一氣之微汗或一旬之通利如此為常治之法也久則清濁自分榮衛自和矣

潤腸丸 治證同前老人宜服

麻子仁 另研大黃一兩半 桃仁泥

當歸尾

枳實 麩炒

白芍藥

升麻 各半兩

人參

生甘草

陳皮 各三錢 木香

檳榔 各二錢

右除麻仁桃仁外為末却入二仁泥蜜丸梧子大每服七八十九溫水食前下

大秦芫湯 拔粹方

治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知為血弱不能養於筋故手足不能運動舌強不能言宜養血而筋自榮

秦芫

石膏 各三兩

甘草

川芎

當歸

羌活

獨活

防風 去芦

黃芩

白芍藥

吳白芷

白朮

生地黃

熟地黃

白茯苓 各二兩 細辛 五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服如天陰雨加生姜三大片如心下痞加枳實一錢

煎

羌活愈風湯 拔粹方

治肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憤及治風溼內弱風熱體重或瘦而一肢

偏枯或肥而半身不遂心亂則百病生靜則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活

甘草 炙

防風 去芦

黃芪 去芦

人參 去芦

蔓荊子

川芎

細辛 去芦

枳殼 麩炒

地骨皮

麻黃 去根

知母 去皮

獨活

白芷

杜仲 炒斷絲 秦芫 去芦

柴胡 去苗

半夏 湯洗姜

厚朴 姜製

防已

熟地黃

前胡 各二兩 芍藥 去皮

黃芩 去腐

白茯苓 各三兩

石膏

生地黃

蒼朮 各四兩

桂一兩

右劉每服一兩水二盞煎至一盞去滓溫服如遇天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再服常服之藥不可失四時之輔如望春大寒之後加半夏柴胡人參各二兩望夏穀雨之後加石膏黃芩知母各二兩季夏之月加防已白朮茯苓各二兩望秋大暑之後加厚朴藿香各二兩桂一兩望冬霜降之後加附子官桂各一兩當歸二兩

祛風至寶丹 拔粹方 治風中臟疾涎昏冒及治諸風熱

防風

芍藥 格一兩 石膏

黃芩

桔梗

熟地黃

天麻

人參

羌活

獨活 各一兩 川芎

當歸 格二兩 滑石 三兩

甘草 二兩

白朮 錢一兩三連翹

荊芥穗

薄荷

麻黃 去根不

芒硝

黃連

大黃

黃柏

細辛

全蝎 各五錢

梔子 六錢

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒任下臨卧溫服

排風湯 和劑方

治中風邪氣入於五臟令人狂言妄語精神錯亂以至手足不仁痰涎壅盛

白蘚皮 一兩

當歸 去芦二兩

肉桂 去粗皮

芍藥

杏仁 去皮尖

白朮 二兩

麻黃 三兩

甘草

防風 去芦各二兩

芎藭 二兩

獨活

茯苓 去皮各三兩

右咬咀每服五錢水一鐘姜四片同煎溫服不拘時

廣按此方已上治風中血脉中府中藏之劑也

防風天麻散 宣明方

治風麻痺走注肢節疼痛中風偏枯或暴瘖難語內外風熱壅滯解頭目昏眩

天麻

防風

草烏頭

甘草

川芎

羌活

當歸尾

香白芷 附子

荊芥穗各半 滑石 二兩

右為末熱酒化蜜少許調半錢加至一錢覺藥力運行微麻為度或煉蜜為丸如彈子大熱酒化下一丸或半丸細嚼白湯化下亦得散鬱結宣氣道如甚者更服防風通聖散

廣按此方以下開鬱行氣散風泛治之劑也

疎風湯拔粹方

治半身不遂或肢體麻痺筋骨疼痛

麻黃

去節二兩

益智仁

杏仁

炒去皮各一兩

甘草炙

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口服脚登熱水葫蘆以大汗出去葫蘆冬月不去御風丹聖惠方 治一切中風半身不遂神昏語蹇口眼喎斜婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦涎痰

手足麻痺

川芎

白芍藥

桔梗

細辛

白殭蚕

川羌活

天南星

姜製各半兩

麻黃

去根節

防風去芦

白芷

各一兩

乾生薑

甘草

炒各七錢半

朱砂

二錢半為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸熱酒化下食前日三服神昏有涎者加朱砂二錢半續命黃散大全良方 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼睜動或時搖擗亡失津液渴欲飲水

此藥能扶榮衛去虛風中虛自汗及產後中風自汗尤宜服之

防風

獨活

當歸

人參

細辛

葛根

芍藥

川芎

甘草

熟地黃

遠志去心

荊芥

各五錢

官桂

七錢半

半夏

五錢

汗多不止加牡蠣粉

右咬咀每服一兩生薑三片水二盞煎至一盞去渣通口服

獨活湯大全良方 治虛風昏憤不自知覺手足痲痺坐臥不甯或發寒熱若血虛不能服發汗藥

足下

卷一

中風

六

及中風自汗尤宜服之

川獨活 羌活

人參 去芦

防風

當歸

細辛

茯神 去木

半夏

桂心

白微

遠志

菖蒲 去毛

川芎 各五錢 甘草 五錢

右咬咀每服一兩水二盞生姜五片煎至八分去渣食後溫服

防風湯 本事方

治中風內虛語言蹇澀

石斛 酒炒一兩半

乾地黄

杜仲 去皮切

丹參 各一兩三分

防風 去芦

川芎

麥門冬 去心

桂心

川獨活 各一兩

右咬咀每服八錢棗子二枚水二盞煎至八分去渣溫服不拘時

大防風湯 和劑方 去風順氣活血壯筋又治痢後脚痛緩弱不能行履名曰痢風或兩膝腫痛脚脛

枯腊名曰鶴膝風

熟地黄 酒洗二兩 白朮 二兩

羌活 去芦一兩

人參 去芦一兩

川芎 酒洗一兩

防風 去芦一兩

附子 炮去皮臍

牛膝 去芦酒浸一兩 甘草 炙一兩

川當歸 酒浸二兩

黃芪 去芦炙二兩

白芍藥 二兩

杜仲 去粗皮炒令

右咬咀每服四錢水一盞半生姜七片棗一枚煎至八分食後溫服

芎歸飲 治中風後人事虛弱

芎藭

當歸 去芦酒浸

防風 去芦各

右咬咀每服五錢水一鍾煎至半鍾不拘時服

以上諸方散風之劑

蘇合香丸

療傳尸骨蒸殭殭肺痿症忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月

閉症癖丁腫驚癇及小兒吐乳大人狐狸等病小兒用大緋絹袋盛當心帶之一切鬼邪不敢

近 凡人痰氣及中風痰涎壅上喉中有聲不能下者用青州白丸子同丸生姜自然汁化下立
効 產婦中風小兒驚風牙關緊硬不聞及不省者擦牙即開然後用風藥治之 小兒吐瀉驚
疳先用火焙此藥然後用生薑葱白自然汁化開白湯調灌 腳氣衝心用葶麻子去殼搗碎和
丸敷貼脚心疼痛立止 心腹絞痛中滿嘔吐姜湯化下 大人小兒傷風咳嗽姜葱汁白湯調
下 中風狂亂如見鬼神者白湯調服

白木 青木香 硃砂 研水飛 烏犀角 沉香 麝香 研 訶梨勒 煨去

丁香 安息香 另為一升 未用無灰 華撥 白檀香 香附子 各二 龍腦 研

薰陸香 另研 蘇合香油 各一兩 香膏

右為末研勻用安息香膏并煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大取井花水溫冷任意下四丸老
人小兒服一丸溫酒化服

烏藥順氣散 治男子婦人一切風氣攻注四肢骨節疼痛肢體頑麻手足癱瘓言語蹇澁者宜先

服此藥疎通氣道然後進以風藥 順氣升上為逆降下為順 順氣者正所謂降氣也

麻黃 去根節 陳皮 去白 烏藥 各二兩 殭蚕 去嘴炒 川芎 枳殼 去穰炒 甘草

白芷 桔梗 各一兩 乾姜 炮半兩

八味順氣散 凡中風之人先服此藥順氣後進風藥

白木 白茯苓 青皮 陳皮 白芷 烏藥 人參

甘草 各等分

每服六錢水一盞煎半盞溫服仍以酒化蘇合香丸間服妙

人參順氣散 和劑方 治感風頭疼鼻塞聲重及一應中風宜先服此藥疎通氣道然後進以風藥

乾姜 人參各一兩 川芎 去芦 甘草 炙 桔梗 去傍枝 厚朴 去皮 姜 白木 去梗

陳皮 去白 白芷 麻黃 去節 各 葛根 三兩半

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚薄荷五葉煎至七分溫服

勻氣散 瑞竹方 治腰腿疼痛手足攣拳及治中風不語口眼喎斜半身不遂等證前代曾服有效

白木 二兩 煨 天台烏藥 兩 天麻 半兩 沉香 青皮 去穢 白芷 人參 去芦

甘草 紫蘇 木瓜 各二錢半

右咬咀作十服每服水一盞生姜三片煎至半盞去渣溫服

廣按中風中氣之證乃痰火鬱滯便用散風瀉火豁痰之劑卒不能開宜先用此等開鬱行氣

之藥治之鬱開氣行其病自已

以上諸方順氣之劑 兼治中風先宜服此

川芎石膏湯 宣明方 治風熱上攻頭目昏眩痛悶風痰喘嗽鼻塞口瘡煩渴淋閉眼生翳膜此藥

清神爽志宣通氣血治中風偏枯解中外諸邪調理諸病勞復傳染

川芎 芍藥 當歸 山梔子 黃芩 大黃 菊花

荊芥穗 白木 以上各 滑石 四兩 寒水石 二兩 甘草 三兩 桔梗 二兩 砂仁 二錢半

石膏 一兩 防風 連翹 薄荷葉 各一

右為末每服三錢水一盞煎至六分去滓食後服水調亦得忌姜醋發熱物

防風通聖散 宣明方 論曰風寒熱諸疾之始生也人之藏府皆風之起謂火熱陽之本也謂曲直動

搖風之用也眩運嘔吐謂風熱之甚也夫風熱拂鬱風火生於熱以熱為本而風為標凡言風者即風熱病也氣壅滯筋脉拘倦肢體焦痿頭目昏眩腰脊強痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽嗑不利胸

腸痞悶咳嘔喘滿涕唾稠粘腸胃燥熱結便溺淋閉或夜臥寢汗咬牙睡語筋惕驚悸或腸胃拂鬱結水液不能浸潤於周身而但為小便多出者或溼熱內餘而時有汗洩者或因亡液而成燥淋閉者或因腸胃燥鬱水液不能宣行於外反以停溼而泄或燥溼往來而時結時泄者或表之陽和正氣衛氣也與邪熱相合併入於裏陽極似陰而戰煩渴者表氣寒故戰或虛氣又不已者經言邪熱與衛氣并入於裏則寒戰也并出或風熱走注疼痛麻痺者或腎水真陰衰虛心火邪熱暴甚而僵仆或卒中久不語或一切暴瘡而不語語不出聲或暗風痼者或洗頭風或破傷風或中風諸潮搐并小兒諸疳積熱或驚風積熱傷寒疫癘不能辨者或熱甚拂結而反出不快者或熱極黑陷將死或大人小兒風熱瘡疥及久不愈者或頭生屑偏身黑黧紫白斑駁或面鼻生紫赤風刺癢疹俗呼為肺風者或成風癩世傳為大風疾者或腸風痔漏并解酒過熱毒兼解利諸邪所傷及調理傷寒未發汗頭項身體疼痛者并兩感諸證兼治產後血液損虛以致陰氣衰殘陽氣鬱甚為諸熱證腹滿溢痛煩渴喘悶譫妄驚狂或熱極生風而熱燥鬱舌強口噤筋惕肉瞤一切風熱燥證鬱而惡物不下腹滿撮痛而昏者惡物過多而不兼消除大小瘡及惡毒兼治墮馬打撲傷損疼痛或因熱結大小便澀滯不通或腹急痛腹滿喘悶者並皆治之

防風

川芎

當歸

芍藥

大黃

薄荷葉

麻黃

連翹

芒硝將硝製過者是以上各半兩

石膏

黃芩

桔梗各一兩滑石三兩

甘草三兩

荆芥

白朮

梔子各二錢五分

同煎

劉廷瑞方有縮砂無芒硝其餘皆同

瀉青丸

治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁之故也

當歸 川芎 梔子 羌活 大黃 防風 龍膽草 各等分

右為末蜜丸彈子大每服一丸竹葉湯化下

廣按此劑乃瀉肝火之藥蓋肝主風風動則木搖故以此藥主之又予嘗見中風之證多是老年因怒而成蓋老年腎水真陰衰虛火寡於畏適因怒動肝火火無所制得以上升心火得助邪熱暴甚所以僵仆不知人事也火載痰上所以舌強不語口眼喎斜痰涎壅盛也治法先吐痰火以治其標次則豁痰瀉火以治其本割痰用星附湯省風湯瀉火用防風通聖散瀉青丸之類是也左癱右瘓者因氣血虛而痰火流注也血虛則痰火流注於左而為左癱氣虛則痰火流注於右而為右瘓治法左癱宜補血藥兼散痰火藥右瘓宜補氣藥兼散痰火藥急治則可久則痰火鬱結難治也

愈風丹 治風痰常宜服此調理

防風 連翹 麻黃 黃柏 黃連 各半兩 川芎 當歸

赤芍藥 薄荷葉 石膏 桔梗 何首烏 熟地黃 羌活

細辛 甘菊花 天麻 各一兩 黃芩 一兩半 白朮 荊芥 各二錢 梔子 七錢半

滑石 五兩 甘草 二兩 僵蚕 半兩 熱甚加大黃朴硝 各一兩 朱砂 金箔 為衣

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼茶酒化下

龍星丹 治諸風熱痰涎壅盛

牛膽南星 朱砂 各三錢 研為末 片腦 各三錢 牛黃 各三錢 麝香 各三錢 金蝎

防風 薄荷 各一錢 黃芩 黃連 各二錢 加青黛 壹錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服二丸噙化