

內科理法後編卷一

虎伯 撰

慈谿

舒高箴

目譯

英國

茹合

叅訂

哈來

新陽

趙元益

筆述

腦髓之病

分類

頭痛

腦生炎

腦胞膜生炎

腦上有水

中

風

腦髓久延病

頭痛

頭痛幾爲腦體各種輕重病之據亦爲特有一種功用病之據分爲表如甲裏如乙

甲表

一頭肉筋條痛

二骨衣頭痛

三腦筋頭痛

乙裏

一血聚頭痛

二胃不消化兼發頭痛

三器具

頭痛

表

一

頭肉筋條痛卽爲護頭肉筋條痛累及枕骨額

骨肉筋條並耳門骨肉筋條

病勢痛無界限眉毛下疤

動則有痛壓之擊之亦然尋常與頸骨肩髀及他處肉筋

條之痛同發

根原受冷

治法與新傷風之治法及肉

筋條久延風濕治法相等

二

骨衣頭痛在頭頂

病勢其痛尋常祇在一處重按

之則加其痛肉筋條行動不累及之間有累及面部骨衣

至於不可膜鼻有時通至身之別處最易者脚骨與胸骨

如限於一處常有浮腫。根原尋常之根原爲疔毒亦在皮面顯出且其面貌另有一種疔毒病色。治法卽用第二層疔毒之治法。鉀碘五釐合於補藥水爲一服如累及於骨並成膿須用刀開至其處並用外科中骨病之治法。三 腦筋頭痛或依時而作其痛在眼眶內角並鼻旁間有在一小處之痛覺如敲釘入內或在半面尋常在面之左半其時之間整齊如瘡有時隔十日之久亦有隔一箇月或一年者有時其往來之痛變爲久痛並有其病非確有往來但其病去之時間實有參差有病無病之兩半確有中線分開發痛之時或有一小時至二日之久婦女患

此病者多於男子。少年患此病者多於老年。然在各年紀之人俱能有此病。有痛至極甚者。食物語言風陣俱爲累事也。病勢頭頂上肉筋條收束加痛。因此與第一第二兩種可分別之。根原受冷濕草田毒氣。治法與瘧疾之治法相同。卽用大服之雞哪。然用砒霜酒謹慎服之。更佳。見方二百九十一

裏一血聚頭痛。此在三種情形內有之一。充足二軟弱易激動。三之力。白血輪病。病勢呆痛。關係於全頭。最關係者。額與枕骨充足者。有浮滿之面貌。凸出之紅目。廻血管漲足。脉滿神呆等。在軟弱易激動者。眼前有散光與

浮動之點耳鳴四肢冷脉小而數滑血虛者皮膚呆白色
口唇舌牙齦之色亦然四肢冷心悸頸發血管大跳動脉
小數而滑此兩等人在後發病之法從忽然鬧聲心思激
動或爲大出力而得之治法在充足者照充足之治法見前
軟弱易激動者安慰之留意其胃與大便卧時用平火安
心藥見方七十在血虛者照血虛之治法見前

安神藥與安神辭味毒藥服之過限能有第一種血聚頭
痛卽充足發熱病時亦有之其時背與四肢亦有痛中風
之初亦有之癆病初層亦有之其時尋常祇累及於額

二胃不消化或兼發頭痛卽極不安之頭痛 病勢與

別種頭痛之分別在其胃與養生路有病

證據其痛常

有一定之處卽如在左太陽及右眼之上

卽眉稜骨

或在額上

尋常朝晨起身時有痛輕者延至於早飯後更重者初起

有呆痛並無界限後漸歸於一處其時欲嘔發氣溢出酸

水並吐心思昏亂眼視不明耳中有聲有時胃中之物吐

盡則愈或吐出有沫之內皮汁或膽汁或接有泄瀉其期

從數小時至三四日重者隔一時復發人甚苦楚根原

胃與大便之功用不準足多用輕瀉藥使養生路軟弱所

致極不安之頭痛在經行之前後有之在其期之半亦有

之治法用輕瀉藥與鹼類藥相和服之卽如大黃與鈉

養或鎂養食物須準足運動如其根原輕者則用吐藥頭痛極不安而久延者用呖嗶略作吐藥每日早起用之甚妙如吐出多膽汁則逐膽汁之藥可用之見方二百四十九如大便不準足大黃與鉍可用之如多發氣則松節油與苦里亞蘇脫可用之以冷水淋頭亦可減輕之在病初起時用淡輕養炭養五釐可止之

三 身內器具頭痛 病勢此病與前病之分別在關係於全腦或病處深其輕重不定且無盡減去之時其痛又似充足之血聚頭痛如與胃不消化同來即嘔吐亦不能減其痛其病之根原至久在腦髓功用病證顯出即如癱

癰抽搐癰証是也。治法此頭痛爲病之證據故須治其
本病腦中運行血法須留意察之有界限之放血與全身
之放血瀉藥與引病外出藥須用之全身情形亦須留意
如腦有久延生炎病須用汞藥至於牙齦紅腫爲度
必須詳問頭痛之根原而分別其類治法必照其類卽如
其人間有額痛實已患肺癆病是也。補合註

腦並腦胞膜生炎

分別一總生炎卽關係於全腦髓並腦胞膜或爲其大
分二有界限之生炎或關係於腦髓之一分或腦髓與
腦胞膜之一分

一腦與腦胞膜總生炎

證據

有一種病發極大之頭痛並有重昏暈。又有一種

欲嘔吐出膽汁。大便久秘結。又有一種全身有癰証。又一

種不能開口。此種甚少。

病成時頭內大痛。太陽與頸骨之發血管跳動。面色紅。眼

紅有光彩。瞳人收小。面貌特有一種異形。不能耐聲與光。

知覺極靈。常醒。少睡。重昏暈。並有癰証。皮膚熱而乾。脉實

而數。時而滿。時而短縮。舌紅而乾。或有白苔。口渴甚。有欲

嘔之勢。並吐膽汁。大便常秘結。此證據俱屬於激動之一

層。延至一二三日。其證漸退。後卽有昏暈。耳聾。目視不明。

瞳人不靈，至眼肉筋條跳動，冷汗各竅之肉筋條寬鬆，溺積而不出，或有重暈睡。

在中暈時，此病極速，自一小時至四十八小時將死。瞳人收小不靈，呼吸急促，有腦生炎之據，速變暈睡，有時從初起即有癇証，然大半至死不顯此証也。

結末 傷命者結於暈睡，或結於大乏力，無神昏之證據。其愈者間有能完好，或結於癲狂或癱瘓，其期自一二日至半月或更多。

根原 受極大之熱或寒暑有大分別。太陽之直光運動太過，激動之欲念，讀書過於辛苦，胃中有惹動之物，身體

受傷飲酒過度痛風移動風濕皮膚生炎痘疹類病出牙
肺本體生炎內腎之病並各種發熱病最易得者血中有
膿發熱以上各種病俱能累及腦生炎
病勢與發狂之分別在其確有發熱之據且顯出極速
與發熱神昏之分別在其昏狂爲第一層而非第二層與
失血徵驗之分別在其全生炎之據並面有紅色能知之
與酒狂之分別在其情形皮膚熱而乾兼大發熱且無顫
動而知之大概酒狂之時面色呆白皮膚滋潤四肢顫動
病人尙能問答
成病之體腦胞膜變厚發出細倫清汁或兩物相併或

爲膿在腦胞膜之間或在腦內空處而其邊變軟腦體剖開之面有許多血點本體有淡桃紅色邊有灰紅色不能洗去之腦本體成膿變軟或變硬因中暈而死者肺與心之右房有充足之血

決病 易愈者睡與知覺復來汗熱而均勻泄瀉鼻中出血脉至數減少漸滿漸虛如已用汞藥則多口津不易愈者暈睡難咽食物極無知覺顫動癇証便溺自出溺不生意面色呆白在中暈者死者之數略居百分之五十

治法 在其激動之時指明減其頭中運行血法之

勢力

甲先將頭髮薙盡以冷水常洗之或用冰水或用常流下之水此爲更妙最宜於重昏暈時

乙放血在立直或坐直之時臂上大放血一次依年紀男女及病之輕重定放血之多少與次數後在頸骨上弔血在太陽處用螞吮法或開太陽之發血管更妙

丙初起時即用瀉藥草麻油或巴豆油或大服之汞綠與噶囉嚟或用汞綠半釐爲一服每隔二三四小時服一次

丁用壓血氣藥不令其致吐打打伊密的爲最妙者每一小時服六分釐之一至四分釐之一至於脉有效驗爲度戊在下肢用引病外出法卽如芥末外敷法或用一大弔

內科秘傳一
炎膏貼於大腿之陰面或浸足於極熱之水內

已用睡藥鴉片克羅路勒獨用之或併用之如昏狂極重並呼吸爽快則止

庚極清靜安息房間宜暗而寂靜頭與肩宜高於其身

二在僵臥之時用重瀉藥服之有益頭皮上敷弔炎膏甚多

極乏力之時須飲淡輕酒葡萄酒牛肉清湯與長肉之食物鴉片或鴉片酒謹慎服之如不能咽食物則將食物與藥從肛門噴進膀胱之情形須查驗明確其溺須每日二三次引出之

三 在全愈之時病者食物須時刻留心以均勻爲要用
輕瀉藥使大便秘尋常事業須待身體全愈方能作之
如病還復頭上卽用冷法並引病外出法尙須用更速之
瀉藥如性靈不復原善於遺忘病人有久延之軟弱與激
動須用冷水揩身或每日早起用噴淋浴頭上隨時用弔
炎膏或在頸骨與臂用針線弔炎法
中喝之治法以淋水法爲最佳
二 腦髓有界限生炎或累及腦胞膜
證據 常不顯明與生炎之廣狹輕重相等與腦之受累
處有關係大概第一證據有痛全不痛者甚少與運行血

法有相關。頭眩耳鳴。眼光不清。或不準。指與手臂之知覺。加靈。或全麻木。身之各處亦然。四肢略有痼証之動法。隨時嘔吐昏暈。或不安息。或失望。卧不安靜。其性靈亦累及若干分。運行血法不平勻。脉來有時緩而合度。面色呆白。有時脉數。面色紅。此相反之情形。在頃刻間遞更有之。常有嘔吐之勢。病有加重或減輕。此證據亦隨之而加減。且特有數種。肉筋條強硬。致有歪眼與醜態。口語有幾字不清。有時難於咽物。如四肢之肉筋條如此累及。則向內彎動之。必有大痛。瞳人常放大。或大小不等。一眼或兩眼之光俱不正。極重者。四肢之收束。更失其知覺。各竅之肉筋