

幼科證治準繩卷之五

金壇 百堂輯

門人南昌張綽校

痘疹

起發證治

萬痘瘡之證熱三日

出者後起痘疎毒輕

者自難出雖發難

可拘定日數時師不知虛實補瀉之理但於

起發之初使用補

內氣不足少食者用之尤當若內實便利能

食之人寧不黨邪為

乎非徒無益而又害之 痘瘡之出有輕有

重觀其形狀即可知之

如一痘便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半

重也出稀者輕裏外微

紅者輕外黑裏赤微重也外白裏黑者至重

也瘡端裏黑者加

者勢劇也青乾陷昏睡汗出煩躁熱渴腹

也瘡端裏黑者加

者勢劇也青乾陷昏睡汗出煩躁熱渴腹

脹喘喘大小便不通者困也善用藥者能使輕者易安重者不致大困斯可謂之十全矣

凡痘瘡疎則無毒密則有毒痘疎無毒者邪不勝正其氣和其勢順不須服藥痘密佈散邪正相持其氣病其

勢險此宜抑邪扶正使邪氣亟奪不爲正氣之賊痘稠密無縫正不

勝邪其氣乖其勢逆善治者什可救其二三不善治者束手待斃而

已故順者不必治逆者不可治險者貴治此以下專言險逆者之證

治也痘子輕者作三兩次出大小不一等其起發亦先後循次大

小分明不相連串顆粒

常大小便清潤此裏正無病大吉之兆不須服藥凡痘密

者多難起頂但欲皮厚有膿漿色以燈影之苟非皮薄水泡光潤雖

平亦無傷凡痘子出得稀疏者自然易發易靨不可妄治若瘡稠

密常患其發不能透宜細視之但紅活不甚長大者氣不足也用四

君子湯合勻氣散加燒人尿治之如癰腫色帶紅紫者血熱也用四

物湯失合消毒飲形加燒人尿治之如不潤澤而乾者此血弱也用

活血散加消毒飲與之如不起發不紅活平塌灰白者此氣血俱虛

也用于全大補湯并加燒人尿牛夢子與之如有青乾者內服快癰

湯形加燒人尿合奪命丹形與之外用四聖散症合臙脂塗法或用

胡荽酒形俱見或用水楊枯溶法務求光壯紅活而後已如中間有成

水泡者防其癢癩宜先并疎風瀉火使肌肉實不作癢可也十

全大補湯并加防風大乃子至之瘡子起發只以出勻為期不可

拘定日數癢出以漸其發亦以漸謂之通中若已一齊湧出便皮肉

虛腫一齊炊發者此表氣虛毒氣奔潰而出表虛不能收斂必生癢

癢或成潰爛急宜救表十宣散調無價散活血散合消毒飲相間服

之若出已盡當起不起或起不迭此表氣虛毒氣留伏壅遏而不出

必增煩躁腹滿喘促或發為癰毒急宜救裏十全大補湯合勻氣散

或參苓白朮散并無價散服之瘡至四五停住不甚起者少後力

而助之甲生黃白伍錢入參或參錢當歸鹿茸壹貳錢煎服或磨入木香少許兒大者倍之俟漿滿足而止

十宣散 見形 活血散 即芎歸湯 當歸 川芎 各等分

右為細末每服壹錢紅花湯調服

消毒飲 見形 十全大補湯 汗 勻氣散 見形

參苓白朮散 湯 無價散 劉醫

參耆四聖散 治痘瘡 出六七日不能長不生膿或癢塌

當歸 芍藥 炒黃 芎 各伍分 白朮 茯苓 紫草 如無紅花代之

木通 防風 各參 糯米 或 右水煎每服

胎元散 痘不起發不紅潤是血氣俱虛

胎元焙乾為末加麝香少許酒調服參伍分

獨參湯 治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清不滿或結痂遲

緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿水不乾或時作癢或畏風寒

用好人參壹兩生薑伍片大棗五枚水二鍾煎八分徐徐溫服嬰

兒乳母亦服

乾枯灰白紅紫青黯丹如將出成就之際却色淡不正者屬血虛宜

用補血藥當歸川芎白芍酒洗之類或加紅花如將成就之際

却色潔不立者屬熱宜用涼藥解毒升麻芩連桔梗連翹之類甚

者用犀角屑

如月後發諸症色仍不法治之

痘瘡之毒必氣以拘之血以濡之而後可得成熟也故於起發之時

光壯者氣有餘也肥澤者血有餘也血氣有餘表裏俱和不須服藥

如形長大而色枯燥者此氣至而血不榮也宜四物湯

失血

加入參

麥門冬色紅潤而形平陷者此血至而氣不充也宜四君子湯

不能食

加黃耆官桂川芎形平陷色枯萎者此血氣俱不足也宜十全大補

湯汗合無價散

倒磨

主之色灰白者氣虛也四君子湯加黃耆當歸

官桂色紅紫者血熱也四物湯加紅花地骨皮牡丹皮

凡痘瘡起發遲滯頭平色灰白者氣虛也其人平日食少脾胃不足

人參白朮散湯去葛根加桂十全大補湯汗去地黃加木香主之如

曾有吐瀉以致氣弱者四君子湯食不能合益黃散脾主之瀉未止者

四君子湯吞肉荳蔻丸泄利甚者陳氏木香散主之泄利若紅紫色

焮腫者血熱也四物湯失血合消毒飲見形加紅花外用臙脂塗法

見形鮮之乾枯者血虛也四物湯加人參麥門冬地骨皮外用臙脂

塗法水楊湯浴法灰白另立門在下卷起發之時根窠紅活形色潤澤者此

血隨氣行灌注諸瘡自然紅活肥澤不須服藥如雖起發乾枯無水

謂之不肥澤帶青紫黯色謂之不紅活其變為黑陷乃血虛也四物

湯失血加人參及麥門冬紫草紅花間進調無價散倒壓或吞服奪

命丹見形外用臙脂塗法見形

水楊湯 水楊柳五筋淨洗春冬用枝秋夏用枝葉剉斷用長流一

大釜煎六七沸先將三分中一分置浴盆內以手試不甚熱亦不

可太溫先服宜用湯藥然後浴洗漸漸添湯以痘起發光壯為度不拘數次

祛邪湯 痘號天花最忌諸穢臭惡血五六朝間痘本美麗鼎峻而

一時失防或觸於腥血或感於穢臭倏忽更變外宜祛邪湯浴之

而內服玉樞正氣丹可也 雞毛按細升麻 荊芥 木通

紫蘇 荔枝殼 水楊條 右用水煎濃去渣洗浴

玉樞正氣丹 玉樞正氣神功捷生地紅花併甘桔參耆須倍紅

扛蟬蛻防風蕤愛寬寅各相朝嫩桃杪五箇和薑甘草列煎濃投

酒服須臾不覺痘自還元吉

頂陷起發之時不徐不疾以漸長大尖圓磊落光壯堅實根脚紅活

此氣充足載血而行透徹諸瘡自然尖圓光壯不須服藥如雖紅活

頂平中陷不成尖圓色嫩皮薄不能堅厚其變為癢瘍為留伏壅遏

乃氣虛也四君子湯不能合勻氣散見形加黃耆官桂或入參白朮

散加黃耆官桂防風或調元湯大法加官桂防風白芷荆芥穗或

十全大補湯汗去地黃加防風白芷或十宣散見形皆可選用若瘡

皮薄色嬌淫淫如濕者此氣不勝血宜補氣涼血四君子湯四物湯

去川芎地黃加黃耆官桂防風荆芥穗如浮囊虛起殼中無水者此

氣不依血血不附氣其變爲癰瘍爲癰腫十全大補湯去白朮加大

力子連翹防風燒人屎痘瘡起發尖圓爲貴如四圍起中心平陷

者此有二腫有血化成水四圍高起心中略低凹者俗呼爲茱萸痘

此中氣不足發未透徹故耳能食者至養漿之時盡充滿而起矣不

能食者宜扶中氣人參白朮散主之有四圍沸起中心落陷無水猶

是死肉其形如錢宜急攻之若待漸變黑點不可爲矣此名鬼痘四

君子湯合九味順氣散加燒人屎或紫草飲出不或紫草飲子連進

服之外更用臙脂塗法見形出齊後痘有小孔自頂直下至腳不

黑不白與痘色相同名爲蛀痘皆因表虛而臙理不密成此證也失

於早治大泄元氣不起不發禍不旋踵急保甲元湯下生糯米川芎
肉桂丁香其孔自密甚為捷徑連進二三服必待孔閉而痘自起孔
若黑色則為下矣 頂陷色白皮薄晶光者氣虛也大下保元倍加
酒炒黃耆肉桂川芎丁香茯苓皮人乳好酒進之

九味順氣散又名勾氣散 白朮 白茯苓 青皮 白芷

陳皮 烏藥 人參各伍分 甘草炙或五分 木香壹分半

右剉細水一盞煎七分去渣溫服

紫草飲子 紫草茸 人參 白芍藥 蟬蛻 甘草 穿山甲炒

沙各 右剉細用水一盞煎五分作三四次溫服

內托散 治痘瘡毒根在裏頂陷灰白色不起發根窠不紅肉托毒

化立驗 人參 甘草 肉桂 白芷 白芍藥 川芎各壹分

黃耆壹兩 桔梗 防風各二兩 川當歸伍錢 木香貳錢

右煎水服 瀉加訶子肉肉豈薤 有癰減肉桂加紫葢酒炒黃

芩黃連牛蒡子之類

治痘場陷不起迴陽丹

此方用於四五朝前其効甚速若用於六七日後則噬臍矣製法
將臘月將生胞羊酒洗淨隨用黃麻纏攏一團把臘糟裹外置新
瓦上四圍炭火炙之俟其外糟焦了如墨樣削去其糟再焙乾另
爲末入官桂末丁香末各伍錢人參末壹兩木香末叁錢再研極
細升麻煎酒漿調服十歲以上服貳錢十歲以下服壹錢十五歲
以上服叁錢年多服多年少服少加減而用無不獲効若加大附
子壹兩去木香則爲附子迴生丹胞羊須預囑屠肆遇便收製若
特殺傷生大不祥

頂凸痘瘡起發有心中凸起四圍乾平無水者或裏紅外黑者此由
平日感受風寒皮膚堅木以致痘毒鬱而不散宜桂枝葛根湯
初熱

十宣散見形以散表邪外用水楊湯浴之
見前

四傍旋出小瘡聚成一片長漸成一塊此候最重宜以快癰湯合消毒

飲俱見加燒人尿服之更宜禁忌以防癰瘻之變

陷伏凡瘡瘡以起發光壯紅活肥澤為順若將起發之時中間有乾

黑不起者須急治之不可因循以致傳變加多不可救藥矣

瘡瘡內而不出謂之伏外而復入謂之陷瘡瘡黑陷當分四證

一則感風寒肌凝閉寒血凝而不行必身痛四肢微厥瘡點不長或

變黑色或青紫瘡疹此為倒伏也宜溫肌發散桂枝葛根湯初熱加

麻黃蟬蛻或以紫草飲熱吞奪命丹見外用胡夢酒噴之須令溫

散其邪然後熱氣復行則其瘡自長矣 二則毒氣太盛內外蒸燂

毒復人裏必心煩狂躁氣喘妄言如見鬼神大小便秘渴而腹脹此

為倒陷伏也病邪輕者宜利小便解毒連翹湯通關散世更甚者以

百祥丸牛李膏黑以瀉傷脫之毒令陽氣復還脾胃溫煖服之身

溫欲飲水者可治是脾強勝腎陷者當復出矣若加以寒戰身冷汗出耳尻反熱死然百祥九太峻今以宣風散熱發三乙承氣湯問便代之

外以水楊湯浴之見前三則內虛而不能使陽氣以副榮衛者出而

復沒癰點白色或黑色其入必不能乳食大便自利或嘔或厥此胃

虛而不出謂之陷伏也宜用溫中之劑令其胃暖榮衛復行則當自

出矣宜調元湯缺加丁香官桂理中湯世加黃耆官桂甚則陳氏木

香散利泄異攻散快出皆可用也外用胡荽酒現噴之或刺誤下之後

毒氣入裏而黑陷者則宜溫養而表出之先以理中湯溫其裏後

以桂枝葛根湯疎解於表也不出再加麻黃四則被髮室等雜穢

惡氣衝觸而黑陷者則宜熏解之內服紫草飲子視外用茱萸酒噴

之及甚陳熏法餘詳前章

茵陳熏法

用乾茵陳研末搗棗膏和丸如雞子大曬乾烈火燒煙熏之

人便通者則易實大便自利者則易虛雖四五日不便無憂也不能食者

聽其自便賴舊穀氣爲養至五日後則膿成毒化鮮利之劑可用也

能食者三日後不通不腹滿不裏急後重則亦不必攻之可用膽導

法便導導之不通以當歸丸便微令潤過使氣道升降無壅遏之患不

行安下凡能食者大便喜潤賴新穀以爲養而舊污之不留自然

臟腑流利血氣和平不可妄用溫補反增裏熱之證胃主腐熟水

穀大腸主傳送已化之物故其多少可以知人穀氣之虛實大便滑

澀可以知人臟腑之冷熱大便如常是亦瘡疹之一順也如起發之

時忽然泄瀉此宜急止之恐腸胃虛真氣脫也須辨冷熱虛實如瀉

而手足冷面色青白瘡不紅綻者冷證也理中湯丸薑朮丸俱益

黃散脾甚則陳氏木香散脾與攻散快皆可用也瀉下之物黃又

酸臭渴手足心熱面赤瘡紅綻熾發者熱證也黃芩湯利五苓散驚

酸臭渴手足心熱面赤瘡紅綻熾發者熱證也黃芩湯利五苓散驚

酸臭渴手足心熱面赤瘡紅綻熾發者熱證也黃芩湯利五苓散驚

主之脾胃怯弱精神慢而不食者爲虛當溫養之益黃散身熱中滿
渴而不食者爲實當清利之五苓散其人或熾氣自脫或因服寒藥
致令瘡毒陷入大腸瀉下如豆汁或便膿血或便黑汁口內臭氣唇
焦目閉加腹脹者必死之證方論詳泄瀉本門不二散治痘當
起脹灌漿時泄瀉不止以此止之只一服瘡如服此不已是元氣
已脫不可爲矣蓮肉炒去心壹兩真鴉片貳錢另研

右各取淨末和勻每服三四分米飲調下此方不但止瀉亦治
煩癢二證夫固大腸之滑脫易知也欬心火之浮游難知也

手足痘瘡起發欲透惟四肢稍遠難得均齊必脾胃素強能食多者
不須慮此若脾胃素弱又食少者手足上瘡常發不透蓋脾主四肢
脾虛則不能行其津液漑灌四肢所以發遲以補脾爲主快癍越婢
湯如不令透其後手足必作癍毒又手足瘡痘多發水泡者此肝乘
脾也先瀉肝羌活湯熱加柴胡後補脾人參白朮散去葛根加桂

如見而復隱起而復塌色紫黑者此腎乘脾不可治

快癰越婢湯

黃耆

白芍藥

桂枝

防風

甘草

炙

右剉細加生薑一片棗一枚水煎溫服不拘時

頭面而屬陽瘡疹亦屬陽以類相從故出現起發敗腐自頭面始
升生浮長陽之性也痘瘡起發頭面以漸腫大升生浮長之性不須
憂恐只要瘡子磊落紅活光壯肥澤待至成膿之後毒化結痂而腫
亦漸消矣如瘡結連通串模糊成餅者又要紅活潤澤以快癰湯消
毒飲此湯合而飲之或消毒化癰湯以解其毒更以甘桔湯此湯加牛
黃子相開與之以利咽喉寬胸膈令飲食無阻也又以神應膏護目
視若灰白青黃乾燥瘡面膚起者皆死證也其頭面腫有不閉目者
瘡淺而輕有閉目者毒深而重亦待瘡熟腫消而目自開若瘡未成
腫消目開者此陷也勿治

消毒化癰湯

升麻

柴胡

桔梗

甘草

龍膽草

牛蒡子

連翹 防風 蟬蛻 密蒙花

右剉細加淡竹葉十片水一盞半煎一盞去渣食後服

凡將起發頭面預睡者此時行疫癘之氣名大頭瘟其毒最酷急用

羌活救苦湯解之

羌活救苦湯 羌活 白芷 川芎 蔓荊子 防風 桔梗

大力子 黃芩 連翹 升麻 人中黃各等分

右剉碎加薄荷葉七片水一盞煎七分去渣食後溫服

痘疔痘疹之毒自內而出冲寒氣阻於皮膚理初出一點血乃身中

氣血被毒驅還現於皮膚之外或成紅者氣也成色者血也毒火太

甚煎熬氣血先至之氣則初出之時氣血相結腠理反閉毒不

得出未免復入於裏遂成陷伏時人以黑瘡子爲痘疔又曰兎痘者

深惡而畏之詞也此乃毒氣鬱遏非外感風寒內虛吐利雜氣觸犯

者可比古人立方如大小便秘腹脹煩燥者則下之但大小便秘者

則利小便解毒自利者以瀉膿血為順水穀為逆却不立方以毒雖

入腹皆瀉出也攻之則無所攻補之則不可補昏悶不醒者用龍腦

膏黑陷以去心中之邪枯黑不起者或內用無煩散例以解在裏

之邪或外用水楊湯見前四聖散痘疔臘脂塗法見形以解其表使

邪氣得出皆良法也為工者合下即下合利即利合發即發或解其

裏或解其表應變出奇勿泥常法可也

發痘痘瘡發痘亦與黑陷相類外出內入雖不同而毒氣壅鬱則一

也或發水疱或發血疱或赤或紫或黑但見此證十無一生然亦有

似是而非者不可不辨其人身上有瀝瘡或破傷瘡未痊或雖痊

癰疽尚嫩一旦痘出則瘡癰四圍痘必叢集者物從其類之理也發

生之後必然作痘者腐敗皮肉氣色先變宜與完膚有別也治此者

先以鍼刺破吮去惡血後以臘脂塗法見形合百花膏收膿傳之此

瘡又易作瘡起發之後當宜以茵陳熏法見前熏之勿令爪傷若被

力斗痘瘡