

本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃

本經

商陸

本經

狼毒

本經

防葵

本經

狼牙

本經

藺茹

本經

大戟

本經

澤漆

本經

甘遂

本經

續隨子

開寶

芎藭

本經

雲實

本經

蓖麻

唐本

常山蜀漆

本經

土紅山附

藜蘆

本經

○山慈石

參朮

木藜蘆

拾遺

附子

本經

天雄

本經

獨子

別錄

漏籃子

綱目

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟蒻

開寶
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經
不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經

山躑躅
羊不吃草附

芫花

本經

蕘花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蔯

本經

石龍芮

本經
胡椒菜

毛茛

拾遺
每薑附

牛扁

本經
風建草附

葶麻

圖經

格注草

唐本

海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

右附方舊一百三十四新四百九十五

譯名

民

本

將軍

當

水

參

吳

普

如

吳

普

弘

景

之號

當

取

其

效

也

果

曰

推

陳

文

新

如

生

黃

其

葉

四

四

相

富

高

三

尺

許

三

月

花

黃

五

生

果

錄

曰

大

黃

生

河

西

山

谷

及

隴

西

二

月

八

月

生

生

黃

其

葉

四

四

相

富

高

三

尺

許

三

月

花

黃

五

生

承

益

州

其

葉

四

四

相

富

高

三

尺

許

三

月

花

黃

五

承

益

州

其

葉

四

四

相

富

高

三

尺

許

三

月

花

黃

五

又

此

藥

五

生

河

西

山

者

雖

非

河

西

隴

西

好

者

今

本草綱目草部第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經下品

釋名黃良 本經將軍 當火參 吳普 吳普弘景曰大

之號當取其暖快也 杲曰推陳致新如 戴定禍亂以致太平所以有將軍之號

集解 采根火乾 普曰牛蜀郡北郡或隴西二月八月

生黃赤其葉四四相當莖高三尺許三月花黃五

月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾 弘景曰今

采益州北部汝山及西山者雖非河西隴西好者

猶作紫地錦色味甚苦濇色至濃黑 西川陰乾者

勝北部日乾亦有火乾者皮小焦不如西耐蛀堪

久此藥至勁利粗者便不中服 恭曰葉子莖並侶

羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦侶宿羊蹄大者乃如盤長二尺其性濕潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西謾矣藏器曰凡用當分別之若取和及深沈能攻病者可用蜀中侶牛舌片緊硬者若取渴洩駿快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青葉侶蓖麻大者如扇根如芋大者如筴長一二尺其細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰宋祁益州方物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以大者爲枕紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪卽古涇原
隴西地與別錄相合

正誤

頌曰鼎州出一種羊蹄大黃治疥癩甚効初生苗葉累年長大卽葉偕商陸而狹尖四月

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實加蕎麥而輕小五月熟卽黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰蘇說卽老羊蹄根也因其偕大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀偕羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根修治

雷曰凡使細切以文如水旋澆緊重者剉片蒸之從巳至未晒乾又酒臘水蒸之從

未至亥如此凡七次晒乾却酒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸 煑

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普曰神農雷公苦有毒扁鵲苦無毒李時之大寒元素

日味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸
煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒洗入陽明經
餘經不用酒果曰大黃苦峻下走用之于下必生
用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之
分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生
者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或
頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃
寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元
氣耗陰血故也之才曰黃芩爲之
使無所畏權曰忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟

本經

平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結

別錄

通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿

甄權

通宜一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘧

大瀉

諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿

元素

下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡

時珍

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚悲怒心下悸氣得消石紫石英莖仁療女子血

閉宗稟曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
衄也此乃邪熱因不足而客之故令吐衄以苦泄
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經
之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽門手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
曰瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘
在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致爲
痞滿又云濁氣在上則生腹脹是矣病發於陽而
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分
野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之
邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸
湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋
傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強
頌曰本草稱大黃推陳致新其効最神故古方下
積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用
也梁武帝因發熱欲服大黃幾僧坦曰大黃乃是
快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元
帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧
坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

附方

舊方四新

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之大黃二

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一

升熱服取利張仲景金匱玉函

吐血刺痛

川大黃一

兩為散每服一錢以生

地黃汁一合水

傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為

痞也大黃黃連瀉心湯主之大黃二兩黃連一兩

以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

熱病譫狂

川大黃

分作二次溫服

仲景傷寒論

傷寒發黃

方同上

炒微赤為散用臘雪水五升煎如

膏每服半匙冷水下

聖惠方

傷寒類要

腰

氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一

升入芒消一兩緩服須臾當利下

腳風氣

作痛大黃二兩切如碁子和少酥炒乾勿令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯經

方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一

二十丸○衛生寶鑑用皂莢熬膏和丸名墜痰丸

人名全真丸金宣宗服痰為百病百病惟水瀉胎

之有驗賜名保安丸痰為百病百病惟水瀉胎

前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入

砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二丸小病五六丸緩病七八十

丸急病一百二十丸溫水吞下即卧勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下糟粕次下痰涎未下再服王

隱君歲合四十餘斤愈男女諸病無極丸治婦人

疾數萬也養生主論男女諸病經血不通赤白

帶下崩漏不一腸風下血五淋產後積血癥瘕腹

痛男子五勞七傷小兒骨蒸潮熱等證其効甚速

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
用童尿一盞食鹽二錢浸一日切晒一分用醇酒
一盞浸一日切晒再以巴豆仁三十五粒同炒豆
黃去豆不用一分用紅花四兩泡水一盞浸一日
切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去
歸切晒爲末煉蜜丸梧子大每服五十九空心溫
酒下取下惡物爲驗未下再服此心腹諸疾備急
武當高士孫碧雲方也醫林集要
尤治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三九凡中
客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死
者以暖水或酒服之或灌之未知更服三九腹中
鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉卽
瘞此乃仲景方司空裴秀改爲散用不及丸也
圖經
本草腹中痞塊大黃十兩爲散醋三升蜜兩匙和
煎丸梧子大每服三十九生薑湯
下吐利爲度腹脇積塊風化石灰末半斤瓦器炒
一外臺祕要

炒熟入桂心末半兩畧炒下米醋攪成膏攤厚

之○又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同搗膏和貼之或加阿魏一久患積聚二便不利上搶

兩尤妙丹溪心法大黃白芍各二兩為末木龙梧子大每脾癖疳積

湯下四十九日三以知為度千金方不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋

內文武火熬成膏額瓦上日曬夜露三日再研用船上疏黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十

歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生冷魚肉只食白粥半月如一服不愈半月之小兒

後再服若不忌口不如勿服聖濟總錄無辜者大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微

朽即不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和置瓦盆中於大鑊內浮湯上炭火慢煮候至成膏

可左乃貯器中三歲見一服七九梧子大日垂服以下出青赤膿為度若不下或下少稍稍加九若

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可
用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物乳

母亦禁之一加木香
一兩半 崔知悌方 小兒諸熱 大黃煨熟黃芩各
兩為末煉蜜丸

麻子大每服五丸至十丸蜜湯下
加黃連名三黃丸 錢氏小兒方 骨蒸積熱 漸漸
黃連

大黃四分以童子小便便五六合煎取四合去滓
空腹分為二服如人行五里再服 廣利方 赤

白濁淋 好大黃為末每服六分以雞子一個破頂
入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便 相火祕結 大黃末一兩牽牛頭末半兩每服
三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服 劉 諸痢初起 大黃煨熟當歸各二三
錢壯人各一兩水煎服

河間保命集 取利或加檳 熱痢裏急 大黃一兩浸酒半日
忽喘 集簡方

悶絕 不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣山轉大絕
而復蘇名傷寒併熱霍亂大黃人參各半兩

水二盞煎一盞熱服
可安 危氏得效方 食已即吐 房中有火也大黃

水一升煮半升溫服 仲景金匱玉函方 婦人血癖 作痛大黃一兩酒

取利 千金翼 產後血塊 大黃末一兩頭醋半升熬膏九

久當下 千金方 乾血氣痛 錦紋大黃酒浸晒乾四兩為末

時酒化一丸服大便利一二行紅漏自下 婦人嫁

乃調經仙藥也或加香附 董氏集驗方 痛 小戶腫痛也大黃一兩酒二

醋塗之乾則 梅師方 濕熱眩暈 不可當者酒炒大黃為末

也 丹 小兒腦熱 常欲閉目大黃一分水三合浸

上乾即再上 姚和衆至寶方 暴赤目痛 四物湯加大黃酒煎胃