



吳氏醫學述第三種本草從新總目

卷一上

草部

山草類五十二種

卷一中

草部

芳草類三十二種

卷一下

草部

隰草類五十一種

卷二上

草部

毒草類三十一種

卷二中

草部

蔓草類二十八種

卷二下

草部

水草類七種

石草類六種

苔類

三種

卷三上

木部

香木類二十五種

卷三中

木部

喬木類二十四種

卷三下

木部 灌木類二十四種 苞木類四種

寓木類六種

卷四上

菓部 五菓類六種 山菓類一十四種

夷菓類九種 味類五種 蔬類五種

水菓類一十種

卷四中

菜部 葷辛類二十三種 柔滑類一十七

種 苽菜類七種 水菜類五種 芝栴

類三種

卷四下

穀部 麻麥稻類一十一種 稷粟類一十

六種 菽麥類一十一種 造釀類一十

六種

卷五上

金石部 金類八種 玉類三種 石類二

十六種 鹵石類一十一種

卷五中

水部 天水類二十三種 地水類二十三種

卷五下

火部五種 土部九種

卷六上

禽部 原禽類二十一種 水禽類七種

林禽類七種

獸部 畜類九種 獸類一十五種 鼠

二種

卷六中

蟲部

化生類五種

卵生類二十一種

濕生類四種

魚部

有鱗類一十三種

無鱗類一十種

鱗部

龍類四種

蛇類四種

介部

龜鼈類三種

蛤蚌類一十六種

卷六下

人部一十四種

吳氏醫學述第三種本草從新目錄

卷四上

菓部

五菓 水菓

山菓

夷菓

味類

蔬類

杏仁

杏子

巴旦杏仁

甜杏

白梅

白梅根

桃仁

桃花

桃葉

梟

桃栗

大棗

紅棗

梨膏

柿霜

木瓜

山查

小大

橘皮

廣皮

建皮

橘皮

青皮

橘葉

橘核

香櫟

香櫟

蜜萼

朱櫟

枇杷

枇杷葉

楊梅

石榴皮

石榴皮

酸石榴

銀杏

胡桃

油胡桃

榛

荔枝

荔枝

荔枝

荔枝

荔枝

龍眼肉

橄欖

榧子

松子

檳榔

檳榔

檳榔

檳榔

腹皮

子

枳椇子

落花生

川椒

椒紅

秦椒

白

椒

畢澄

吳茱萸

茶

瓜蒂

甜

西瓜

甘

蔗

白

白沙糖

石蜜

水糖

紫沙糖

蓮子

心

石蓮子

蓮

蕊鬚

藕節

藕粉

荷葉

菱

芡實

粉

勃濟

慈姑



吳氏醫學述第三種

門八周蘭九生庭

武原吳儀洛遵程輯

男

有榆蒼培同較  
有杜雋望

本草從新

菓部五菓水菓

山菓

夷菓

味類

齒類

瀉肺解  
肌潤燥

杏仁

以下五菓類

辛苦甘溫而利有小毒寫肝降氣

行痰解肌除風散寒利胸膈氣逆通大腸氣秘

東垣曰杏仁下喘治氣桃仁療狂治血俱治  
便秘當分氣血脈浮屬氣書便難而陽氣秘者

用杏仁陳皮脈沉屬血夜便難而陰血秘者

桃仁陳皮肺與大腸相表裏賁門在上魄門在

下為氣之通道故並與陳皮佐之潤燥消積

杏仁紫苑並能解肺鬱利小便

豆粉近治時行頭痛上焦風燥欬逆上氣

之則爛蜜炒研

含煩熱喘促其毒性又能殺蟲治瘡制錫毒狗

毒消狗肉積因虛而咳嗽便閉者忌之雙仁者殺

人去皮尖炒研發散連皮尖研得火良惡葛

根黃芩黃耆杏子酸熱有小毒損人孕婦忌

巴且杏仁甘平止欬下氣消心腹逆悶有濕

痰者勿服以其性滑也凡仁皆潤形扁皮白尖彎如鸚

鵡

潤肺下氣

肺 瀉腸斂

哥嘴者真

形圓皮黃尖直者名甜杏  
仁出山東河南不入藥

烏梅

酸澀而溫脾肺血分之菓瀉腸斂肺

肺欲收急

食酸以

止血涌痰消腫解毒生津止渴

時珍曰

收之冬而實於夏得木之全氣故最酸胆為甲木肝為乙木人舌下有四竅兩通胆液故食酸則津

生醒酒殺蟲治久嗽瀉痢

血痢尤良○梁莊肅公血痢陳應之用烏

梅胡黃連竈心土等分為末茶調服而愈曾魯公血痢百餘日國醫不能療應之用鹽梅肉一

枚研爛合蠟茶入醋服一啜而安

瘴瘧霍亂吐逆反胃下血血

崩安虬

厥仆虫上攻而眩

去黑痣蝕惡肉

痘愈後有

肉突起燒存性研末敷之一日減半兩日而平

病有當發表者太恣

酸收誤食必爲害

青梅薰黑爲烏梅

稻灰汁淋蒸

肥澤不蠹。大便不通氣奔欲死者烏梅。去

去

核微炒

白梅 酸澀鹹平功用畧同烏梅治瘰癧僵仆

牙關緊閉

取肉楷擦齒齦涎出即開蓋酸先入筋齒軟則易開若用鐵器攪開恐傷

其驚癇喉痺梅核膈氣

取半青半黃梅子每箇用鹽一兩淹一日夜晒

乾又浸又晒至水盡乃止用青錢三箇夾二梅

用一枚含之嚥汁入喉即消收一年

敷乳癰腫

毒刺入肉中

搗爛罨之即出瘡中

刀箭傷膚

搗

瀉破血  
潤燥

血割止

多食損齒傷筋

經曰酸走筋筋病無多食酸若過食而齒齲者

嚼胡桃肉

鹽浸為白梅

取大青梅以鹽汁漬之日晒夜漬十日成

以解之

矣久乃上霜故又名鹽梅

衣生黴點者梅葉

煎湯洗之即去清水揉梅葉洗蕉葛衣經夏不

脆有

驗

桃仁

苦平微甘苦以泄血滯甘以緩肝氣而生

新血

無已曰肝者血之原血聚則肝氣燥肝苦急急食甘以緩之

通大腸血

秘治熱入血室

衝脈

血燥血痞損傷積血血痢經

閉欬逆上氣

血和則氣降

皮膚燥癢

肌有肉凝

發熱如狂

若小腹滿痛小便不利者為畜血

若非血瘀而誤用之大傷

陰氣 泡去皮尖炒研碎雙仁者有毒不可用

香附爲使

通大泄

桃花 苦平下宿水除痰飲消積聚利二便療

蘇鶚杜陽編

風狂

杜陽編載范純佑女喪夫發狂閉之室中夜斷窗牖登桃樹食花已盡自是遂愈以

能泄痰飲滯血也。儒門事親載一婦滑泄數年百治不效或言此飲食有積也桃花落時以棘鍼刺取數十莠勿犯人手以麪和作餅煨熟食之米飲送下不一二時泄下如傾六日行至數百行昏困噤飲凉水而平

以攻決爲用但可施於氣實

有餘之證若無故而因陰百病美顏色諸謬說而服之爲害不小 三月三日採花揀淨以絹

豆發汗

袋盛懸簷下陰乾干葉者勿用

桃葉

苦平殺蟲發汗

凡傷寒風痺發汗不出以火燒地用水洒之布

乾桃葉於上厚二三寸席臥溫覆取大汗被中敷粉極燥便瘥凡麥麴蠶沙皆可如此法用

采嫩者名桃心入藥尤勝

桃子辛酸甘熱

微毒多食令人有熱生癰癰

五菓列桃為下有損無益以此與鼈

同食患心痛服白朮人尤忌之

桃梟

是桃子在樹經冬不落者正月採之苦微

溫有小毒辟邪祛崇

補腎

栗

鹹溫厚腸胃補腎氣

能解羊羶

小兒不可多食

生則難化熟則滯氣

補脾胃  
潤心肺  
調營衛  
和百藥

大棗

甘溫補中益氣滋脾土潤心肺調營衛緩

陰血生津液悅顏色通九竅助十二經和百藥

傷寒及補劑中加用之以發脾胃升騰之氣須

姜並行紅棗功用相倣差不及爾雖補中而

味過於甘中滿者忌之

甘令人滿大建中湯心下痞者減錫棗與甘草

同例。經言棗爲脾果脾病宜食之又曰脾病

人毋多食甘毋乃相戾耶不知言宜食者指不

足之脾也如脾虛泄瀉之類毋多食者指有餘

之脾也如實滿腫脹之類凡用藥者能隨其虛

實而變通之雖尋常品味必獲神功苟執而泥

之雖有良劑莫展其長故學者以格致爲亟也

凡風疾痰熱及齒痛俱非所宜小兒疳病亦禁