

金匱翼

4

上海文瑞樓印

金匱翼卷七目錄

咳嗽統論

冷嗽

熱嗽

鬱熱

飲氣

食積

燥嗽

虛寒

腎咳

失音

喘統論

痰實肺閉

水氣乘肺

寒邪入肺

令火燥肺

腎虛氣逆

胸喘

血積肝傷

嘔吐論

剛壯

清涼

消痰逐水

消食去積

行氣去風和胃

理中安虵

和導

益胃

泄瀉統論

溼瀉

寒瀉

熱瀉

久泄

食泄

酒泄

腎泄

殮泄

痢疾統論

寒下

和利


疎解

溫通

溫補

冷瀉

和養



金匱翼卷七

飼鶴山人尤在涇先生怡集

長洲後學徐錦炳南氏讀

咳嗽統論

經言五藏六府皆令人咳。蓋有自外而入者。風寒暑濕燥火是也。有自內而發者。七情飢飽勞傷是也。風寒諸氣先自皮毛而入。皮毛者肺之合。皮毛受邪。內從其所合則咳者。自外而入者也。七情飢飽。內有所傷。則邪上逆。肺為氣出入之道。故五藏之邪上觸于肺亦咳。此自內而發者也。然諸氣所感。有不為嗽者。病邪特甚。徑傷藏府。不留于皮毛。七情所傷。亦有不為嗽者。病邪尚淺。止留本藏。未即上攻。所以傷寒以嗽為輕。而雜病以嗽為重也。

咳嗽一症。其因實多。辨症不明。妄投希效。亦安賴有醫治哉。當按昔賢所述。如咳嗽有風寒。有大。有勞。有痰。有肺脹。風寒者。鼻寒聲重。惡風寒是也。宜發散行痰。又有咳喘聲啞。或咽痛遇冷則發者。此謂寒包熱也。解表則熱自除。肺中有痰者。遇冷亦發。宜解表豁痰。大鬱者。咳多痰少。面赤焦煩是也。勞者。盜汗出。痰多唾紅。作

寒熱是也。痰者。咳動便有痰。痰出咳止是也。肺脹者。動則喘滿。氣急聲重是也。丹溪已上數條。合而觀之。參之居養。合之氣體。雖有不中。亦不遠矣。

治嗽最要。分別肺之虛實。痰之滑瀉。邪之冷熱。及他臟有無侵凌之氣。六府有無積滯之物。虛者。人參黃芪之屬。補之。使氣充則藏自固。是者。葶藶杏仁之屬。瀉之。使邪去則肺自寧。痰滑者。南星半夏之屬。燥其濕。痰瀉者。瓜蒌杏仁之屬。潤其燥。寒者。乾薑細辛溫之。熱者。黃芩梔子清之。氣侵者。五味芍藥收其氣。使不受邪也。積滯者。枳實瓜蒌逐其客。使無來犯也。

冷嗽

冷嗽者。身受寒氣。口飲寒漿。得之。蓋肺主氣。外合皮毛。而其經內循胃口。故外內得寒。皆能傷之。經云。形寒飲冷。外內合邪。因而客之。則為肺咳是也。其症呼吸不利。嘔吐冷沫。胸中急痛。惡寒聲嘶。得溫則減。得寒益甚。

仲景小青龍湯散外寒。蠲內飲。麻黃芍藥乾薑炙甘草細辛

桂枝各三兩五味子半升半夏各半升右八味。以水一斗。先煮麻黃減二升。去上

沫。內諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。此散寒蠲飲之神劑。東垣云。肺寒氣

逆則宜五味子同乾薑治之。有疾者以半夏為佐。按金匱厚朴麻黃湯加厚朴石羔杏仁小麥減桂枝芍藥。聖濟乾薑湯加紫苑杏仁減芍藥細辛半夏外臺羊肺湯加款冬紫苑白前食茱萸減麻黃芍藥半夏。易簡杏仁湯加人參茯苓杏仁去麻黃。其乾薑五味甘草則四方如一轍也。蓋本一青龍而各有裁制耳。加減麻黃湯麻黃去節一兩桂枝炙甘草各半兩陳皮半夏各七錢杏仁五十箇去皮尖。
微炒另研右細剉每三錢紫蘇七葉生薑四片煎服。

三拗湯麻黃杏仁甘草各等分右以咀每服三錢生薑三片煎服微汗愈。深師有細辛外臺加桂枝名小投杯湯和劑加蘇子茯苓桑皮陳

皮名華蓋散。

聖濟飴糖煎飴糖乾薑炒一兩杏仁五十箇去皮尖右分二劑煎去滓入

錫糖乾薑末服。按咳嗽經年不愈餘無他症服藥無效者得三拗湯恒愈多用清涼屢發屢甚別無熱症者得錫糖煎遂差不可不知也。局方干麻黃杏仁甘草中加阿膠貝母桑葉知母款冬半夏蓋羅清潤于辛溫之內凡陰虛邪伏者服之最宜名款冬花散。

熱嗽

熱嗽有久暴之異。暴者時熱傷肺也。肺象金而惡熱。得之則脈數氣促。口渴胸膈不利。咽喉腫痛。子和云。熱乘肺者。急喘而嗽。面赤潮熱。手足寒。乳子每多有之。久者風寒不解。久而化火。肺受火邪。氣從火化。有升無降。其候咳唾痰濁。煩熱口渴。或吐膿血。甚者身熱不已。則成肺癆。

六味竹葉石膏湯

石膏煨

淡竹葉

桔梗

薄荷葉

木通

甘草

各一錢

水煎服

又治熱嗽。諸藥不效者方

人參

石膏

甘草

半夏

麥冬

知母

五

味

杏仁

枇杷葉

水煎服

按五味子治嗽。新病惟熱傷肺者宜之。若風寒所客。則斂而不去矣。久病氣耗者。非五味子不能收之。然熱痰不除。則留固彌堅矣。

紫苑丸

衍義云。

一婦人患肺熱久嗽。身如炙。肌瘦。將成肺癆。以枇杷葉木通

款冬花紫苑杏仁桑白皮各等分。大黃減半。各如常製。治訖。同為末。煉蜜丸。

如櫻桃大。食後夜臥。各含化一丸。未終劑而愈。此瀉肺中積熱之劑。

人參清肺湯和 治肺痿吐血年久勞嗽喘急坐卧不安 人參 炙甘草

阿膠炒 杏仁尖皮 桑皮 知母 粟殼去蒂蓋 烏梅去核 地骨皮各

分 每服三錢水鍾半薑一片棗一枚食後溫服

按此方治勞嗽最宜蓋以溫補虛損之陰以酸收散亡之陽也

元霜膏 治虛勞熱嗽咯血唾血神效 烏梅汁 梨汁 柿霜 白沙糖

白蜜 蘿蔔汁各四兩 生薑汁 一兩 赤茯苓末八兩用乳汁浸晒九次 款冬花 紫苑

並末各 右共入砂鍋內熬成膏丸如彈子大每一丸臨卧含化嚥下

定肺丸 款冬花 紫苑 知母 貝母 人參 炙甘草 桑白皮 馬兜

鈴 御米殼 五味子 麥冬 百部 烏梅肉等分 右為細末煉蜜丸

櫻桃大嚥化下一丸

直指人參紫苑散 治虛勞咳嗽 人參 五味子 紫苑茸 陳皮 貝母

紫蘇葉 桑白皮炒各一兩 白茯苓 二兩 杏仁 甘草炙各七錢五分 川芎 半夏麩

阿膠蛤粉炒 右咳嗽每服一兩水二鍾薑七片烏梅一個煎一鍾溫服

鬱熱嗽

鬱熱者。由肺先有熱。而寒復客之。熱為寒鬱。肺不得通。則喘咳暴作。其候惡寒。時有熱。口中乾。咽中痛。或失音不出是也。宜辛以散寒。涼以除熱。或只用辛散。使寒去。則熱自解。若遽以苦寒折之。邪氣被抑。遺禍不小。

本事利膈湯 雞蘇葉 荊芥 桔梗 牛蒡子 甘草 殭蠶 元參 各一兩

右為末。每服一錢。沸湯點服。日三。

方古庵云。肺主皮毛。人無病之時。榮衛周流。內氣自皮膚腠理。普達于外。一或風寒外束。則內氣不得外達。便從中起。所以大升痰上。故咳嗽。宜用辛溫。或辛涼之劑。以發散風寒。則邪退正復。而嗽止也。

飲氣嗽

飲氣嗽者。其症喘咳上氣。胸膈注悶。難于偃卧。許仁則云。由所飲之物。停滯在胸。水氣上冲入肺。便成咳嗽。此而不治。則為水氣。醫錄亦云。此症宜利水道。化痰下氣。不爾則成水。

溪師白前湯 白前 二兩 半夏 紫苑 各三大兩 大戟 七合 水一斗。漬一宿。

煮取三升。分作數服。

芫花散 芫花 乾薑 白蜜 等分

右用前二味為末。內蜜中攪令相和。微

火煎如糜。服如棗核一枚。日三夜一。備急方。用枳殼二兩炒。水煮去滓。內

白糖一斤。服如棗大。

葶藶大棗瀉肺湯 葶藶 不拘多少 炒令黃

右件細研。丸如彈子大。水三盞。棗十枚。

煎一盞。去棗入藥。煎七分。食後服。孫兆治一人吐痰。頃間已升餘。效不已。面

色鬱暗。精神不快。兆告曰。肺中有痰。胸膈不利。當服仲景葶藶大棗湯。一服

訖。已覺胸中快利。畧無痰唾矣。外臺用葶藶杏仁各一升。大棗六十枚。合

搗如膏。加蜜作丸。梧子大。桑白皮飲下六七十九。以大便通利為度。本事

棗膏丸。無杏仁。有桑白皮苦桔梗。棗肉丸。梧子大。每服五七丸。飲下。許叔微云。

余常患停飲。久漬肺經。食已必噎。漸喘。覺肺系急。服此良驗。

蘇子降氣湯 治年久肺氣咳嗽喘逆。上盛下虛。痰涎壅盛。胸膈噎塞。紫蘇

子炒半夏製各二錢半 前胡 甘草炙 厚朴薑汁炒 陳皮去白各一錢 當歸半錢 沉香

七分 水二鍾。生薑三片。煎至一鍾。不拘時服。虛冷人加桂五分。黃芪一錢。

一人疾嗽。脇下痛。以白芥子瓜蒌桔梗連翹風化硝竹瀝薑汁加蜜丸。噉化。茶

清下

按痰飲有寒有熱。凡咳而面赤。胸腹脇常熱。惟手足乍有涼時。其脈洪者。熱痰在胸膈也。宜寒潤清膈之劑下之。面白悲噫。脇急脹痛。脈沉細弦遲者。寒痰在胸腹。宜以辛熱去之。

痰熱久嗽。氣急胸滿。知母杏仁蘿蔔子貝母各二錢。生薑一片。水煎服。

玉液丸 治熱痰壅盛。咳嗽煩熱。寒水石燒令赤出火毒水飛過三十兩。半夏洗焙為末十兩。

白礬枯十兩 細研 右合研。麴糊丸。梧子大。每服三十丸。食後淡薑湯下。

治婦人形瘦。有時夜熱。痰嗽。月經不調。香附童便浸晒乾 瓜蒌中 青黛下。

右為末。薑汁蜜調。噲化豆大一丸。

食積咳嗽

食積咳嗽者。穀肉過多。停凝不化。轉為敗濁。隨呼吸之氣而上。溢入肺。肺者清虛之府。不能容物。則有欬而出之耳。王節齋云。因欬而有痰者。欬為重。主治在肺。因痰而致欬者。痰為重。主治在脾。但是食積成痰。痰氣上升。以致欬嗽。只治其痰。消其積。而欬自止。不必用肺藥以治嗽也。

瓜蒌丸 瓜蒌仁 半夏 山楂 神麴等分 右為末以瓜蒌瓤拌為丸竹

瀝薑湯送下。

元珠云。食積痰嗽。非青黛瓜蒌仁不除。其人面色青黃不常。或面上如蟹爪路。一黃一白者是也。又方 杏仁蘿蔔子各二兩為末。粥丸服。又方治食積痰嗽發熱。二陳加瓜蒌萊菔子山楂枳實神麴。

燥效

肺燥者。肺虛液少而燥氣乘之也。其狀效甚而少涎沫。咽喉乾氣哽不利。子和云。燥乘肺者。氣壅不利。百節內痛。皮膚乾燥。大便秘澀。涕唾稠粘。潔古云。效而無痰者。宜以辛甘潤其肺也。

延年天門冬煎 生天門冬煎汁一升 生地黄汁五升 橘皮 炙甘草 人參

二兩 白蜜五合 牛酥二合 白糖五兩 杏仁一升 貝母 紫苑 通草三兩 百

部 白前二兩 生薑汁一合 右以水六升。煮貝母等取二升五合。去滓入

天門冬。地黄汁煎減半。內酥蜜薑汁等煎。令可丸。取如雞子黃大。含嚥之。日

四五次。

杏仁煎

杏仁一升去皮尖

白糖

酥

生薑汁一合

蜜五合

貝母八合

研別蘇子一升研取汁

右先搗杏仁如泥。內後六味同煎如稠糖。取如棗大含

嚥之日三。

又有一種肝燥礙肺者。其症欬而無痰。脇痛潮熱。女子則月事不來。此不當治肺而當治肝。蓋本非肺病。肝血燥則肝氣強而上觸肺藏也。滋之調之。血液通行。乾效自愈。

千金豕膏丸

髮灰

杏仁熬令黃色

右二味等分研如脂。以豬膏和酒服如桐

子大三丸。日三。神良。

上清丸

清聲潤肺。止欬嗽。爽氣定神。

白沙糖

八兩薄荷葉

四兩柿霜

礪砂

寒水石

烏梅肉各五錢

片腦五分

右為末。甘草水熬成膏。和丸芡

實大。每一丸嚥化。

虛寒嗽

虛寒嗽者。其寒不從外入。乃上中二焦。陽氣不足而寒動于中也。或初雖起于八熱。因過服寒涼消尅。以致脾土受傷而肺益失養。脈微氣少。飲食不入者。急宜溫

養脾肺為主也

加味理中湯 人參 白朮 乾薑生 甘草炙 橘紅 茯苓 半夏 細

辛 五味等分 右咬咀每服三錢薑棗煎食前服戴元禮云飲水一二

口而斂止者熱嗽也呷熱湯而得停者寒嗽也治熱嗽以小柴胡加五味冷嗽以理中湯加五味皆以試之驗直指方理中圓加阿膠五味

濟生紫苑湯 治肺虛寒嗽喘急無熱症者紫苑洗 乾薑炮 黃芪 人參

五味子 鍾乳石 杏仁麩炒去尖 甘草炙各五錢 右咬咀每服四錢水一盞薑

五片棗一枚煎服

腎效

腎虛氣逆者腎之脈從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨腎中陰火上升入肺則效腎中陰水隨經入肺亦效內經云欬嗽煩冤者是腎氣之逆也又少陰所謂欬嘔上氣喘者陰氣在下陽氣在上諸陽氣浮無所依從故欬嘔上氣喘也水則濟生腎氣補而逐之火則六味都氣之屬引而下之又有一種少陰腎症水飲與裏寒合而作嗽腹痛下利者宜直武湯加減治之

真武湯 白茯苓 白朮 白芍 各一兩 熟附子 半兩 右剉散每錢半加生

乾薑細辛五味子各半錢薑三片食前煎服

咳嗽失音

咳而失音有新久虛實之異新者多實痰火閉鬱所謂金實不鳴也久者多虛肺損氣脫所謂金破亦不鳴也實者逐邪蠲飲易治虛者補肺養氣難治亦有肺已虛損而風寒未盡或痰火閉塞者則攻補俱碍其治尤難也

訶子散 治久嗽語聲不出

訶子肉 杏仁 各一錢炒 通草 半錢 分二服每服水二鍾薑三片煎一鍾食

遠溫服

一方訶子四个有桔梗一兩半甘草二寸

杏仁煎 治嗽失音不出 杏仁 三兩研泥 生薑汁 蜜 各一兩 木通 桑白皮

貝母 各一兩二錢 紫苑 五味 各一兩 水三升煎半升去滓入杏仁蜜薑汁再

熬成稀膏食後卧嚙化一匙

又方 皂角一握去皮弦子蘿蔔三个切片水一碗煎至半碗服之不過三服

能使語出聲

治盛寒失音不語咽喉痒痛 桂心 杏仁各一兩 為末蜜丸櫻桃大綿裹咽

津 戴云有嗽而咽痛失音多進冷劑而聲愈不出者宜生薑汁調消風散

少少進之或只一味薑汁亦得又云聲啞者寒包其熱也宜細辛半夏生薑

之屬辛以散之若痰熱壅于肺者壅空則鳴必清肺中邪滯用清咽益肺湯

主之

清咽益肺湯 桔梗二錢 炒山梔 黃芩 桑皮 甘草 前胡 知母 貝

母各一錢 水二鍾煎八分食後服

和劑數冬花散 治肺已虛而風寒未盡喘滿煩悶痰涎壅盛鼻塞流涕咽喉

不利 杏仁 阿膠炒 麻黃去根 半夏湯洗 款冬花 桑葉 知母

貝母各一兩 右吹咀每服二錢水一鍾薑三片水煎食前溫服準繩用炙甘草與半夏加一倍

喘統論

三因方云喘病肺實者肺必脹上氣咽中逆如欲嘔狀自汗肺虛者必咽乾無液

少氣不足以息也王宇泰云喘無無汗煩燥脈浮大者汗之喘而有汗腹滿脈沉

實者下之。又云喘而自汗。腹滿便閉。氣口脈大于人迎。下之無疑。外此則不宜輕下也。

欬嗽氣急。喉聲如鼾者為虛。喉中如水雞聲者為實。戴復庵云。有痰喘有氣喘。有胃虛喘。有火炎上喘。痰喘者。凡喘便有痰聲。氣喘者。呼吸急促而無痰聲。胃氣虛喘者。抬肩擗肚。喘而不休。火炎上喘者。乍進乍退。得食則減。食已復甚。大槩胃中有實火。膈上有稠痰。得食入咽。墜下痰涎。其喘即止。稍久食已入胃。反助其火。痰再升上。喘反大作。俗不知此。作胃虛治。以燥熱之藥者。以火濟火也。

痰實肺閉

肺虛如器而不容物。痰熱實之。則氣不得宣。呼吸壅滯。喘急妨悶。胸膈痞痛。徹背者。宜濟生瓜蒌實丸。此與水氣相似。但水即飲也。飲體稀而痰質稠。飲多寒而痰多熱耳。

濟生瓜蒌實丸

瓜蒌實

研

枳實

去瓢

桔梗

半夏

等分

右為末。薑汁打

糊為丸。如梧子大。每服五七十丸。食後淡薑湯下。

元戎葶藶大棗湯

葶藶

二兩炒紫
色研成丸

以水三升。大棗二十枚。同煮取二升。去