

傷寒緒論卷下

傷寒緒論卷下

長洲張璐路玉纂述

男 登誕先 參訂
伯飛疇

門人鄒廉鐸鶴坡較

乾嘔

乾嘔有寒熱中脘令陽氣蘊而不舒欲吐而不能吐也若有熱在內而嘔則或出酸水苦水痰食矣安有乾嘔之理哉故凡見乾嘔即為寒證無疑其太陽與少陽及水氣皆有乾嘔如太陽乾嘔則有頭痛發熱少陽乾嘔則有胸滿脇痛水氣乾嘔則有脇下引痛

若直中陰寒乾嘔則外無一毫表證必見下利清穀
及諸寒證也然太陽少陽水氣二者之乾嘔皆不離
乎寒也○傷寒表不解乾嘔身熱微喘或白利而欬
小青龍湯○汗出痞悶脇下引痛乾嘔短氣者十棗
湯○手足厥冷乾嘔及噦而煩滿者橘皮竹茹湯○
太陰腹滿乾嘔理中湯加橘皮半夏○少陰病三利
脉沉細乾嘔乾薑附子湯○乾嘔而煩厥逆無脉曰
通加猪膽汁湯○裏寒外熱脉微欲絕乾嘔通脉四
逆湯○膈上有寒飲乾嘔四逆湯加吳茱萸生薑○
厥陰乾嘔吐涎沫頭痛吳茱萸湯○溫病熱病時疫
乾嘔煩悶者黃連解毒湯○凡乾嘔表證及水寒留

飲與陰寒內拒治各不同也

腸鳴

邪氣內搏其飲則爲腸鳴雖有寒熱之不同無不因積飲所致下後身熱不陰心下痞鞭腹中雷鳴下利者瀉心湯選用若腹痛便秘勢必當下若小承氣加苓半木香薑汁虛加人參腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐者附子粳米湯

噦

噦者其聲濁惡而長有胃虛氣逆停飲虛實寒熱死生之辨凡傷寒邪未入府或其人本虛故攻其熱必噦言胃虛不能食之人誤用寒藥或飲冷水所致

理中湯加丁附渴而小便不利者加桂苓○傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈此熱氣壅鬱上下不通而噦也○有潮熱時時噦先與小柴胡湯加茯苓後與大柴胡湯○嘔噦手足逆冷橘皮半夏湯若胸滿虛煩橘皮竹茹湯○胃氣寒者理中湯加吳茱萸○噦不止橘皮半夏湯或橘皮竹茹湯去竹茹加乾薑桂心通草○溫病熱未除或重感暴寒或內傷冷物而噦者黃芩加半夏生薑湯加廣藿香葉橘皮○溫病有熱飲水暴冷作噦橘皮半夏湯或半夏茯苓湯並加蘆根茅根○熱病汗不出大癰發赤噦者死凡腹滿不尿脉散頭汗自瞪而噦者不治

●凡噦而二便不通者屬實扶麻逆由利為虛寒兼
嘔逆者為停飲然此二種則為胃氣垂絕之候多
難治若有疝瘕動氣又當別論不可忽也

噫氣

噫氣者胸中氣不交通也靈樞曰寒氣客於胃厥逆
從下上復出於胃則噫氣也●傷寒汗下後心中痞
悶噫氣不除者旋復代赭石湯

石頑治郭孝圣女年十七下月因隣家失火受馬
遂癸熱由利嘔逆不食或以傷寒治之熱嘔愈甚
更以滾痰丸下瀉糞三次而發一晝不語噫氣不
絕四肢逆冷不能動利諸醫咸不壞證以與承氣

下之而猶豫未決。邀余診之。六脉如絲。問之知灰
冷昏沉不語。已三日矣。此陽氣欲脫之兆。本營氣
入心而由汗發。熱馬則痰涎膈上而嘔逆。不食下
月本元大寒。何得誤與。癸表攻表。元氣大傷。致亦
此候。真似傷寒壞病耳。仲景云。傷寒發汗若吐。若
下。解後心中痞悶。噫氣不除者。旋復代者。名曰瀉王
之遂。与此湯連夜連煎。不時頻灌。至侵晨視之。喘
患以氣皆除。肢体温。和周身沾上有微似之汗。口
能飲。力佳。口不能言。口不能開。而一已入。轉其灰
三倍於昨矣。改用六君子一人而安。

証逆

直刀全用

白朮二三錢或附子理中湯其爲夾水勿視代脈爲
死證也。若往來寒熱而呃者是邪將入裏表不納
邪逆上衝激而然也。此屬少陽以小柴胡和之不應
加黃連乾薑桂枝。若氣自膈下直衝於胸脇間呃
逆者此爲肝腎虛寒之極而挾陰火上衝其脈必沉
細知不在胃也。病既下虛內已伏陰或誤用寒涼遂
至冷極於下追其相火土衝而爲呃逆真氣欲盡也
輕則附子理中加柿蒂薑汁重則四逆湯加丁沉香
赤者急投羌活附子散亦有得生者。口病入煩躁自
覺甚熱他人以手捫其肌膚則冷此無根失守之火
散亂而爲熱非實熱也。乃水底似火陰極似陽之假

原书缺页

白朮二三錢或附子理中湯其爲炙水勿視代脈爲
死證也。口若往來寒熱而呃者，是邪將入裏，裏不納
邪，逆上衝激而然也。此屬少陽，以小柴胡和之，不應
加黃連、乾薑、桂枝。口若氣自膈下直衝於胸膈間，呃
逆者，此爲肝腎虛寒之極，而挾陰火上衝，其脈必沉
細，知不在胃也。病既下虛內已伏陰，或誤用寒涼遂
至冷極於下，追其相火土衝而爲呃逆，真氣欲盡也。
輕則附子理中加柿蒂、薑汁，重則四逆湯加丁沉香。
赤者急投羌活附子散，亦有得生者。口病入煩躁自
覺甚熱，他人以手捫其肌膚則冷，此無根失守之火。
散亂而爲熱，非實熱也。乃水似火陰極似陽之假。

流清涕者必先發散爲主若寒熱邪欬嗽則痰匿
如膠金沸草散加減○熱邪傷肺而欬必咽膈腫痛
萎蕤湯加減○溫病熱病欬嗽黃芩白虎並加蘆根
竹葉若煩悶則涼膈雙解選用○大抵外感欬嗽當
以汗解然又有不可汗者經曰欬而小便利及數不
可發汗發汗則四肢厥逆又欬而發汗蹇而苦滿者
並宜小建中爲主若脉散者爲心火淫於肺金鬼賊
相刑必死也○凡欬嗽與傷寒無預者詳見醫鑑本
門

石頑伯包山金孟珍正月間忽欬吐清痰咽痛五
六日後大便下瘀晦血甚多延至十餘日請治於

余其脉六部皆沉弦而細此水令金寒之候也遂
與麻黃附子細辛湯其血頃止又與麻黃附子甘
草湯咽痛亦可而覺心下動悸不寧詢其受病之
由乃醉臥渴引冷飲所致改用小青龍去麻黃加
附子一劑悸即止欬亦大減但時吐清痰一二口
乃以桂酒製白芍人真武湯中與之欬吐俱止尙
覺背微惡寒倦怠更與附子湯二劑而安
又治禮科姜如農長媳患風熱喘欬無痰灼熱自
汗而懷妊七月先曾服和解清肺藥二十餘劑其
欬轉劇而胎漸不安余診之六脉皆濡大無力右
手寸關獨盛而濇曰此熱傷肺氣也反與和解藥

逼令汗出致肺氣益燥而欬逆愈甚不得已復用
苦寒折之則火轉鬱伏而不散也遂用大劑萎蕤
及川芎杏仁白薇甘草取萎蕤湯之半更以當歸
桔梗五味黃耆益氣生津固以斂肺二劑汗止欬
減胎亦向安更加生詞子皮一劑而痊

又治郁金嚴勞役後傷風白面胸滿痰結欬出青
黃涕大如彈丸此卽內經所謂勞風法在肺下也
與茯苓桂枝白朮甘草湯加薑汁竹瀝二劑而安
又治宋襄曰女素常多鬱乾嗽春間感冒風邪而
欬逆愈甚以小建中湯用蜜煎生薑加蜜煎栝皮
外邪卽解而欬不止次以逍遙散仍用蜜煎薑橘

傷寒經說卷一
更與異攻散用蜜製白朮薑橘而安

又治里醫吳佩玉次女傷風咳嗽先前自用疎風
潤肺止嗽之藥不應轉加嘔渴咽痛求治于余診
之六脉浮滑應指作半夏散與之三啜而病如矢
或問欬嗽咽痛而渴舉世咸禁燥劑而用半夏卽
効何也曰用藥之權衡非一言而喻也凡治病必
求其本此風邪挾飲上攻之暴迫故用半夏桂枝
以開通經絡迅掃痰涎兼甘草之和脾胃而致津
液風痰散而營衛通則咽痛燥渴自已設泥其燥
渴而用清潤滋其痰濕經絡愈困津液愈結燥渴
咽痛愈無寧字矣不獨此也近世治風寒欬嗽雖

用表藥必兼桑皮黃芩花粉甚則知槩之類少年
得之必種吐血虛損之根中年已後得之多成痰
火喘嗽之患然此輩之妙用在於預爲地步診時
泛謂陰虛防變不足之證初時元氣未衰服之邪
執暫伏似覺稍可久之真氣漸傷轉服轉甚安慮
其不成虛損耶及見吐血則不問何經府藏屬火
屬傷血之散結色之晦解痰之有無槩以犀角地
黃寒涼止截之劑投之致血畜成根向後或兩月
一月一發雖日服前藥不應矣凡此之類未遑枚
舉然必如是則病家任之不疑傍人目之爲神斯
所以聲名日著也嘗見一人患項腫發熱延傷寒

家視之則曰大頭傷寒以表藥發之并頭亦脹確
大頭無疑矣病家以其治之益甚另延雜證家視
之則曰濕熱痰火以裏藥攻之則頭與項前左牛
皆消但頂後右側偏腫則又確乎非大頭而爲雜
證矣病家又以腫在偏傍疑爲癰毒更延癰疽家
治之則曰對口偏疽以托裏敷外藥治之則氣血
益滯熱不得泄鬱遏竟成潰瘍矣本一病也治之
迥異證亦屢遷可見其病隨藥變之不誣耳第末
習所趨非此不足以入時何怪乎聖人性命之學
邇豈不返遂至若是耶

喘