

右為末豬膽汁丸和黍米大每服二三十丸白木湯送下 又云胡黃連丸十二粒白木湯下
五積丸 治小兒諸般疳積 丑頭末一兩黃連半兩陳皮一兩青皮半兩山查半兩

右炒焦黑色為末每用巴豆霜半錢煎藥末半錢宿蒸餅丸麻子大小兒二歲十九五更羹湯下
至天明大便秘泄為度溫粥補之未利再服三五丸

烏屋丸 丑頭末^三青皮^三史君子肉^半錢^七白燕莖^半錢^二鶴虱^錢五^錢蘆薈^錢一^錢燒紅^錢苦練根皮^五錢

右炒令焦黑色為末麴丸麻子大每三五十丸米飲送下食前量小兒大小加減

黃龍丸 三稜^三兩黑角莪木^三兩青皮^半兩山查肉^七錢半乾姜^七錢半

右用麴丸麻子大日晒乾食後羹湯下量兒大小加減

○烏犀黃龍間服食前服烏犀食後服黃龍

肥兒丸 治小兒疳積 蘆薈^研另胡黃連^三錢炒麴黃連^白木^山查^炒半兩^兩燕莖^炒二錢

右為末蘆薈和勻豬膽汁 粟米大每六十丸食前米飲下

疳黃積食 白木^黃連^苦參^山查^右為末麴丸麻子大食後白湯下十五丸

食傷胃熱重蒸 白木^一兩半夏^黃連^半兩平胃散^右用粥丸食後白湯下二十九

○心法附錄曰小兒疳病者小兒臟腑嬌嫩飽則易傷乳舖飲食一或失常不為疳者鮮矣疳皆
因乳食不調甘肥無節而作也或嬰幼缺乳粥飯太早耗傷神氣則疳之根生延及歲月五疳病
成甚者胸膈喘噓乳食直瀉腫滿下利腹脇脹疼皮發紫瘡肌肉光紫與夫疳勞渴瀉面稿色夭
骨露齒張腹硬不食者皆危篤矣凡此等類虛扁復生難施其巧

○子熱 炒芍藥^香附^滑石^一兩甘草^三錢黃連^二錢右作四服水一盞半生薑三片^{煎乳}

○風痰 南星^一兩切用白礬末半兩水泡一指^浸晒乾^研細入白附子^二兩

右為末飛白麴糊丸如芡實大每服一二十丸姜蜜薄荷湯化下

白附丸 牛膽南星一兩須用黃牯牛胆臘月粉南星親手修合風乾隔一年用牛胆湏入二三

大陳半夏半兩粉白南星一兩切作片用臘月水浸七日去水晒乾枯白礬二錢半

右為末宿蒸餅丸如梧桐子大用姜汁蜜湯送下有熱加薄荷葉

紫金丸 治小兒哮喘不止端午日修合 黑椒四十九粒浸透去皮研如泥次入人言一錢鵝管石一錢

右為末丸如黍米大朱砂為衣每一丸或二丸量兒大小空心冷茶清下當日忌生冷葷腥熱物

服藥病止後更服白附丸三五貼

○小兒腹痛多是飲所傷

白朮 陳皮 青皮 山查 神麴炒杏仁 麥蘖 甘草

受寒痛者加藿香吳茱萸有熱加黃芩

○小兒腹脹 蘿蔔子蒸紫蘓 乾葛 陳皮等分甘草減半食減者加白朮煎服

小兒好吃粽成腹脹疾用白酒麴末同黃連末為丸服之愈

又方 治小兒腹脹 茯苓皮 陳皮 赤小豆 蘿蔔子炒木通銍半木香二分甘草

右以咀姜一片煎服

○小兒吐瀉黃疸

三棧 莪朮 青皮 陳皮 神麴炒茯苓 麥蘖 黃連 甘草 白朮

右為末調服 傷乳食吐瀉加山查 時氣吐瀉加滑石 發熱加薄荷

○夏月小兒吐瀉用益元散錢氏五補五瀉之藥俱可用吐瀉腹痛吐乳調脾以平胃散入熟蜜

加蘇合香丸名万安膏用米湯化下

○夏月熱病六一散最妙

○小兒痢疾 黃連 黃芩 陳皮 甘草 右以水煎服 赤痢加紅花菔仁 白痢加滑石末

又方 治小兒食積痢

炒神麴 蒼朮 滑石 白芍 黃芩 白朮 甘草 炙陳皮

右以水煎下保和丸 一方加茯苓

○小兒赤痢壯熱用藍青梅汁每服半錢與之妙

○小兒黑班紅班瘡痒癢並宜用防風通聖散為末調服

○小兒口瘡 戴云謂滿口生瘡者便是 江茶 粉草 右為末敷之一方用黃丹

又方 苦參 黃丹 五倍子 青黛 右等分為末敷之

又方 青黛 芒硝 右為末敷口中

又方 黃柏 細辛 青鹽

右等分為末噙之吐出涎不過三日愈亦治大人 治胎毒口瘡五倍子黃丹甘草江茶芒硝等分為末敷之

○龜胸 蒼朮 酒栢 酒芍藥 陳皮 防風 威靈仙 山查 當歸 痢後加生芩

○小兒夜啼此是邪熱乘心 黃連 姜汁炒一錢半 甘草

右用竹葉二十片煎服 又方加人參二錢半作二服入姜一片煎

又法夜啼不止潛取捕鷄窠草一握置小兒身下

○小兒脫肛 戴云脫肛者大腸脫下之說 脫囊即外腎腫大

戴云脫囊者陰囊腫大墜下不收上之說 或云潰爛陰丸脫出

入方 木通 甘草 黃連 炒當歸 黃芩 右以水煎服

又方 治脫肛 用東北方陳壁土泡湯先熏後洗

又方 治脫囊 紫蕪葉莖為末乾傳如爛用香油調鵝翎刷 又用青荷葉包上

○小兒木舌 戴云木舌者舌腫硬不和軟也又重舌者亦是此類二者皆是熱病

入方 百草霜 芒硝 滑石 右為末酒調搗之 重舌用好膽礬研細傳之

○咯血 戴云咯紅者即唾內有血非吐血與咳血

入方 黑豆 甘草 陳皮 右煎服

○小兒尿血 甘草湯調益元散加升麻煎服尤妙

○小兒喫泥胃氣熱故也

入方 軟石膏 黃芩 陳皮 茯苓 白朮 甘草 右用水煎服

又方 膩粉一錢砂糖和丸如麻子大米飲下一丸瀉出土立瘥

○小兒解顱乃是母氣虛熱多耳 戴云即小兒初生小兒頭二骨未合而開者

入方 四君子與四物子母皆可服 有熱加酒炒黃芩連甘草生煎服外用帛束繫用白欬末傳之

○小兒吐蚘虫 以苦練根為君佐以二陳湯煎服

小兒冬月吐蚘多是胃寒胃虛所致錢氏白朮散加丁香二粒

錢氏白朮散 藿香 白朮 木香 白茯苓 甘草 人參 各一錢 乾葛 二錢

右為末每一錢至二錢水煎服 ○小兒口噤 治法用搐鼻 鬱金 藜蘆 瓜蒂 右為末水調搗之

○小兒禿頭 用白炭燒紅碎長流水令熱洗之內又服酒製通聖散除大黃而用酒炒入研為末

再用酒拌乾每服一錢水煎頻服 外又用胡荽子伏龍肝懸龍尾 即藥上 黃連 白礬為末油調傳

又方 松樹厚皮 燒灰 黃丹 水飛 寒水石 細研 白礬 粘 黃連 大黃 各半 白膠香 燕脂 輕粉 四錢 或

右為末熬熱油調傳瘡上須先洗了瘡痂傳之佳

又方 治小兒癩頭并身癩等証 松皮燒灰白膠香 枯礬 大黃 黃柏 右為末用熱油調敷

○小兒頭瘡 獵猪油半生牛熟雄黃 水銀等分 右研和勻洗淨傳瘡上

又方 川芎 酒片苓 酒芍藥 陳皮半兩酒白朮 酒當歸一兩半酒天麻 蒼朮

蒼耳七錢半黃柏 酒粉草四錢防風三錢右為末水盪起煎服日四五次服後睡片時

又方 單治頭瘡 松樹皮厚者燒灰二兩白膠香熟沸上二兩黃丹水飛兩白礬大飛兩黃芩 黃連 大黃各

蛇床子 寒水石三錢白芷 無名異炒少許木香少許痛者用 輕粉

右為極細末熬熱油調敷瘡上須洗淨瘡去痂傳之佳

又小兒瘡 猪牙皂角去胡椒皮 枯礬 輕粉 右為末樟腦燭油搭七日如櫻桃膿窠去椒

○小兒臍腫汁出

用枯白礬末付或黃柏為末付之 又小兒臍不乾 伏龍肝塗 或用枯礬煨過白龍骨等分付之

○小兒天火丹臍腹起者赤溜不妨 蚊蛭泥炒調付

○小兒赤溜 主熱傷血

用生芩木通荆芥苦藥帶表之類外以芭蕉油塗患處芒硝濃煎汁洗之 又方鷄子清調伏龍肝傳之

○小兒耳後月蝕瘡 黃連 枯白礬 右為末傳之

○小兒鼻赤 雄黃 黃丹 右同為末无根水調傳之 又蒼耳葉酒蒸焙乾為末調服最鮮

食毒 又鼻下一道赤者名曰蠱以黃連末付之

辛夷膏 專治小兒鼻流清涕不止

辛夷葉一兩洗淨焙乾細辛 木通 白芷 各半兩 杏仁一兩去皮研如泥木香半兩

右為細末次用杏仁泥羊骨髓猪脂各一兩同諸藥和勻於瓦石器中熬成膏赤黃色為度於地上放冷入腦麝各一錢拌勻塗顙門上每用少許塗鼻中

○小兒變蒸是胎毒散也 ○乳兒瘡疾瘡塊

川芎二錢 生芩 白芎一錢半 陳皮 半夏 炒芩一錢 甘草二分

右作一服姜三片就煎下甲未半錢 ○胎熱胎寒 新增

附諸方

釀乳方 楊氏方 鮮胎中受熱生下面赤眼閉不開大小便不通不能進乳食

澤瀉二兩半 猪苓 赤茯苓 天花粉 茵陳 甘草 各一兩 生地黃二兩

右咬咀每服二錢水一盞煎至半盞食後令乳母埋去宿乳却服

生地黃湯 楊氏方 治小兒生下遍體皆黃狀如金色身上壯熱大小便不通乳食不進啼叫不止此

胎黃之候皆因母受熱而傳於胎也凡有此證乳母宜服此藥并略與些兒服

生乾地黃 當歸 赤芍藥 川芎 天花粉 各等分 右咬咀每服五錢水一盞煎服

當歸散 楊氏方 治小兒胎中受寒生下再感外風面色青白四肢厥冷大便青黑及腹疼盤腸內吊

病並皆治之 當歸 炒劉微 黃耆 蜜炙 細辛 黃芩 龍骨 細研 桂心 赤芍藥 各半兩

右為末每服以乳汁調下一字日三服看兒大小加減

釣藤膏 楊氏方 治內吊腹痛 沒藥 乳香 銼三木香 姜黃 各四錢 木鱉十一箇

右先將後三味為細末同煎二味拌和煉蜜成劑狀沙罐內量兒大小加減煎釣藤湯化下 次服麝香散

魏香散 錢氏方 蓬莪朮 半兩 真阿魏 一錢

右先用溫水化阿魏浸蓬莪朮一晝夜焙乾為末每服一字煎紫蘆米飲空心調下

胎寒傷氣痛 楊氏方

方用洗藥乳香各少許研細用木香一塊於乳鉢內磨水一盞調乳香沒藥末煎數沸服之立効

茴香散 宣明方 治小兒盤腸氣痛

茴香炒木香 黑附子 金鈴子 去核 蘿蔔子 炒 枳榔 破故紙 炒 白豆蔻 煨各等分

右吹咀每服二錢水盞半入鹽煎服

木香散 經濟方 治小兒盤腸氣痛不已面青手冷日夜啼叫尿如米泔

川練子 二箇去皮核用已豆十五粒 木香 黃史君子肉 延胡索 茴香 各一錢

右同為末清米飲空心調下量兒大小服之

勻氣散 治氣滯不勻宿食不消心腹刺痛嘔吐惡心調脾胃進飲食

丁香 檀香 木香 白豆蔻仁 各四錢 藿香 甘草 各八錢 沉香 三錢 陳皮 四錢

右為末研細用鹽湯調不拘時候

○ 臍風撮口 新增

附諸方

宣風散 治初生小兒臍風撮口多啼不乳口出白沫 全蝎 二十一箇頭尾全者去毒用好酒塗炙為末 麝香 別研

右同和為細末用半字金銀煎湯調下

辰砂殭蚕散 治小兒臍風撮口 辰砂 白殭蚕 直者去絲炒一錢 蛇蛻皮 一錢炒麝香半分別研

右為細末少許用蜜調傳唇口

治撮口 張氏方 治小兒斷臍為風溼所乘或尿在抱裙之內遂成臍風面赤喘急啼聲不出 名曰撮口並皆治之

赤脚金頭蜈蚣 一枚 蝎稍 四尾 姜蚕 七箇 瞿麥 半錢

右為末先將鵝毛管吹藥入鼻內使嚏噴啼哭為可醫後用薄荷湯調服之

定命散 陳氏方 治因剪臍傷於風溼致令唇青撮口 赤脚蜈蚣 半條 川烏頭 三箇 麝香 少許另研

右為末和勻每服半字金錢薄荷湯調下

治撮口 楊氏方 用白姜蚕為末蜜調塗口唇內即瘥 白姜蚕要自死者

治撮口 聖惠方 用牛黃一錢研竹瀝一合調勻滴入口中

一方 取活蝎虎一箇 江蘇名 裝內硃砂細末瓶內封口食砂月餘取出其身 赤色陰乾為細末每服一二分酒下大效

一方 用川山甲尾上甲三片羊油炙黃色蝎稍七箇共為極細末用人乳汁調塗乳上令兒吮之

用厚衣包裹須臾小兒冷汗出愈

一方 小兒落胎之時視其臍軟者無臍風即不須治臍硬直者定有臍風速用簪尖於臍根傍刺

破一二處入射香末少許炙三壯後無臍風

又方 同前 珍珠 四十九粒 白礬 飛過 蛤粉 黃丹 血竭 各五分 棗貓兒 飛或青灰色或子大頭上有兩角赤上有之陰乾三枚無此味亦可

右六味為細末凡人家新生小兒綿裹臍帶離肚三六寸處先用軟線綰住却於線外將臍咬斷

片時去線待血流盡用鵝翎管送藥一二分入臍大孔內 近肚處臍有孔一孔大 以手指輕輕揉散艾炙臍

頭三炷結作紵絡軟帛腰裹切不可常時揭看待臍落去自無風矣此方萬不失一 又云臍硬

直者宜用此法臍軟者不必用此法

一方 兒初生七日若有臍風必自發出青筋一道行至肚却生兩岔待行至心不治必死知者常

視其青筋初發速照青筋頭上灸三炷或行至生兩岔處亦照兩岔頭上截灸六炷青筋自消 兒心活矣

一方 小兒初生七日急患臍風撮口百無一活父母坐視其死而無救良可憫哉一秘法極有神

驗世罕知之凡兒患此者齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿裹手指輕輕擦破

即開口便安不用服藥

○鵝口口瘡 新增

附諸方

保命散 治小兒鵝口 白礬煨一錢馬牙硝五錢朱砂水飛一錢

右為細末每用一字取白鵝糞以水攪取汁調塗舌上用天南星末醋調貼脚心又有用吳茱萸末米醋調塗亦可

又方 用巴豆一粒去殼搗爛黃丹少許和捏餅外用紙獲貼眉心立止

真黃散 治小兒走馬疳

鷄腔瞋黃皮不以多少油燈上燒存性研細末入黃栢枯礬射香一字用米泔水攪口內貼

立効散 同前 青黛 黃栢末 白礬煨五倍子末各一錢 右為細末用米泔水攪口內貼

牙疳散 珍珠七箇銅青一分白礬煨三錢千里沉石灰半錢 右為細末用米泔水攪口貼

一方 治小兒牙疳 用白礬裝於五倍子內合燒過為末貼之 ○重舌木舌 新增

附諸方

青液散 治嬰孩小兒鵝口重舌及口瘡 青黛一錢龍腦一字樸硝一錢

右為細末用蜜調鵝翎少許付上

一方 治小兒舌下生舌名曰重舌 楊氏方 用針刺去惡血即愈

治小兒重舌 千金方 用竹瀝清黃蘗無時點舌上亦有用真蒲黃塗亦可

一方 治小兒舌腫塞口欲滿者 用紫雪一分竹瀝半合細研和勻頻置口中以盡為度

○胎驚夜啼 新增

附諸方

一方 治小兒在胎中受驚故生未滿月而發驚 湯氏方

卷三十一 小兒門

右為末每服二錢水半盞姜三片薄荷一葉煎服

神仙黑散子陳氏方治小兒變蒸與傷寒相似者當詳其証若上唇中心有白點子者為變蒸此藥宜服

麻黃 大黃 杏仁 和皮各一錢

右燒灰存性為末每服一字水半盞煎服抱男於溫暖處連進之有微汗身涼即瘥

生犀散 骨蒸肌熱瘦悴頰赤口乾日晚潮熱夜有盜汗心煩熱

生犀剉末 地骨皮 赤芍藥 柴胡 乾葛各一兩 甘草二兩

右每服三錢水一鍾煎半鍾食遠溫服 ○丹毒蘊熱新增

附諸方

四順清涼飲子和劑方治一切丹毒積熱壅滯咽喉腫閉方見大門

牛黃散和劑方治五種丹毒 鬱金 桔梗去芦 天花粉 甘草 葛粉各等分

右為末每服一錢薄荷湯入蜜調下

白玉散錢氏方治赤遊丹腫 白芷一兩 寒水石二兩

右為末米醋調付患處或腫至外腎有破處只用水調

生料四物湯湯氏方治血熱生瘡遍身腫痒 生乾地黄 赤芍藥 川芎 當歸去芦此本方防風續加各等分 黃芩減半

右咬咀每服三錢水一盞煎服

防已散湯氏方治小兒伏熱毒之氣遍身赤腫入腹入腎切防其殺人

漢防已半兩 樸硝 犀角 黃芩 黃耆 川升麻各二錢半

右咬咀每服三錢水一鍾加竹葉同煎半鍾溫服

漏芦散湯氏方治五腫丹毒并諸瘡癰

漏蘆 麻黃去根節連翹 川升麻 川芒硝 黃芩銹 白欬牝 甘草二錢半 川大黃一兩

右咬咀每服二錢水一盞煎服

一方 治丹毒發作恐其入腹一時無藥 急以針於紅點處刺出惡血使毒於此而散

一方 治走馬火丹 用景天一名慎火草一名仙指甲不拘多少搗爛取汁塗之即効

土黃散 治赤流丹毒 先用小針刀子刺去流頭赤暈惡血毒汁次用 土硝一兩大黃末一兩

右二件相合新汲水調拌勻用鷄翎蘸時時塗掃

伏龍肝散 應驗方 治赤腫赤毒火毒走注 伏龍肝不拘多少用鷄子清調敷赤腫處大効

升麻飲 經驗方 治小兒一切丹毒遍身壯熱煩渴 升麻 黃芩 大黃銹 麥門冬去心 葛根 樸硝

右為末和勻熟水調下半錢或咬咀作一服白水煎服

五福化毒丹 和劑方 治小兒蘊積熱毒驚惕狂燥頰赤咽乾口舌出瘡夜卧不寧遍體多生瘡癤

玄參水洗 桔梗銹 二白茯苓二錢 人參去芦 牙硝各一錢 甘草炙七分半 麝香二厘半

右為末煉蜜丸如鷄頭大金銀箔為衣薄荷湯化下一丸

消毒犀角飲 和劑方 治大人小兒內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚遍

身風疹癰毒赤痛及瘡癤已出未出不能快透並皆治察小兒疹痘欲出已出熱尚未解急進此

藥三四服快透消毒應手神効

鼠粘子四錢微炒 荆芥 甘草各一錢 防風去土 一方加黃芩一錢 犀角銹五分 如無以升麻代之

右用水一鍾煎至半鍾服

牛黃丸 聖惠方 治小兒心經積熱兩頰紅如塗胭脂手足常熱口乾燥

○上焦熱壅 牛黃一錢 天竺黃二錢 鬱金三錢 大梔子四錢

右除牛黃天竺黃二味另研外再同四味研極細煉蜜為丸一周兒黃米大服三十九乳下三歲
兒黃豆大服三十九薄荷湯下

生地黃

木通

甘草

各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾

竹葉十片煎至半鍾

溫服

大連翹飲

治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則溢

盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺

蘊熱客熱寒邪風邪胃入肺心將受之心不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通榮

衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生啼唾稠膩或須在表裏俱得

其宜驚風悉能散之疾熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

川當歸

防風

黃芩

各二錢

柴胡

甘草

各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾

竹葉十片煎至半鍾

溫服

治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則溢

盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺

蘊熱客熱寒邪風邪胃入肺心將受之心不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通榮

衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生啼唾稠膩或須在表裏俱得

其宜驚風悉能散之疾熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

川當歸

防風

黃芩

各二錢

柴胡

甘草

各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾

竹葉十片煎至半鍾

溫服

治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則溢

盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺

蘊熱客熱寒邪風邪胃入肺心將受之心不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通榮

衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生啼唾稠膩或須在表裏俱得

其宜驚風悉能散之疾熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

川當歸

防風

黃芩

各二錢

柴胡

甘草

各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾

竹葉十片煎至半鍾

溫服

治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則溢

盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺

蘊熱客熱寒邪風邪胃入肺心將受之心不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通榮

衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生啼唾稠膩或須在表裏俱得

其宜驚風悉能散之疾熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

川當歸

防風

黃芩

各二錢

柴胡

甘草

各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾

竹葉十片煎至半鍾

溫服

治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則溢

盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺

蘊熱客熱寒邪風邪胃入肺心將受之心不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通榮

衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生啼唾稠膩或須在表裏俱得

其宜驚風悉能散之疾熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

川當歸

防風

黃芩

各二錢

柴胡

甘草

各一錢

一方加黃芩二錢

右用水一鍾

竹葉十片煎至半鍾

溫服

治小兒心經邪熱心與小腸受感乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫熱則溢

盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而察者疎急有之矣一十五味加湯使用纔覺

蘊熱客熱寒邪風邪胃入肺心將受之心不受觸傳于小腸或閉或泄或赤或白淋瀝不通榮

衛不順壅之作疾其發多端以至膈熱眼目腫赤唇口白瘡津液不生啼唾稠膩或須在表裏俱得

其宜驚風悉能散之疾熱亦自消除連翹之功可謂大矣

連翹

瞿麥穗

滑石

車前子

牛旁子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

前胡上錢杏仁去皮尖熬炒桔梗各二錢人參三錢甘草炙二錢

右每服三錢水一鍾煎半鍾食後溫服

天竺黃散 涼膈退潮熱

天竺黃七分大黃 蟬蛻各三分白殭蠶二分川芎活 全蝎去毒甘草各五分

右為細末每服一錢麥門冬煎湯調下

辰砂湯 退虛熱和胃進飲食去心驚邪熱 白芍藥 人參 甘草炙茯苓一錢硃砂五錢石蓮肉五錢

右為末次入硃砂研勻每服五分薄荷湯調服

甘露飲 鮮五毒治煩熱 寒水石 石膏各一兩甘草半兩炙

右為末如諸解毒氣用生薑自然汁調服傷寒時氣作熱發狂新汲水滴薑汁調服

瀉青丸錢氏方治小兒肝經風熱目赤腫痛

當歸 龍膽草 川芎 山梔子 大黃溫紙裹煨羌活 防風各二錢半

右為末煉蜜如鷄頭大竹葉沙糖湯化下一丸

三黃丸 全嬰方治小兒諸熱兼治身黃黃疸衄血便血 黃連去鬚黃芩 大黃各一錢半

右為末滴水為丸茶清下三五十丸

地膚子湯千金方治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲便則澁痛不出出少癢血須臾復出

地膚子 瞿麥 知母 黃芩 枳實 升麻 葵子 猪苓各六分海藻 橘皮 通草各三分大黃一分

右用水一盞煎至半盞去渣溫服

石常散活幼方治小兒熱淋沙淋石淋 石常 海金沙 木通 滑石各一錢

右用水一盞煎至半盞去滓不拘時溫服

足平藥心去付餘

八正散 治小兒心經蘊熱臟腑秘結小便淋瀝方見大類

梔子仁散湯氏方 治小便不通心神煩熱 梔子仁五枚 荖根 冬葵花各半兩 甘草炙一錢半

右為末每服二錢煎服

勻氣散御藥院方 治小兒脾肺氣逆喘嗽面浮胸膈痞悶小便不利

桑白皮二兩 陳皮去白一兩半 桔梗炒一兩 甘草炙一兩 藿香葉半兩 木通四兩 赤茯苓去皮一兩

右以咀每服三錢水一盞姜二片煎半盞溫服 ○中惡天吊新增

附諸方

藶合香丸和劑方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛方見氣滯

辟邪膏楊氏方 治小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死凡腹大而滿診其脈緊細而微者緊大而浮

則死急服藶合香丸再以皂角末搗鼻次服沉香降氣湯加人參茯苓不愈進以辟邪膏無不効

降真香 白膠香 沉香 虎頭骨 鬼白 龍膽草 人參 茯苓各半兩

右為末入雄黃半兩射香一錢煉蜜為丸乳香湯化下及令兒帶燒卧內尤妙

沉香降氣湯方見氣滯

九龍控涎散楊氏方 治小兒蘊熱痰塞經絡頭目仰視名為天吊

滴乳香一錢 天竺黃二錢 雄黃二錢 膽茶二錢 白礬一錢 甘草二錢 荆芥穗一錢 萊豆一百粒 赤蜈蚣二條

右為末每服半錢至一錢煎人參薄荷湯下

釣藤散湯氏方 治小兒天吊潮熱

釣藤 人參去芦 犀角屑各半兩 全蝎二錢半 甘草炙一錢一分半 天麻二錢半

右為末每服一錢煎至半盞溫服