

辽宁省 医院制剂规范

1982年版

辽宁省卫生局编印

目 录

中 药

第一章 散 剂

一效散	2
八厘散	2
小儿牛黄千金散	3
小儿消化散	3
小儿消食散	4
小儿清肺散	4
口腔溃疡散	4
止痒散	5
牙痛散	5
乌连散	6
水调散	6
立止头痛散	6
平金散	7
甘枳散	7
回阳玉龙散	8
诃子散	8
收敛生肌散	8
金玉散	9
驱蛔散	9
活血散	10
胃苓散	10
降糖散	10
健胃舒郁散	11
保婴散	11
贴喉异功散	12
消炎散	12

涌泉散	13
顿咳散	13
脚气散	13
黄水疮药	14
接骨散	14
清热散	15
理脾散	15
提毒散	16
解热散	16
解热肺炎散	16

第二章 丸 剂

山楂降压丸	20
化积丸	20
丹参安神丸	20
开郁顺气丸	21
风湿立效丸	21
风湿止痛丸	22
风湿祛痛丸	22
白带丸	23
加味香连丸	23
加味麻杏止咳丸	24
加味银翘解毒丸	24
归脾摄血丸	24
甲囊丸	25
红元丸	25
红白痢症丸	26
血府逐瘀丸	26
朱珀丸	27

阴挺丸	27
行瘀丸	28
赤丹丸	28
补正续骨丸	29
补虚固肾丸	29
苍耳丸	30
肝得生丸	30
肝得宁丸	30
扶脾丸	31
攻癆丸	31
固肾丸	32
定喘丸	32
冠心丸	33
活血丸	33
活血化瘀丸	34
首乌降压丸	34
降脂丸	34
独胜丸	35
香砂养胃丸	35
脉管炎丸	36
烂积丸	36
益气清金丸	37
益肾丸	37
消瘰丸	38
宽中朴叩丸	38
强肾丸	39
强肝丸	39
清热安神丸	40
跌打丸	40
跌打损伤丸	41
温经丸	41
喉咽止痛丸	42
琥珀养心丸	42
雄黄解毒丸	43
舒筋健骨丸	43
锦灯喉症丸	44
解热清心丸	44
槐椿止血丸	45

第三章 膏 剂

生肌玉红膏	47
生肌象皮膏	48
归蜡膏	48
红药膏	49
灼伤膏	49
苦酒膏	50
明雄膏	50
独角莲膏	51
烫伤膏	51
烧伤膏	52
银朱膏	52
溃疡膏	53
紫草膏	53
湿疹软膏	54

第四章 酒剂、酊剂

牙痛水	56
参芪精	56
制癣止痒酊	57
精经性皮炎药水	57
落新妇活络液	58
癣药水	58

第五章 冲 剂

止咳喘冲剂	60
枇杷露冲剂	61
胃灵冲剂	61
降脂冲剂	62
桔贝半夏冲剂	62
感冒冲剂	63

第六章 片 剂

小儿金丹片	64
三黄消炎片	65
上清喉片	65
止血片	66

止痢片	66
生血片	67
灭敌刚片	67
关节止痛片	68
安胃片	68
抗流感片	69
抗感冒片	69
首乌强身片	70
益肾健脑灵片	70
硬伤片	71
溃疡灵片	72

第七章 注射剂

元胡注射液	74
丹皮注射液	75
半夏注射液	76
当归注射液	76
热痛宁注射液	77
苦参注射液	77
复方川芎注射液	78
复方地肤子注射液	79
复方板兰根注射液	79
复方益母草注射液	80
茵陈注射液	81
柴胡注射液	81

黄芪注射液	82
蒲地兰注射液	82

第八章 糖浆剂

小儿肺炎糖浆	85
止咳糖浆	85
升麻糖浆	86
白屈菜糖浆	87
灵芝糖浆	87
利肝糖浆	88
肝炎糖浆	88
复方丹参糖浆	89
复方灵芝糖浆	90
养血安神糖浆	90
黄精镇静糖浆	91
黑参糖浆	92
紫草糖浆	92
喘咳糖浆	93
稀五糖浆	93

第九章 其它制剂

止痢宁胶囊	95
苍耳子油	95
核桃馏油	96
紫草油	96
热伤成膜剂	96

西 药

第一章 灭菌与无菌制剂

一、注射剂	99
葡萄糖注射液	104
葡萄糖氯化钠注射液	106
氯化钠注射液	107
氯化钾注射液	108

氯化钙注射液	109
复方氯化钠注射液	110
复方枸橼酸钠注射液	113
枸橼酸钠注射液	115
盐酸普鲁卡因注射液	117
盐酸地卡因注射液	118
碘化钠注射液	119
碘注射液	121

甘露醇注射液.....	122	浓薄荷水.....	162
碳酸氢钠注射液.....	123	二、溶液剂.....	163
硫酸镁注射液.....	124	过氧乙酸溶液.....	164
乳酸钠注射液.....	126	稀盐酸溶液.....	165
维生素 C 注射液.....	127	盐酸普鲁卡因溶液.....	165
过氧化氢注射液.....	128	硫酸镁溶液.....	166
二、眼用溶液.....	129	碘化钾溶液.....	167
硼酸洗眼液.....	135	氯化钙溶液.....	168
碳酸氢钠洗眼液.....	135	复方碘溶液.....	169
硫酸阿托品滴眼液.....	136	水合氯醛溶液.....	170
金霉素滴眼液.....	138	氯化钾溶液.....	172
硝酸毛果芸香碱滴眼液.....	139	硫代硫酸钠溶液.....	172
水杨酸毒扁豆碱滴眼液.....	141	溴化钾溶液.....	173
氢溴酸后马托品滴眼液.....	142	复方硼砂溶液.....	174
硫酸锌滴眼液.....	144	硼酸溶液.....	176
盐酸乙基吗啡滴眼液.....	145	含氯石灰硼酸溶液.....	177
氯霉素滴眼液.....	147	硝酸银溶液.....	179
醋酸可的松滴眼液.....	148	等渗氯化钠溶液.....	180
盐酸地卡因滴眼液.....	149	苯酚溶液.....	181
萤光素钠滴眼液.....	151	复方苯酚溶液.....	182
氢溴酸东莨菪碱滴眼液.....	152	新洁尔灭溶液.....	182
硝酸银滴眼液.....	152	升汞溶液.....	184
三、眼膏剂.....	153	甲紫溶液.....	185
眼膏基质.....	154	汞溴红溶液.....	186
盐酸乙基吗啡眼膏.....	154	雷夫奴尔溶液.....	187
黄氧化汞眼膏.....	155	呋喃西林溶液.....	188
氯化氨基汞眼膏.....	156	醋酸洗必泰溶液.....	188
硫酸阿托品眼膏.....	157	碳酸氢钠滴耳剂.....	189
毛果芸香碱眼膏.....	158	盐酸麻黄碱滴鼻剂.....	190
		复方麻黄碱滴鼻剂.....	192
		复方雷夫奴尔滴耳剂.....	192
第二章 一般制剂		三、酞剂.....	193
一、芳香水剂.....	159	复方雷锁辛酞.....	194
杏仁水.....	159	复方水合氯醛酞.....	195
氯仿水.....	161	水杨酸酞.....	195
薄荷水.....	162	硼酸酞.....	196

复方苯甲酸酯	197
樟脑苯酚酯	198
四、合剂	199
枸橼酸铁铵合剂	200
三溴合剂	201
水合氯醛合剂	202
胃蛋白酶合剂	204
稀盐酸合剂	205
氯化铵合剂	205
五、糖浆剂	207
枸橼酸糖浆	207
硫酸亚铁糖浆	208
磷酸可待因糖浆	210
单糖浆	211
六、散剂	211
小儿退热散	212
复方乳酶生散	216
复方氨茶碱散	217
复方鞣酸蛋白散	218
脐带粉	219
七、洗剂	220
氧化锌洗剂	220
炉甘石洗剂	221
复方炉甘石洗剂	222
白色洗剂	223
复方硫黄洗剂	224
八、擦剂	226
氧化锌油	226
炉甘石擦剂	227
复方水杨酸擦剂	228
九、栓剂	228
甲紫栓	229

甘油栓	230
十、甘油剂	231
硼砂甘油	231
酚甘油	232
碘甘油	233
氯霉素甘油滴耳剂	235
硼酸甘油滴耳剂	236

十一、软膏剂	237
骨蜡	239
硼酸软膏	240
水杨酸软膏	240
鞣酸软膏	241
氯化氨基汞软膏	242
鱼石脂软膏	243
硫黄软膏	243
亲水性软膏基质	244

附 录

中药制剂通则	246
丸剂	247
散剂	249
煎膏剂	250
软膏剂	250
酒剂	251
酊剂	251
冲剂	252
片剂	252
注射剂	254
胶囊剂	256
糖浆剂	257
常用仪器的使用	257
天平与称量	267
旋光度测定法	268
折光率测定法	269
PH值测定法	270
可见分光光度法和比色法	271

标准溶液的配制与标定·····	273
药品卫生标准·····	282
药品卫生检验法·····	283
中药制剂笔画索引·····	296

中药制剂汉语拼音索引·····	298
西药制剂笔画索引·····	301
西药制剂拉丁文索引·····	303

第一章 散 剂

散剂是指一种或数种药物均匀混合制成的供内服或外用的粉状制剂。外用散剂也称撒布剂。散剂容易分散，吸收较快，奏效迅速。

散剂除有上述特点，尚能产生一定的特殊效能（如机械性保护作用），剂量容易控制，使用与携带方便，适于小儿服用，又因散剂不含液体，药物较稳定。但由于粉碎，随表面积增加，其臭味、化学活性也相应增加，故一些腐蚀性强而易吸潮变质的药物一般不宜制成散剂。

散剂要求粉碎适当、干燥、疏松、混合均匀、色泽一致、剂量准确、稳定。内、外用散剂的包装与用法均应严格区别，切勿混淆。眼用散剂应在无菌或半无菌条件下配制。

制法：

1. 粉碎与过筛 药物的粉碎度关系到散剂的物理性质（如外观、均匀性、流动性），且可直接影响到散剂的疗效。

中草药一般均需经加工、炮制并干燥后，再进行粉碎。复方中草药散剂可混合粉碎，但贵重药（细料）、量小（如毒剧药）、具有浓厚香气的药物要分别粉碎。质软而粘的药物须与少量其它药物的粗末同捣成饼状，干燥后粉碎（即串碎法）。含多量油脂的种子类药物须单独压碎成泥状，陆续加入其余药物的细粉中混合后再粉碎（即串油法）。混合研磨即液化者须分别研细，研时可酌加数滴乙醇使容易成粉。

药物粉碎后须过筛，粗粉可再粉碎，直至全部或极大部分通过规定的筛网为止。除另有规定外，一般内服散剂应通过100目筛，外用及儿科散剂应通过120目筛，眼用散剂应通过180目筛。

2. 混合 药物混合均匀与否，对剂量的准确、疗效、外观都有重要关系。含毒剧药及复方散剂更应均匀一致。药物混合可通过搅拌、研磨、过筛等方法完成。对小量尤其是结晶性药物的混合可用研钵研磨，但不适于具引湿性药物的混合。过筛混合是将散剂组分混合在一起通过药筛一次或数次使之均匀。由于较细而重的粉末先通过，故过筛后仍须适当的搅拌混合。实际上，研磨后过筛，过筛后搅拌，两者常兼用，以确保均匀。

散剂混合的均匀程度与各成分的比例量、比重、粉碎度、颗粒均匀度及混合时间长短等均有关。一般物理性状相似的两种药物，如果比例量相等，则易于混匀，如比例量相差较大或比重不同、或含有用量小的毒、剧药，贵重药及颜色较深的药物，用一般方法不易混匀，须采用等量递加稀释法（又称套研混合法）。采用此法时，第一次研磨必须充分均匀，轻者宜先加；为减少研钵吸附性造成主药的损失，应先用处方中小部分量大而非主药成分于研钵内研磨，以饱和其表面。一般混合时间越长越均匀，但应视具体情况而定，一般小量混合

(研钵中)至少研磨5分钟或约40次。

3. 分剂量 常用(1)估分法,是以目测分剂量,虽方便,但误差大,一般误差在20%左右,对含有细料或毒剧药物的散剂不宜使用,且不适于大量生产。(2)称重法,此法准确,适于细料或毒剧药散剂,但工作效率低。(3)容量法,即以容器量取,如药匙、散剂分量器、粉末分装板以及大生产应用的散剂自动分包机等。

4. 质量检查 散剂应检查均匀度、粉末细度、装量差异限度,水份、卫生标准。

5. 包装

(1)有光纸,适于包装一般较稳定的中药的散剂,但不牢固,能被水、水蒸气浸透;
(2)玻璃纸,适于包装挥发性及油脂类散剂,而不适于包装引湿性的、易风化的散剂;
(3)蜡纸,适于包装易引湿、风化的散剂,但不适于包装挥发性药物如冰片、樟脑等,因蜡纸可部分地吸收这些挥发性药物,且透入石蜡内与其成低熔物而粘在一起;(4)聚乙烯塑料薄膜,在低温久贮会脆裂,且有透气透湿现象;(5)玻璃管或瓶,适于芳香、挥发性散剂,并加塑料盖或木塞用蜡封固。

散剂应置于干燥处保存。

一 效 散

Yixiao San

【处 方】	朱砂	100g	炉甘石(制)	300g
	冰片	100g	滑石	700g

【制 法】 以上四味,先将朱砂、冰片单独研为极细粉,炉甘石、滑石共粉碎过120目筛,取朱砂置乳钵中,依次与冰片、炉甘石、滑石粉配研,和匀、过筛,使其色泽一致。

【性 状】 本品为淡红色粉末,味涩、辛凉。

【检 查】 应符合附录249页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 祛湿收敛,止痛止痒。用于湿疹,脓疱疮等。

【用法与用量】 外用,用干粉擦于患处,一日数次。

【贮 藏】 密闭,防潮。

八 厘 散

Bali San

【处 方】	硼砂	15g	土鳖虫	15g	大黄	15g
	当归	15g	自然铜(煅)	15g	乳香(制)	15g
	没药(制)	15g	血竭	15g	骨碎补(制)	15g
	续断	15g	朱砂	15g	三七	10g

【制 法】 以上十二味，除朱砂研细水飞或研至极细粉外，其余礞砂等十一味共研细粉，过100目筛，再与朱砂粉配研，混合均匀。

【性 状】 本品为红棕色粉末，气香，味辛苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 活血，消肿，接骨，止痛。用于跌打损伤，骨折，血瘀作痛。

【用法与用量】 口服，一次 5g，一日 2 次，黄酒送下。

【注 意】 孕妇忌服。

【贮 藏】 密闭，防潮。

小 儿 牛 黄 千 金 散

Xiaoerniuhuangqianjin San

【处 方】	黄连	200g	胆南星	100g	全蝎	150g
	僵蚕(制)	50g	天麻	200g	朱砂	200g
	牛黄	30g	冰片	100g		

【制 法】 以上八味，先将黄连、胆南星、全蝎、僵蚕、天麻粉碎过 120 目筛，再将朱砂、牛黄、冰片分别研成极细粉，然后再与黄连等五味药粉配研混匀，分装。

【性 状】 本品为棕红色粉末，味苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 清热解毒，镇惊止抽。用于小儿发热，高烧，惊风抽搐。

【用法与用量】 口服，一日 2 次，一次 0.1—0.2g。

【规 格】 每袋 0.5g

【贮 藏】 密闭，防潮。

小 儿 消 化 散

Xiaoerxiaohua San

【处 方】	鸡内金(炒)	25g	麦芽(炒)	7.5g	砂仁	5g
-------	--------	-----	-------	------	----	----

【制 法】 以上三味，粉碎，过120目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为淡黄灰色粉末，味甘，辛。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 消食健胃。用于小儿消化不良，腹痛，呕吐，胀满。

【用法与用量】 口服，满周岁婴儿一次 1 包，一日三次，不同年龄的小儿可酌情增减。

【规 格】 每包 0.5g

【贮 藏】 密闭，防潮。

小 儿 消 食 散

Xiaoerxiaoshi San

【处 方】 鸡内金(炒) 150g 六曲(炒) 50g
山楂(炒) 50g 麦芽(炒) 50g

【制 法】 以上四味，混合均匀，粉碎过100目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为焦黄色粉末，味甘微酸。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 健胃消食。用于小儿消化不良。

【用法与用量】 口服，周岁小儿每服0.5g，一日3次，周岁以上小儿可根据年龄适当增加剂量。

【贮 藏】 密闭，防潮。

小 儿 清 肺 散

Xiaoerqingfei San

【处 方】 川贝母 1000g 生石膏 600g 朱砂 300g
冰片 20g 牛黄 10g 琥珀 10g

【制 法】 以上六味，先将朱砂、冰片、牛黄、琥珀分别研为极细粉，其余粉碎过100目筛，用配研法将上述各药粉混匀，使其色泽一致。

【性 状】 本品为淡红色粉末，味苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 清肺解热，镇惊止咳。用于肺热咳嗽，小儿肺炎等症。

【用法与用量】 口服，三岁以下儿童，一次0.5g，三岁以上儿童一次1g，一日2—3次，或遵医嘱。

【贮 藏】 密闭，防潮。

口 腔 溃 瘍 散

Kouqiangkuiyang San

【处 方】 青黛 50g 枯矾 50g
冰片 5g 儿茶 10g

【制 法】 以上四味，分别研成细粉，过100目筛，然后用配研法将上述各药粉混合均匀，装瓶。

【性 状】 本品为暗蓝色粉末，味涩、凉。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 解毒，收敛，止痛。用于口腔溃疡。

【用法与用量】 外用，一日 2～3 次，撒布口腔患处。

【贮 藏】 密闭，防潮。

止 痉 散

Zhijing San

【处 方】 全蝎 100g 蜈蚣 50g

【制 法】 以上二味，粉碎，过120目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为灰棕色粉末。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 熄风止痉，攻毒。用于惊风抽搐痉挛，面神经麻痹，脑血管痉挛，破伤风。

【用法与用量】 口服，成人一次 2 g，一日 2—3 次

小儿周岁内者一次 0.02g，2—3 岁一次 0.05g

4—5 岁一次 0.08g，6—7 岁一次 1 g

8—10 岁一次 1.2g，11—12 岁一次 1.4g

13—15 岁一次 1.6g，16—18 岁一次 1.8—2 g

【注意事项】 孕妇忌服。

【贮 藏】 密闭保存。

牙 疼 散

Yateng San

【处 方】	毕拔	12.5g	白芷	125g
	川椒	125g	高良姜	12.5g
	雄黄	12.5g	细辛	12.5g
	冰片	3.13g		

【制 法】 以上七味，将雄黄、冰片分别研为极细粉，过120目筛。将其余毕拔等五味混匀粉碎，过120目筛。取冰片细粉置乳钵中，分次加入雄黄细粉研匀，再与毕拔等细粉配研，过筛混匀，使其色泽一致。

【性 状】 本品为灰棕色粉末，味辛。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 散风止痛。用于牙齿疼痛，齿龈肿胀。

【用法与用量】 外用，每用少许，敷于患处，引涎流出。

【贮藏】 密闭，防潮。

乌 连 散

Wulian San

【处 方】 乌梅 500g 黄连 500g

【制 法】 以上二味，混合粉碎，过100目筛，使其色泽一致，分装。

【性 状】 本品为棕黄色粉末，味酸苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 消炎止痢。用于治疗肠炎，腹痛，菌痢。

【用法与用量】 口服，一次 2 包，一日三次。

【规 格】 每包重 2.5g

【贮藏】 密闭，防潮。

水 调 散

Shuitiao San

【处 方】 黄柏 100g 石膏(煅) 80g

【制 法】 以上二味，混合均匀，粉碎过100目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为黄色粉末，味苦涩。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 清热解毒，消肿止痛。用于未溃破的疮疖疗毒，红肿疼痛。

【用法与用量】 外用，用凉开水调成粘稠糊状，摊于油纸上贴在患处，每日换药 1—2 次。

【注 意】 忌食辛辣物。

【贮藏】 密闭，防潮。

立 止 头 痛 散

Lizhitoutong San

【处 方】 大黄 62.5g 全蝎(去毒尖) 10个
朱砂 9.4g 麝香 1.2g

冰片

1.5g

【制 法】 以上五味，将朱砂研为极细粉，麝香、冰片分别研为细粉。大黄、全蝎粉碎，过120目筛。取朱砂置乳钵中，依次与麝香、冰片、大黄、全蝎细粉配研，和匀，过筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为棕褐色至棕黄色的粉末，味微苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 清热镇静，解痉，通窍，止痛。用于由风热上攻引起的头晕头痛、鼻塞不通。

【用法与用量】 口服，一次 1g，一日 2 次。外用，吸入鼻内少许，可通关开窍。

【贮 藏】 密闭，防潮。

平 金 散

Pingjin San

【处 方】	麻黄	50g	苦杏仁	50g	麦冬	150g
	枇杷叶(炙)	150g	生石膏	200g	生甘草	100g
	天花粉	100g	白茅根	200g	牛蒡子(炒)	200g
	川贝母	150g	清半夏	50g	桔红	50g

【制 法】 以上十二味，混合，粉碎，过120目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为黄褐色粉末，味微苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 清热解表，止咳平喘。用于小儿身热发烧，咳嗽喘促，肺炎。

【用法与用量】 口服，周岁小儿一次0.5g，一日 3 次。周岁以上儿童可根据年龄、体质适当增加剂量。

【贮 藏】 密闭保存。

甘 楞 散

Ganleng San

【处 方】	甘草	100g	瓦楞子(煅)	500g
--------------	----	------	--------	------

【制 法】 以上二味，混合均匀，粉碎过100目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为灰黄色粉末，味甘涩。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 健胃，止痛，制酸。用于胃脘疼痛，胃溃疡及十二指肠溃疡。

【用法与用量】 口服，一次 5g，一日 3 次。

【贮 藏】 密闭，防潮。

回阳玉龙散

Huiyangyulong San

【处 方】	川乌	94g	天南星	31g
	赤芍	31g	干姜	63g
	白芷	31g	肉桂	16g

【制 法】 以上六味，混合均匀，粉碎，过120目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为灰棕色粉末，味辛微苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 除湿祛寒，回阳止痛。用于阴疽恶疮，湿痰流注，皮色不变的漫肿隐痛。

【用法与用量】 外用，按患处大小，用热白酒调敷。

【注 意】 本品为外用药，切勿入口。

【贮 藏】 密闭，防潮。

诃 子 散

Hezi San

【处 方】	诃子	25g	肉豆蔻(煨)	25g	红参	15g
	白术(炒)	25g	茯苓	15g	木香	15g
	陈皮	15g	厚朴(制)	25g	吴茱萸	10g
	肉桂	15g				

【制 法】 以上十味，混合，粉碎，过120目筛，使其色泽一致，分装。

【性 状】 本品为土黄色粉末，气香味辛。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 温中散寒，健脾止泻。用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，肠鸣泻泄。

【用法与用量】 口服，一次1袋，一日2次，小儿酌减。

【规 格】 每袋重5g

【贮 藏】 密闭，防潮。

收敛生肌散

Shoulianshengji San

【处 方】	乳香(制)	50g	没药(制)	50g	海螵蛸	50g
-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

血竭	50g	赤石脂	50g	硼砂(煨)	50g
象皮(制)	50g	炉甘石(煨)	50g	冰片	50g

【制 法】 以上九味，先取乳香、没药、海螵蛸、血竭、赤石脂、硼砂、象皮、炉甘石等八味药材，混合粉碎，过100目筛，再取冰片研成极细粉，然后再共同配研混合均匀。

【性 状】 本品为淡红色粉末，味苦辛，有清凉感。

【检 查】 应符合附录249页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 消肿解毒，收敛生肌止痛。用于治疗疮疖溃疡久不愈合。

【用法与用量】 外用，撒敷患处，每二日换药一次。

【注意事项】 用药期间忌食辛辣之物。

【贮 藏】 密闭，防潮。

金 玉 散

Jjnyu San

【处 方】	郁金	400g	大黄	400g	黄柏	200g
	白芨	400g	白蔹	400g	白芷	400g
	绿豆	500g				

【制 法】 以上七味，混合粉碎，过100目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为淡黄色粉末，味苦。

【检 查】 应符合附录249页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 消肿，解毒。用于痈肿，热痛（疮疖肿毒未破者）。

【用法与用量】 外敷，用绿茶煎汤，放冷后调敷患处。

【贮 藏】 密闭，防潮。

驅 蛔 散

Quhui San

【处 方】	石榴皮	100g	苦楝皮	100g
	贯众	100g	槟榔	100g

【制 法】 以上四味，掺匀，粉碎过120目筛，使其色泽一致。

【性 状】 本品为棕色粉末，味微苦涩。

【检 查】 应符合附录249页散剂项下有关的各项规定。

【功能与主治】 驱虫，止痛，用于小儿蛔虫腹痛。

【用法与用量】 口服，一次0.25—1.0g，一日2次，饭前服用。或遵医嘱。

【注 意】 忌食油腻。

【贮 藏】 密闭，防潮。

活 血 散

Huoxie San

【处 方】	地龙	3000g	乳香(制)	3000g	没药(制)	3000g
	苏木	3000g	桑皮	3000g	白芷	3000g
	红花	3000g	降香	3000g	川芎	1800g
	当归	1500g	香附(制)	1000g	木香	500g
	金银花	1500g				

【制 法】 以上十三味，混合粉碎，过100目筛，使其色泽一致，分装。

【性 状】 本品为棕红色粉末，味辛。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关各项规定。

【功能与主治】 活血，散瘀，止痛。用于跌打损伤，血瘀作痛。

【用法与用量】 口服，一次 1 袋，一日 2 次，黄酒送下，小儿酌减。

【注 意】 孕妇忌服。

【规 格】 每袋重 5 g

【贮 藏】 密闭，防热，防潮。

胃 苓 散

Weiling San

【处 方】	苍术(炒)	15g	陈皮	15g	厚朴(姜制)	15g
	白术(炒)	10g	茯苓	15g	肉桂	10g
	泽泻	15g	猪苓	15g	甘草	15g

【制 法】 以上九味，混合粉碎，过120目筛，使其色泽一致，分装。

【性 状】 本品为淡黄色粉末，气微香，味微苦。

【检 查】 应符合附录 249 页散剂项下有关各项规定。

【功能与主治】 行气，健脾，利水。用于水泻便溏，小便不利。

【用法与用量】 口服，一次 1 袋，一日 2 次，小儿酌减。

【规 格】 每袋重 5 g

【贮 藏】 密闭，防潮。

降 糖 散

Jiangtang San

【处 方】	地黄	1000g	天花粉	500g	枸杞子	500g
-------	----	-------	-----	------	-----	------