

名醫類案

八卷

血症

下血

溺血

痔附腸風臟毒

脫肛

腎藏風

⁰²²¹⁰臙瘡

前陰病

痛風

痿症
凡癱症軟足症

癰症

鬼注

邪祟

顛狂心疾

怔忡

名醫類案卷第八

新都篁南江 攞集

後學

仁和余集蓉裳
錢塘魏之琇玉橫
仁和沈煥敦曾

重校

歙鮑廷博以文

血症

張杲在汝州因出驗尸有保正趙溫不詣尸所問之即云

血已數斗昏困欲絕張使人扶掖至鼻血如簷滴張謂治

血莫如生地黃遣人覓之得十餘斤不暇取汁因使生服

漸及三四斤又以其滓塞鼻須臾血定又癸未娣病吐血

有醫者教用生地黃自然汁煮服此治熱血妄行日服數升三日

而愈有一婢半年不月見釜中餘汁輒飲數盞尋卽通利其效如此

東垣治一貧者脾胃虛弱氣促精神短少衄血吐血以麥門

冬二分人參歸身三分黃芪白芍甘草各一錢

益氣血脫

五味

五枚作一服水煎稍熱服愈繼而至冬天寒居密室臥大

熱炕而吐血數次再求治此久虛弱外有寒形而有火熱

在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉裏之虛熱夫

冬寒衣薄是重虛其陽表有大寒壅遏裏熱火邪不得舒

伸故血出於口憶仲景傷寒有云太陽傷寒當以麻黃湯

發汗而不與之遂成衄却與麻黃湯立愈此法相同遂用

之以麻黃桂枝湯入參益上焦元氣而實其表麥門冬保肺氣各三分桂枝以補表虛當歸身和血養血各五分麻黃去根節去外寒甘草補脾胃之虛黃芪實表益衛白芍藥各一錢五味三枚安其肺氣臥時熱服一服而愈

丹溪治一婦貧而性急忽衄作如注倦甚脉浮數重取大爲

陽○脉亦有大則爲虛非重取而得之也且乳此陽滯於陰病雖重可治急以

萱草根入薑汁各半飲之本草云萱草根同薑汁服乃大熱衄血仙方就以四

物湯加香附側柏葉四服覺渴仍飲以四物十餘貼而安

有形之血不能速生無形之氣所當急固況症倦甚而衄如注耶乃先生以爲陽滯於陰不投參朮而用四物後學

宜細心別焉

一壯年患嗽而咯血發熱肌瘦吐血發熱治女人要問經次行否恐氣升而不降當閱經

水俞子容治案可法醫用補藥數年而病甚脉濇此因好色而多怒

精神耗少又補塞藥多榮衛不行瘀血內積肺氣壅遏不

能下降治肺壅非吐不可精血耗非補不可唯倒倉法二

者兼備但使吐多於瀉耳兼灸肺俞左二穴肺俞勝在三

椎骨下橫過各一寸半灸五次而愈

一人咳嗽吐血四物加貝母瓜蒌五味桑白皮杏仁欬冬花

柿霜今人治血大率如此

一人年五十勞嗽吐血以人參白朮茯苓百合白芍藥紅花

細辛細辛紅花配方甚奇黃芪半夏桑白皮杏仁甘草阿膠訶子青

黛瓜萆海石五味天門冬

一人近四十咳嗽吐血四物換生地加桑白皮杏仁款冬花五味天門冬桔梗知母貝母黃芩

一人不欬吐而血見口中從齒縫舌下來者藥用滋腎水瀉和火治之不旬日而愈後二人証同俱以此法治之效

一人因憂病欬吐血面黎黑色藥之不效曰必得喜可解其兄求一足衣食地處之於是大喜卽時色退不藥而瘳經曰治病必求其本又曰無失氣宜是知藥之治病必得其病之氣宜苟不察其得病之情雖藥亦不愈也

滑伯仁治一婦體肥而氣盛自以無子嘗多服煖宮藥積久

火盛迫血上行爲衄衄必數升餘面赤而為疾神恍恍如癡醫者猶以上盛下虛丹剗鎖墜之伯師之經云上者下之今血氣俱盛血而上行法當下導奈何實實耶卽與桃仁承氣湯三曰下積瘀既去繼服既濟湯二十劑而愈

一人病嘔血或一不或盈盆盎且二三年其人平昔嗜市利不憚作勞中氣因之侵損伯仁視之且先與八寶散一二日服黃芩芍藥湯少有動作卽進犀角地黃湯加桃仁大黃湯稍間服抑氣寧神散有痰用礞石丸其始脉芤大後脉漸平三月而愈屢效

一人乘盛暑往途中吐血數口亟還則吐甚胸拒痛甚而頭

眩病且殆。或以爲勞心焦思所致。與茯苓補心湯。仁至診其脉。洪而滑。曰是大醉飽。胃血壅遏。爲暑迫血上行。先與犀角地黃湯。繼以桃仁承氣湯。去瘀血宿積。後治暑。卽安。一人病咳血痰。診其脉數而散。體寒熱。仁曰。此二陽病也。在法不治。當以夏月死。果然。

子和治一書生。過勞。大便秘結燥。欬逆上氣。時喝喝然有音。吐嘔鮮血。以苦劑解毒湯。加木香。漢防己煎服。時時啜之。復以木香檳榔丸泄其逆氣。月餘而痊。

呂滄洲治一人病。衄血旬不止。時天暑。脉弱。衆醫以氣虛不統血。老生常談。日進芪歸茸附。滋甚。求治。呂至。未食頃。其所衄。

血已三覆器矣。及切其脉。兩手皆虛芤。右上部滑數而浮。

躁。脉浮。以時令。其鼻赤。查而色白。即告之曰。此得之酒。酒毒

暴悍而風暑乘之。熱蓄於上焦。故血妄行而淖溢。彼曰。某

嘗飢走赤日。已而醉酒。向風臥。公所診誠是。為製地黃汁。

二升。許。補其本。兼用防風湯。標。瀉其飲之。即效。

項彥章治一婦。患衄三年。許醫以血得熱則淖溢。服瀉心涼

血之劑。益困。衄纔數滴。輒昏。六脉微弱。寸為甚。曰。肝藏血。

而心主之。今寸口脉微。知心虛也。心虛則不能司其血。故

逆而妄行。濫。養心仍補脾。實其子。子實則心不虛矣。虛則補母。

有之。虛而補子之說。今見此案。信哉。醫理。以琥珀諸補心

無窮盡。無方體也。故其命方白歸脾湯。

藥遂安

許先生論梁寬父病右脇肺部也欬而吐血舉動喘逆者肺
脹也發熱脉數不能食者火來刑金肺與脾俱虛也脾肺
俱虛而火乘之其病爲逆如此者例不可補瀉若補金則
慮金與火持而喘咳益增瀉火則慮火不退位而瘧癖反
甚真知箇中三昧正宜補中益氣湯先扶元氣少以治病藥加之
聞已用藥未效必病勢若逆而藥力未到也遠期秋涼庶
可復爾蓋肺病惡春夏火氣至秋冬火退只宜於益氣湯
中隨四時升降寒熱及見有證增損服之或覺氣壅間與
加減枳朮丸或有飲間服局方枳朮湯數月逆氣少回逆

協四時節
真玉言也

氣回則可施治法。但恐今日已至色青色赤及脉弦脉洪則無及矣。病後不見色脉不能懸料以既愈復發言之。惟宜依准四時用藥以扶元氣。庶他日既愈不復發也。其病初感必深。恐當時消導尚未盡。停滯延淹變生他証。以至於今宜少加消導藥於益氣湯中。庶可漸取效也。

一人膏粱而飲。至今病。醫曰：諸見血者爲熱。以清涼飲子投之。卽止。越數日其疾復作。醫又曰：藥不勝病故也。遂投黃連解毒湯。或止或作。易數醫。皆用苦寒之劑。俱欲勝其熱而已。飲食起居浸不及初肌。寒而時躁。言語無聲。口氣臭穢。似熱惡如冷風其衄之餘波則未絕也。或曰：諸見血者

熱動熱也。熱而寒之理也。今不愈而反害之何耶。內經曰：以平爲期。又言下工不可不慎也。彼惟知見血爲熱而以苦寒攻之，抑不知苦瀉土，土脾胃也。脾胃人之所以爲本者，今火爲病而瀉其土，火未嘗除而土已病矣。土病則胃虛，虛則榮氣不能滋榮百脉，元氣不循天度，氣隨陰化而無聲肌寒也。噫，粗工噫噫以爲可治熱病，未已，寒病復起，此之謂也。

吳球治一少年患吐血，來如湧泉，諸藥不效。虛羸瘦削，病危。亟脉之，沉絃細濡，其脉爲順。血積而又來寒而又積，疑血不歸源故也。嘗聞血導血歸未試也，遂用病者吐出之血。

瓦器盛之俟凝入銅鍋炒血黑色以紙盛放地上出火毒
細研爲末每服五分麥門冬湯下進二三服其血遂止後
頻服茯苓補心湯數十貼以杜將來保養半年復舊

徐德占治一人患衄尤急灸項後髮際兩筋間宛宛中三壯
立止蓋血自此入腦注鼻中常人以線勒頸後尚可止衄
此灸宜效

秀州進士陸迎忽得疾吐血不止氣蹙驚顫狂躁跳躍雙目
直視至深夜欲拔戶而出如是兩夕諸醫盡用古方及單
方極療不瘳舉家哀禱事觀音夢授一方但服一料當永
除根用益智一兩生硃砂二錢青皮半兩麝香一錢爲細

未燈心湯下。治驚狂吐血。方莫過於此。陸覺取筆記之。服之乃愈。

一人勞瘵吐血。取茜草一斤。瑋按後云。翦草狀如茜。淨洗碎。草。則此處當作翦草。

爲末。入生蜜一斤。和成膏。以陶器盛之。不得犯鐵器。日一蒸一曝。至九日乃止。名曰神傳膏。令病人五更起。面東坐。不得語言。用匙抄藥如食粥。每服四匙。良久呷稀粟米粥。壓之。藥只冷服。粟米飲亦不可太熱。或吐或下。皆無害。凡久病肺損。咯血吐血。一服立愈。

翦草狀如茜草。又如細辛。婺台二州有之。惟婺可用。

饒州市民季七。常苦鼻衄。垂困。醫授以方。取蘿蔔自然汁。和無灰酒飲之。則止。醫云。血隨氣運轉。氣有滯逆。所以妄行。

蘿葡最下氣而酒導之是以一服效經五日復如前僅存

喘息而張思順以明州判王氏單方刮人中白置新瓦上

火逼乾以溫湯調下卽止

按八中白能去肝火三焦火導勝脫火下行故也且不多用火

力則清涼矣

今十年不作張監潤之江口鎮適延陵鎮官曾棠

入府府委至務同視海舶曾著白茸毛背子盛服濟潔正

對談之次血忽出如傾變所服爲紅色駭曰素有此疾不

過點滴耳今猛來可畏覺頭空空然張曰君勿憂我當爲

製一藥移時而就持與之血止不復作人中白者旋盆內

積鹹垢是也蓋秋石之類特不多用火力治藥時勿令患

人知恐其以爲污穢不肯服此方可謂奇矣

魏華佗善醫嘗有郡守病甚佗過之郡守令佗診候佗退謂其子曰使君病有異於常積瘀血在腹中當極怒嘔血卽能去疾不爾無生矣子能盡言家君平昔之愆吾疏而責之其子曰若獲愈何謂不言於是具以父從來所乖謬者盡示佗佗畱書責罵之父大怒發吏捕佗佗不至卽嘔血升餘其疾乃平

獨異志

蔡子渥傳云同官無錫監酒趙無疵其兄劬血甚已死入殮血尚未止

琇按血未止則生氣猶存

一道人過之聞其家哭詢之道云

是曾服丹或燒煉藥子藥之當卽活探囊出藥半錢七吹

八鼻中立止得活乃梔子燒存性末之

一人鼻衄大出欲絕取茅花一大把水兩碗煎濃汁一碗分

二次服立止

良方

一人指縫中因搔痒遂成瘡有一小竅血濺出不止用止血藥及血竭之類亦不效數日遂死復有一人於耳後髮際搔痒亦有小竅出血與前相似人無識者適有道人云此名髮泉但用多年糞桶箍曬乾燒灰敷之立愈使前指縫血出遇之亦可以無死矣

邵村張教官患衄血多諸治不效首垂任流三晝夜不止危甚一道人教用生藕一枝搗貼顙顙更以海巴燒存性爲

末鵝管吹入鼻內二三次卽止

海巴俗名壓驚螺卽雲南所用也