

周氏醫學叢書



大腸實

四證

忌補欬

燥熱

諸藥俱見前

宜潤下

苦寒

辛寒

生地黃

麻仁

桃仁

黃連

黃芩

槐花

大黃

石膏

知母

枳殼

便輒閉

忌同大腸實

宜同大腸實加芒硝

猪膽

檳榔

郁李仁

石蜜

腸風下血屬大腸溼熱

忌下

燥熱

諸藥俱見前

宜清熱

涼血

兼升

甘寒

苦寒

生地黃

槐花

地榆

黃連

黃芩

荆芥

防風

甘艸

紅麴

白芍藥

側柏葉

白頭翁

蒲黃

雞子

葛穀

臟毒屬血熱

忌同腸風下血

(宜) 同腸風下血加忍冬

麥門冬

倍加地榆 蒲黃

腸癰屬大腸實火

忌同腸風下血

宣下

苦寒

解毒

大黃

白藥子

白芷

白及

白歛

連翹

忍冬藤

天明精

甘艸

黃耆

生地黃

明礬

黃蠟

生蜜

已上三味作丸

膀胱實

一證

忌燥熱

收澀

諸藥俱見前

宜潤

淡滲

知母

黃檗

車前子

木通

瞿麥

滑石

茯苓

猪苓

癃閉屬膀胱實熱

忌破氣

發散

燥熱

如屬水液不足兼

忌利小便

諸藥俱見前

宜同膀胱實佐以升提

升麻

柴胡

三焦實

三證

忌補歟

升

燥熱

諸藥俱見前

宜降

清熱

調氣

甘寒

苦寒

鹹寒

蘇子

麥門冬

知母

黃檗

玄參

山梔

黃芩

黃連

童便

喉痺卽纏喉風屬少陽相火少陰君火竝熾經曰一陰一陽結爲喉痺一陰者少陰君火也一陽者少陽相火也

忌同三焦實

宜辛散

佐以苦寒

鹹寒

急則有鍼法

吹法

吐法

鼠黏子

山豆根

射干

黃連

黃檗

知母

玄參

童便

蘇子

麥門冬

貝母

甘艸

生犀角

山慈姑

苦桔梗

續隨子

急治用膽礬朴硝牛黃爲末和勻吹入喉中又法
用明礬三錢巴豆七粒去殼同礬煅礬枯去巴豆
卽取礬爲細末吹入喉中流出熱涎卽寬

頭面赤熱屬上焦火升

忌同三焦實

宜降

清熱

甘緩

佐以酸歛

蘇子

枇杷葉

天門冬

麥門冬

玄參

薄荷

桔梗根

梨

柿

蔗

童便

白芍藥

五味子

赤白遊風屬血熱熱則生風故善遊走俗名火丹小兒
多患此大人亦時有之

忌同三焦實

宜清熱

涼血

兼行血

辛寒

甘寒

苦寒

鹹寒

生地黃

黃連

黃檗

生甘艸

牡丹皮

蒲黃

紅盤花

連翹

玄參

鼠黏子

牛膝

藍汁

芷根

童便

赤芍藥

宜兼外治砭出熱血及用漆姑艸慎火艸搗爛敷之卽易愈

○六淫門

風 ○諸暴強直支痛癓戾裏急筋縮皆屬於風眞中風猝僵仆口噤不言不省人事如遺尿直視口開手撒汗出如珠屬不治證西北高寒之地有此東南無之

〔忌破氣

下

吐

苦寒

酸歟

諸藥俱見前

宜辛甘發散

峻補真氣

桂枝

附子

甘艸

獨活

羌活

天麻

麻黃

防風

芎藭

細辛

藁本

蔓荆實

牛黃

辛夷

牡荆實

白芷

人參

黃耆

有痰加竹瀝

南星

半夏

薑汁

類中風口眼歪斜語言蹇澀半身不遂口噤不言四肢
不舉痰涎壅盛昏眊不省人事

忌汗

吐

下

大忌破氣

溫熱

苦寒

及一切治風溼辛燥發散，并開竅走真氣行血。

諸藥慎勿犯之犯之則輕必重重必斃

麝香

蘇合香

檀香

龍腦香

安息香

已上開竅走真氣

餘忌藥俱見前

宜滋補

陽虛者補氣

陰虛者補血

陰

陽兩虛則氣血雙補

兼宜清熱降氣豁痰及保

脾胃

天門冬

脾胃薄弱者勿多用

麥門冬

荆遜

蘇子

桔梗根

貝母

橘紅

枇杷葉

甘艸

竹瀝

童便

霞天膏

梨汁

黃檗

次益血於前藥中加

胡麻仁

石斛

牛膝

生地黃

五味子

甘菊花

枸杞子

何首烏

薯蕷

菟絲子

白芍藥

丹參

山茱萸

白蒺藜

酸棗仁

柏子仁

車前子

竹葉

羚羊角

鼈甲

木瓜

青蒿

遠志

枯樓仁

沙參

巴戟天

茯苓

茯神

如便閉加肉蓯蓉當歸倍麻仁

如兼氣虛加人參黃耆有肺熱者勿入人參

感冒風寒俗名傷風其證或頭疼身熱輕者則否鼻必

塞兼流清涕必惡風寒或聲重或聲啞甚者痰壅氣喘

欬嗽

忌補氣

酸歟

閉氣

諸藥俱見前

宜發散

辛甘

溫

芎芻

細辛

藁本

防風

甘艸

荆芥

白芷

前胡

桑白皮

桔梗

紫蘇

薄荷

杏仁

石膏

傷風熱

忌同感冒風寒

宜辛寒

甘寒

發散

石膏

知母

甘艸

竹葉

麥門冬

前胡

桔梗

薄荷

葛根

桑白皮

久而不愈者屬虛陽虛

者加人參黃耆陰虛者加五味子地黃倍門冬白芍藥

寒○諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癲癇堅痞腹滿急痛下利清白食已不飢吐利腥穢屈伸不便厥逆禁固皆屬於寒

凡中寒必本於陽虛

忌破氣

苦寒

下

甘寒

辛寒

卷二
諸藥俱見前

宜補氣

毒重者溫補

桂枝

乾薑

麻黃

人參

附子

黃耆

傷寒冬月卽病宜從仲景法

論傷寒古今時地不同因之六經治法宜異

夫傷寒者大病也時者聖人所不能違者也以關乎死生之大病而藥不從時顧不殆哉仲景醫門之聖也其立法造論後之明師如華佗孫思邈輩莫不宗之漢末去古未遠風景猶厚形多壯偉氣尚敦厖其藥大都爲

輕者解

北方感寒卽病而設況南北地殊厚薄不侔故其意可
師也其法不可改也循至今時千有餘年風氣澆矣人
物脆矣況在荆揚交廣梁益之地與北土全別故其藥
則有時而可改非違仲景也實師其意變而通之以從
時也如是則法不終窮矣故作斯議條列其方稍爲損
益以從時地俾後之醫師知所適從庶幾患斯疾者可
免於夭枉爾

辨驗外感真僞法

凡外感必頭疼其疼也不間晝夜探其舌本必從喉嚨
內乾出於外多兼煩躁不煩躁者卽輕證也不頭疼而
發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖乾而舌

本不燥骨雖疼而頭不疼雖渴而不欲引飲至夜或偶得寐遇食不好亦不惡居處雖若尪怯而神氣安靜凡若此者皆非傷寒也

三陽治法總要

太陽病其證發熱惡寒惡風頭痛項強腰脊強遍身骨痛脈雖浮洪而不數多不傳經煩躁脈數急者是欲傳經宜先發汗以解表邪其藥以羌活湯爲主羌活三錢前胡二錢甘艸八分葛根二錢生薑三片棗二枚杏仁九粒去皮尖研爛水煎服秋深冬月應用此方亦可量加紫蘇芍白如冬月天氣嚴寒感邪卽病服此藥不得汗本方加麻黃一錢生薑四片共煎七片得汗勿再服