

醫方考經

茯苓甘草湯

茯苓

皮去

桂枝

二兩

生薑

二兩

甘草

二兩

傷寒水氣乘心心動悸者此方主之○水氣乘心而悸者以水者心火之所畏也故乘之則為動悸此飲水過多之所致也淡可以滲水故用茯苓辛可以散飲故用薑桂益土可以制水故用甘草又曰飲之為悸甚於他邪雖有餘邪必先治悸蓋以水停心下不早治之浸於肺則為喘為欬傳於胃則為噦為噎溢於皮膚則為腫潰於腸間則為利下故也經曰厥而心下悸宜先治水後治其厥厥為邪之深者猶先治水則夫病淺於厥者可知矣

○桂枝之炒術

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓

半斤
去皮

桂枝

四兩
炒

甘草

二兩

大棗

十五枚

甘草水煎

傷寒汗後臍下悸欲作奔豚者此方主之○汗後則心液虛腎者水臟欲乘心火之虛而剋之故臍下悸欲作奔豚而上凌於心也茯苓甘淡可以益土而伐腎邪桂枝辛熱可以益火而平腎氣甘草大棗之甘可以益脾益脾所以制腎也煎以甘草水者揚之無力取其不助腎氣爾

真武湯

茯苓

去皮

芍藥

炒

生薑

各三兩

白朮

二兩
炒

附子

一枚
製

傷寒發汗過多其人心下悸頭眩身瞤振振欲擗地者此方主之○汗多而心下悸此心亡津液腎氣欲上而凌心也頭眩身瞤振振欲擗地者此汗多亡陽虛邪內動也真武北方之神司水火者也今腎氣凌心虛邪內動有水火奔騰之象故名此湯以主之茯苓白朮補土利水之物也可以伐腎而療心悸生薑附子益衛回陽之物也可以壯火而祛虛邪芍藥之酸收陰氣也可以和榮而生津液

理中湯

人參

去芦

白朮

炒

乾薑

炮

甘草

炮

太陰自利不渴寒多而嘔腹痛鴨溏霍亂此太陰有真寒也本方主之○太陰者脾也自利渴者為熱不渴者為寒脾喜溫而惡寒寒多故令嘔寒者肅殺之氣故令腹痛鴨溏者後便如鴨之溏亦是虛寒所致霍亂者邪在中焦令人上吐下瀉手足揮霍而目瞭亂也霍亂有陰陽二證此則由寒而致故耳病因於寒故用乾薑之溫邪之所湊其氣必虛故用人參白朮甘草之補

吳茱萸湯

吳茱萸

一升
泡過

人參

三兩
去芦

生薑

六兩

大棗

十二枚

傷寒食穀欲嘔者屬陽明也此湯主之得湯反劇者屬上焦此非所宜也少陰犯真寒吐利手足厥冷煩燥欲死者此湯主之厥陰乾嘔吐沫頭痛者亦此湯主之○陽明胃也爲倉廩之官主納水穀有寒故令食穀欲嘔吳茱萸溫之宜矣若得湯反劇使非胃中寒乃是上焦火宜用涼劑而吳茱萸非宜矣少陰犯真寒者足少陰腎藏中寒與傳來陽證不同也腎間陰寒盛則上格乎陽而爲吐經曰腎主二便故腎寒則太便不禁而爲利手足得陽而溫受氣於內者也內有陰寒故令手足厥逆而令煩燥者陰盛格陽陽氣內爭故令陽煩而陰

燥斯其爲證亦危矣故欲死厥陰者肝也寒氣內格故乾嘔吐沫厥陰與督脉會於巔故頭痛吳茱萸辛熱而味厚經曰味爲陰味厚爲陰中之陰故走下焦而溫少陰厥陰佐以生薑散其寒也佐以人參大棗補中虛也雖然張機氏立是方以治少陰厥陰之寒也固矣又曰少陰病吐利煩燥四逆者死乎厥冷之與四逆無相遠也臨病之工焉可不慎

△按宋板傷寒論辨少陰脉證并治條先列脈證有曰少陰病吐利煩燥四逆者死次列治法有曰少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸

○四逆云者四肢
逆冷也手足云者
手足厥冷也辯
在下文戴元禮證
治要訣詳論陽厥

湯主之謹讀至誠之言令人不覺通身白汗若非救世鑒王菩薩誰垂如是大慈悲心耶所以然者傳經之邪先傷經中正氣傳至少陰隨所患人正氣虛實有下之者溫之者有溫補之者種種不同詳載方冊以示後世不致誤殺恐毫釐有差千里懸隔矣傷寒論中或曰四逆或曰厥或曰厥逆厥冷厥寒或曰手足逆冷或曰手足厥逆手足厥寒總是逆爲不溫厥爲冷矣其中曰四逆曰手足便有分別以四字加逆字之上者是通指手足肘膝臂脛以至肩髀之言也以手足字加厥逆厥冷等上及無手足字者獨

指手足之言也本條辨證垂示曰吐利躁煩四
逆者死四逆云者四肢通冷也通冷則病重故
曰死而於治法曰手足逆冷欲死者吳茱萸湯
主之云云欲死則有可救之法故用藥仲景下
字徃徃如此使粗心者觀之一槩曰厥冷之與
四逆無相遠也今就吳崑之言似無相遠以愚
詳之則死生之判在其中矣毫釐千里實謂此
也崑也編書之年三十二三血氣方剛任意駁
論聖賢罪無所禱焉啓大口曰張機氏立是方
以治少陰厥陰之寒也固矣不曰少陰病吐利
煩躁四逆者死乎可憐可憐含血噴天而不自

量也。謂機者，張公之諱也。固云者，俗語謂之「固」也。不又曰以下十五字，似悔張公戲言也。以張公立方之祖爲「陋」，何不遠求，拘縻而求備於一人乎？○再述愚所稱鑿王救世者論有云：少陰病下利，脈微者，與白通湯，利不止，厥逆無脈，乾嘔煩者，白通加豬膽汁湯主之。服湯，脈暴出者，死微續者，生。成氏註曰：服湯，脈暴出者，正氣因發泄而脫也。故死。脈微續者，陽氣漸復也。故生。當斯時也，借使越人診之，則不試藥而逃焉。所以謂薩埵救世者，服湯，脈暴出則死，脈微續乃生者，是生死之判斷之際，一藥而外則病家歸。

罪於醫乃必然之情也於斯時不顧名望只欲治病故諄諄垂教非菩薩而何且吳崑泛覽吳茱萸湯所以考藥亦不精也愚試贅之治傷寒之法以保陽氣爲主故用人參以保宗氣生薑大棗辛甘相合以輔榮衛之氣三氣雖有輔保陰邪不散則無以還元故假吳茱萸辛苦溫熱有毒之物直入少陰驅散寒邪而兼溫胃健脾之功也寒散厥復溫脾胃健運則吐利止三氣復正則煩躁亦定耳寒邪散見證平則去吳茱萸只須本方三種補養阿誰敢曰不可

白通湯

蔥白

四莖

乾薑

炮

兩

附子

炮

一枚

少陰下利者此方主之○少陰屬腎水藏也得天地閉藏之令主禁固二便寒邪居之則病而失其體矣故下利蔥白所以通陽氣也薑附所以散陰寒也是方也能散陰而通陽故即蔥白而名曰白通

白通加人尿猪膽汁湯

蔥白

四莖

乾薑

一兩炮

附子

一枚炮

人尿

五合

猪膽汁

一合

少陰下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者此方主之服湯脉暴出者死微續者生○少陰下利脉微此少陰有真寒也故與白通湯散陰復陽若利不止厥逆無脉乾嘔煩者乃寒盛格

拒乎陽，藥不能達於少陰，而陽逆亂于上，故也。加人屎豬膽者，取其苦寒與陰同類，可以引薑附入拒格之寒，而調其逆。內經曰：必同其氣，可使平也。正此之謂。入腹之后，冷體既消，熱性便發，病氣隨去，煩嘔皆除，情且不違，而致大益。此奇正相伏之兵也。惟明者知之。其服湯，脈暴出者，正氣因發泄而脫也。故死。脈微續者，陽氣漸復也。故生。

附子湯

附子

炮二枚

茯苓

去皮

芍藥

炒各三兩

人參二兩

白朮

炒四兩

少陰病，口中和，背惡寒者，此方主之。少陰病，身體

痛手足寒、骨節痛、脉沈者，亦此方主之。○傷寒以陽為主，上件病皆陰勝幾於無陽矣。辛甘皆陽也，故用附木參苓以養陽。辛溫之藥過多，則恐有偏陽之弊，故又用芍藥以扶陰。經曰：火欲實，水當平之。此用芍藥之意也。

四逆湯

甘草

二兩

乾薑

半兩

附子

一枚

煎成冷服

太陰自利不渴，陰證脉沈身痛，與夫厥逆下利脉不至者，此方皆主之。○論曰：自利不渴屬太陰，太陰主水穀，病故自利。內有真寒，故不渴。陰證者，舉三陰而言，則又非獨太陰矣。病在裏，故脉沈。寒則

血脈凝澁故身痛四肢受氣於裏裏寒則陽氣不能宣布於手足故四肢厥逆而冷下利亦是裏寒脈不至者寒極而脈藏伏也經曰寒淫於內治以甘熱故用甘艸薑附大熱之劑申發陽氣祛散陰寒能溫經煖肌而回四逆因以名湯焉然必涼服者經曰治寒以熱涼而行之是也否則戴陽者反增上燥耳目口鼻皆血者有矣藥之難用也有如此

乾薑黃連黃芩人參湯

乾薑

炮

黃連

炮

黃芩

炮

人參

去苗各三兩

○連芩之炮一本作炒

傷寒誤吐下寒氣內格食入口即吐者此方主之

○不當吐下而吐下之故曰誤吐下如用梔子瓜
蒂之類以吐又用承氣之類以下其性皆寒誤用
之則損中氣中氣既虛且寒便惡穀氣故食入口
即吐入口即吐者猶未下咽之謂也用乾薑之辛
熱所以散寒用人參之甘溫所以補虛復用苓連
之寒苦者所以假之從寒而通格也經曰有假其
氣則無禁也正此之謂自非深得經旨胡能通其
變耶

當歸四逆湯

當歸

土六

桂枝

芍藥

炒各
三兩

細辛

土去

甘草

炙

通草

各二
兩

大棗

二十
五枚

論曰傷寒脉滑而厥者裏有熱也白虎湯主之手
足厥寒脉細欲絕者當歸四逆湯主之○滑陽脉
也故其厥爲陽厥乃火極似水乾之上九亢龍有
悔之象也故用白虎白虎者見前若手足厥寒脉
細欲絕則非白虎所宜矣手足厥寒責陽氣外虛
不溫四末脉細欲絕責陰血內弱脉行不利陽氣
外虛故用桂枝細辛以溫其表陰血內弱故用當
歸芍藥以調其裏通艸通其陰陽太棗甘草和其
榮衛是證也自表入裏雖曰傳至厥陰始終只是
陽證與寒邪直中三陰不同故不用吳茱萸附輩
而用桂枝湯加當歸細辛通艸爾明者自得之