

小兒科痘症雜治驚風

增輯
足本大字驗方新編

上海啟新書局
印行

驗方新編總目

卷一

頭部

面部

眉部

目部

耳部

鼻部

唇部

口部

舌部

齒部

鬚部

下頰

頸項

咽喉

卷二

肩部

手部

腋部

乳部

胸部

肋部

卷三

心部

肺部

各種氣痛

咳嗽

勞傷吐血

哮喘

卷四

脾胃

痰疾

三消

飲食積滯

噎膈

反胃
吐附
嘔

呃逆

卷五

肚腹

痞疾

蟲疾

鼓脹

脇部

背部

腰部

卷六

前陰

小便

淋症

遺精

卷七

後陰

大便

泄瀉

痢疾

脫肛

痔瘡

卷八

兩股

海底

腿部

足部

卷九

婦人科

調經

崩帶附

種子

胎前

產後

雜治

難產良方

卷十

小兒科

雜治

驚風

痘症

痲症

卷十一

癰毒

癰毒諸症

癰毒雜治

癰毒諸方

陰疽

陰疽治法

陰疽諸症

陰疽諸方

陰疽治驗

內外備用諸方

卷十二

急救

凡吊頸割喉腹破腸出溺水凍死雷擊痰厥氣閉一切急症皆在此內

解救諸毒

誤吞諸物

烟酒醉傷

卷十三

人畜蛇蟲咬傷

湯火傷

跌打損傷

刑杖傷

銅鐵竹木雜物入肉

卷十四

中風

筋骨皮膚病附

傷寒

感冒風寒

卷十五

中暑

痧症

霍亂

瘧疾

黃疸

瘟疫

蠱毒

卷十六

諸血

諸汗

邪怪

奇病

藥物備要

雜治

卷十七

咽喉

咽喉七十二症圖

卷十八

痧症全方

驗方新編卷十目錄

小兒科雜治

初生去毒開口法

保嬰各法

歧真人兒科秘法

夏禹鑄審小兒顏色苗竅法

兒科外治法

指紋切要

稀痘並免驚風

初生面紅啼哭不止

晝啼不止

夜啼不止

曲腰啼哭

遍身奇癢叫啼不止

初生遍身發黃

初生遍身紅赤

初生無皮

週身脫皮

兩腿生瘡脫皮

身如蛇皮鱗甲

初生身如魚泡如水晶

瘡似楊梅破爛有孔

紅絲瘤

顙門腫大

頭縫不合

初生眼目紅赤腫爛

小兒關眼

小兒變蒸

兩腮腫硬

口角生瘡

口流涎水

口腫並生馬牙

口生白點

初生小兒或兩腮腫硬或口内生瘡或生馬牙或重舌木舌蛇舌吐舌及

口不開不食乳等症

重舌

木舌

舌忽脹大腫硬即時氣絕

蛇舌

吐舌

頸軟

痰喘有聲

喉嘶聲啞

小兒病後口不能言

兒不食乳

吐乳

缺乳

斷乳

龜胸

龜背

並治龜胸

腹痛

肚腹脹大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鳴如蛙聲

肚臍腫出

臍內膿血不乾

預防臍風

臍風

小兒中惡以及痰閉火閉

氣閉乍然卒死

小兒初發瘧疾

氣喘

吐瀉

暑月水瀉

小兒痢疾

初生陰囊過大

忽然陰腫

陰囊赤腫

陰囊腫墜光亮啼哭

陰縮入腹

陽物腫痛

初生小便不通

小便數日不通遍身腫滿

大小便不通

初生大小便出血

夜睡遺尿在床

初生糞門閉塞

足趾向後

疳疾

胎毒

小兒科驚風

驚風論

慢驚

慢驚治驗

急驚

小兒科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

發熱

形色

起脹

養漿

收結

痘毒

痘症諸方

治驗

辨痘法

看耳法

避穢氣法

暑月出痘

冬月出痘

出痘兒睡不可驚動

二十四頂方

推拿法

痘疔

舌上痘疔

赤斑核

痘出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目

閉面青唇白氣息俱涼

熱症方形虛症又現元氣

本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出不快

上身痘已起脹下身痘尚

未出或出而陷下不起

痘不起漿

痘症黑陷不起

兩頭痘

蛇皮痘

空倉痘

茱萸痘

血泡痘

白漿痘

漏痘

蛙痘

瑠璃痘

草尾珠痘

黑痘

頭面頸項諸痘

眼中生痘

免痘入眼

出痘眼目紅腫

出痘症眼有膿血

出痘眼痛

舌與鼻孔有痘

出痘縮舌

舌上有痘

舌上爛痘

出痘口噤不語

出痘腎腫

腎嚢有痘

陰戶有痘

痘症夾斑夾丹夾疹而出

痘出不透腹痛黑陷

出痘中風

雜痘一齊湧出

驗痘出齊法

痘症作癢

痘中生蛆癢不可忍

痘症發熱胡言亂語

痘齊熱退愛睡地上日夜不安

狂熱痘毒麻木致死

皮肉紅腫而痘不腫

痘症潰爛膿水淋漓

痘症泄瀉

痘症小便不通

痘症大便不通

痘症耳目口鼻出膿 痘風餘毒入目致生翳筋膜或成珠目蠅眼

痘後風眼或起翳赤紅 痘風眼邊紅爛作癢

痘後兩目難開 痘後耳內腫痛時流膿血

痘後鼻常流涕作臭 痘後唇不蓋齒 痘後唇口生瘡

痘後齒癢或出血 痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳

痘後口角流涎 痘後咽喉腫痛 痘後昏迷亂語

痘後聲啞 痘後心痛不可忍 痘後肚腹腫脹

痘後浮腫 痘後癰毒初起紅腫 痘毒色白

痘後遍身無皮膿水不絕 痘後蟲蝕疳瘡

痘風瘡逢春即發 孕婦痘症 發熱

見點 灌漿 墮胎

產後出痘 引牛痘說 堅信洋痘說

經驗小兒月內出痘神方歌訣 浴兒免痘

不出天花經驗方

小兒科麻症

麻症論

麻症與傷寒辨

論麻痘輕重

麻症四忌

麻症治法

麻發不起

麻症作癢

新增麻伏變症

驗方新編卷十

小兒科雜治

初生去毒開口法

小兒初離母體口有液毒形如血塊啼聲一出隨卽嚥下而毒伏於命門他日發為驚熱瘡疾惡瘰等症須於未啼時急用絲棉裹指挖去口內濁穢以清

臍

又方 新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府以甘草細切少許

將潔淨細絹包裹用滾開水泡浸蓋內不宜太甜乃用軟帛裹指蘸汁徧拭

口中去其穢濁隨用

胡桃肉

一名核桃核

去皮研極爛以稀絹或薄紗包如小棗

納兒口中任其吮汁吮盡方可食乳非獨和中且能養臟最佳法也○又方 熟

軍

枳壳

歸尾

生甘草

各五分

紅花

三分

桃仁

三分

此藥須早預備兒初

生時卽以水一茶鍾煎至半鍾以新棉花一塊放藥水內泡透取出裹指上

納兒口中吮之再泡再吮不吮則已過片時小兒解下黑糞再與吮之以糞

色不黑為止此藥必於下地六個時辰內服之服後方可食乳此方最能去

毒免疾有益無損○又方 凡小兒落地時燒橄欖核一枚存性研末硃砂

五

和勻嚼生芝蔴一口津吐和藥絹包如棗核大安兒口中待啞一時頃方

可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾出痘亦稀少也○又方 淡豆豉

甘草

錢各三

濃煎汁屢屢與食以一酒盃為度其毒自下又能助養脾氣且免

驚風○又方 若母體氣素寒小兒清弱者及產時收生遲慢致受風寒者

兒必面色晃白唇色淡紅只以淡薑湯服之最能去胃寒通神明並可免吐瀉之患此法最妙人所未知服後仍照各前方治之

保嬰各法

凡天寒孩兒生下不哭或已哭不響宜急用衣物包裹再用香油紙撚將臍帶艾火炙斷使暖氣入腹漸漸作聲而活倘或剪斷臍帶氣絕死矣

有悶臍生者兜囊門有一膜閉住其氣故不能出聲當以手微拍之則膜破而能哭如拍之不破須用女人之輕巧者以銀簪輕輕挑破或不能挑者急用暖衣緊抱勿令散放用藥水浸其胞衣天寒則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦

兒生三日有於髮際中間灸者乃灸其風路也然此法因西北地土多寒故宜若東南地土多溫斷不宜灸

兒生次日即看口中上腭有白泡點子即以銀針輕輕刮破將泡內白米取出

勿令落入喉中仍以陳墨擦之如次日不取則泡堅難破悞事又有馬牙在
牙齦上白點如碎米亦須急急挑出以墨擦之間日再看再生再挑

兒生三日相傳洗三若受風寒臍風由此而起雖夏日亦宜避風冬日尤慎之
又慎況初生亦宜戒浴欲其勿受外邪也

兒生下時欲斷臍帶必以蘄艾一小丸用香油浸濕薰燒至焦方斷其束臍須
用軟棉帕裹束勿令兒尿濕臍此預防臍風第一要法

小兒臍帶落下即用淨板刷洗將臍帶取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡
取出安置新瓦上用碗蓋之存性研為細末將透明硃砂研末水飛過加臍
帶灰四分用硃砂二分和勻蜜糖拌塗乳婦乳頭上令兒吮食使穢氣胎毒
即從大便遺下箇箇保全此延生妙法臍帶內有蟲當去之

小兒初生兩乳必有核子以散為度否則腫硬成毒啼哭不已如初生洗浴時
即將兩乳揉去乳汁其核自消

小兒初生每日用茶加鹽少許蘸拭其口二三次此法至穩至妙世多忽之不
知兒之胎毒從粘涎中拭去可免疳腮馬牙驚口重舌木舌等症至簡至易
之良方也倘兒面唇色淡以淡薑湯代茶鹽湯可也

月內小兒不可聞啼卽抱一啼便乳須常令啼哭則胎中所受熱毒從此而散胎中驚氣從此而解期月之間無重舌木舌口喎胎風胎熱之病

小兒同母睡時切忌鼻風口氣吹兒顙門恐成風疾

初生小兒形骸雖具筋骨甚柔氣質未實猶之木之柔条軟梗可使或曲或直或俯或仰也故百日之內不可豎抱豎抱則易於悲驚且必頭傾項軟有夭柱倒側之虞半歲前不可獨坐獨坐則風邪入背脊骨受傷有龜背偃僂之疾慎之

兒生兩月後若遇晴和天氣令乳母抱兒時見風日則血氣剛強肌肉緻密可耐風露若厚衣煖被藏於重幃密室則筋骨軟脆不任風寒多易致病所以貧兒堅勁無疾富兒柔脆多灾譬諸草木方生以物蓋緊密不令見風日雨露則萎黃柔弱矣

小兒衣裳須七八十歲老人舊衣改作令小兒多壽雖富貴之家切不可新製綾羅縫裳凡受客宴賀尤戒殺生

小兒四五個月內只與吃乳六個月後方可哺稀粥週歲以前切不可吃葷腥油膩生冷兩三歲後纔與葷腥切忌食肉太早食後不可與乳乳後不可與食

凡哭笑之後莫即與乳

洗浴當護兒背風寒皆自背心入防成癰風故兒忌多浴洗浴又須掩好肚臍勿令潮濕恐生撮口臍風倘臍中有濕將大紅呢燒灰摻上紮好

小兒無病切忌服藥免致舛錯誤事

小兒衣服自初生至十歲不可夜露易惹邪祟又有烏名天地如一名隱飛鳥最喜陰雨夜過落羽人家庭簷置兒衣中令兒成癰病如衣經夜露可即用醋薰之

剃頭須就暖處剃後用薄荷

分三杏仁去皮尖

搗爛入生麻油三四滴和勻拌頭

上擦之可避風邪

剃頭宜丑寅日吉丁未日凶

小兒四五歲只會叫人不能言語以真赤小豆

查藥物要備

研末酒調塗於舌下二

三次即能說話

岐真人兒科秘法

山根之上有青筋直現者乃肝熱也柴胡半夏

各三分

白芍茯苓

各一錢

當歸

白朮

各五分

山查肉

三粒

甘草

一分水煎服

山根之上青筋橫現者亦肝熱也但直者風上行橫者風下行亦用前方多
加柴胡一分加麥芽一錢乾薑一分有紅筋直現者乃心熱也亦用前方

加黃連一分麥冬五分桑白皮三分天花粉二分去半夏不用

有紅筋斜現者亦心熱也亦用前方加黃連二分去半夏不用蓋熱極於胞中
也或加桑白皮花粉

黃筋現於山根或皮色黃者不論橫直總皆脾胃之症或水瀉或上吐或下瀉
或腹痛或不思飲食今定一方皆可服之無不神效 白朮 茯苓各五分

陳皮 黨參 麥芽各二分神曲 甘草各一分水一鍾煎半酒盞分二次服有

痰加半夏一分或白芥子三分或花粉三分有熱若口渴者加麥冬三分黃苓一分

有寒加乾薑一分如吐者加白豆蔻一粒瀉者加猪苓五分腹痛如小兒自家

捧腹是須用手按之大叫呼痛者乃食積也加大黃三分枳實一分如按之

不痛不呼號者乃寒也再加乾薑三分如身發熱者此方不可用

夏禹鑄審小兒顏色苗竅法

內有五臟心肝脾肺腎也五臟不可望惟望五臟之苗與竅 舌乃心之苗紅

紫心熱也腫黑心火極也淡白虛也 鼻準與牙牀乃脾之竅鼻紅燥脾熱