

真登治裁
類言

卷七

類證治裁卷之七

丹陽林

男 夢 奉 校

腸鳴論治

腸虛則鳴。寒氣相搏。或火激其水。腸亦鳴。經曰。中氣不足。腸爲之

苦鳴。宜六君子湯加炙。又曰。脾虛則腹滿。腸鳴。飧泄。食不化。香砂

子湯加。神麴。又曰。腸中雷鳴。上衝胸。邪在大腸。半夏瀉。又曰。土鬱之發

腸鳴而爲數後。平胃散加茯苓。又曰。熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝

胸。葶藶木。香散。如臍寒有水。理中湯加桂苓。車前。胃寒洩瀉。智半。下氣暫止復鳴。

益中。湯。火激動其水。二陳湯加。苓。連。山。梔。

頁登台戔
卷之七
腸鳴

附方

六君子湯 見一卷中風

補中益氣湯 見一卷中風

香砂六君子湯 六君子湯加 木香 砂仁

半夏瀉心湯 見一卷溫

平胃散 朮 樸 陳 草

葶藶木香散 二苓 朮 澤 桂 爲五苓散再加 葶藶

理中湯 參 朮 薑 草

智半湯 益智仁 半夏各五分 蒼朮四錢 防風二錢

益中湯 參 朮 芎 連 薑 枳 草

氣下瀉泄寒藏淫熱鬱土痞胸泄飧舉升虛氣

動痰

二陳湯

陳

夏

苓

草

小大腸癰論治

小腸在臍之左

關元穴屬小腸

患癰則左腿不能伸

天樞穴屬

大腸

患癰則右腿不能伸。部位雖分爲病相似。治亦畧同。故金匱千

金概名腸癰也。其症小腹痞腫。按之痛。小便數似淋。發熱時自汗

出。復惡寒。身皮甲錯。腹皮急如腫狀。脉遲緊者。膿未成。可下之。

桃仁

承氣湯

脉洪數者。膿已成。

大黃牡丹湯

膿從瘡出。或有出臍者。惟大便秘下

膿血者。自愈。按小便數似淋。或小便出膿血者。爲小腸癰。大便出

膿血者。爲大腸癰。膿從臍中出者。爲盤腸癰。多不治。此症總因濕

毒瘀血結滯腸內而成。其始發熱惡寒。小腹滿痛。反側不便。或腿

縮難伸。卽腸廔確候。其腹皮急。按之濡。不煩渴者。屬陰寒。

牡丹散內托十

宣散其小腹痞堅按之痛而煩熱者屬結熱。大黃牡丹湯或脉遲緊則膿
尚未成急解毒。通腸飲或大黃煎若脉滑數則膿已成宜排膿。太乙膏如
脉洪數小腹脹痛不食溺澀為膿壅滯宜疏通。薏苡仁湯有瘀血小
腹硬痛。四物延胡湯若腹濡痛時下膿由元氣虛宜排膿藥中兼補益
丹皮或潰後痛甚淋膿不止由氣血大虧須峻補。參耆地黃湯凡患腸
瘻者不可驚驚則腸斷而死坐臥轉側宜徐緩飲食不宜過飽庶
可保生。

腸瘻脉候

腸瘻之脉滑而數滑則為實數則為熱滑則為營數則為衛衛數
下降營滑上升營衛相干血為敗濁。脉經關內逢乳腸裏瘻。脉訣

附方

桃仁承氣湯

見一卷疫

大黃牡丹湯

大黃 芒硝各一錢半 枳實 丹皮 桃仁 各二錢半 一方有冬瓜仁 服下有膿即出

無即下血

牡丹皮散

參 耆 苓 丹 薏 芷 歸 芎 天麻 桃仁各一錢 官桂 甘草各五分 木香三分

內托十宣散

參 耆 歸 芎 防 芷 桔 樸 桂 草 爲末調以酒下三錢

通腸飲

忍冬藤 歸尾 角刺 花粉 乳 沒 芷 薏 草 或用黃占礬爲丸

大黃煎

大黃 樸硝各一錢 丹皮 白芥子 桃仁各二錢 下後以參耆補托

太乙膏

見六卷胃脘痛

排膿散

耆 歸 防 芷 蕪 翹 草 銀花 甲片各一錢

補峻瘀血滯膿

薏苡仁湯

薏仁

薏仁各三錢

丹皮

桃仁各三錢

四物延胡湯

當歸

延胡各一錢

芎

芎

生地各五分

參耆地黃湯

參

耆

芎

地

丹

黃肉

山藥

薑

腸癰

李氏寒熱脉數少腹左偏痛引內膈數日一更衣左足不伸此小腸癰也蓋小腸火腑由氣血壅滯經隧發爲癰毒宜先徹其在裏瘀熱則痛勢緩而癰內消用大黃三錢硝石一錢歸尾二錢赤芍二錢桃仁一錢數服痛減次用乳香甘草節金銀花連翹當歸木瓜薏米牛膝數服而消

疝氣論治

疝氣者小腹墜痛。控引睪丸。見症於肝。而原於任脉。故經謂任脉

為病。男子內結七疝。女子帶下瘕聚。任起中極之下。上毛際循腹裏上關元。故疝為任病。瘕聚

即婦人經言七疝。衝狐厥癰瘕瘻瘰也。經云。從少腹上衝心而痛。

不得前後。為衝疝。言氣上衝心。二便不通。能上而不能下。木香散。又

云。肝所生病。為狐疝。言卧則入腹。立則入囊。仲景用蜘蛛散。後人用二香丸。又云。

黃脉土脉之至也。大而虛。積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。言脾受肝

克。氣逆上升。寶鑑當歸四逆湯。苦楝散。又云。三陽為病。發寒熱。其傳為癰疝。言

小腸膀胱之邪。傳為癰疝。囊丸腫大如栲栳。頑痺不仁。三層茴香太荔枝散。

又云。脾傳之腎。病名疝瘕。少腹冤熱而痛。出白。言脾失運化而傳

於所勝則癥聚成形痛出白淫。烏頭梔子湯。加橘核桃仁吳萸。又云足陽明之筋

病癰疝腹筋急。又云肝脉滑甚為癰疝。言肝木乘胃或至潰膿下

血。荔枝橘核湯。橘核散。又云腎脉滑甚為癰瘰。又云厥陰之陰盛脉脹不通。

為癰瘰疝言內裏膿血外小便閉。加味通心散。此內經所謂七疝也。金

匱論疝者主寒。至巢氏分厥。厥逆心痛。氣積寒。食冷。氣。乍滿。臍旁

腑。臍下。腹。痛。引。陰。七疝。張子和非之。別列寒水筋血氣狐癰七

種。謂諸疝不離乎肝。以肝脉絡陰器故也。其曰寒疝囊冷如石陰

莖不舉。寶鑑當歸。四逆湯。水疝。囊如水晶。濕癢出水。加味五苓散。去筋疝。

莖痛筋急或挺縱不收。龍膽瀉肝湯。血疝。狀如黃瓜。在小腹兩旁。復元

散。氣疝。上連腎下及囊。因怒氣脹。氣。疝。飲。狐疝。癰疝。治同。丹溪云。自

素問而下。皆以疝為經絡有寒。收引則痛。不知始由濕熱壅遏在
 經。又感外寒。濕熱被鬱。不得疏散。故痛。蓋醉飽則火起於胃。房勞
 則火起於腎。大怒則火起於肝。大勞則火起於筋。火鬱濕生。濁液
 凝聚。迷入血隧。流於厥陰。肝性急速。為寒所束。宜其痛矣。宜枳實
桃仁山
梔吳黃山 若濕勝成癰疝。加荔
枝核 痛甚。加鹽炒
大茴香 痛處可按。加
桂 土材論
 寒則多痛。熱則多縱。濕則腫墜。虛亦腫墜。在血分者不移。在氣分
 者多動。皆足補前人所未備。今按疝症初起。必由虛寒勞力致之。
 積久腑絡阻痺。遂聚濕熱。用藥不離辛泄苦降。以肝司疏洩也。其
 觸寒驟痛。兼犯生冷。用荔
香散 若火注陰分。而為熱痛。必有熱症熱脈。
 或便閉渴煩。宜大分
清飲 若食積疝痛。近臍必有塊梗起。立效
散 瘀血疝

痛在腹必有形不移。金鈴子散加因怒動肝脇脹必墜入腹。宜木

皮山梔香附舉重傷力氣虛必下穿囊。舉元煎火腑留邪內行苦

歸鬚青葱管洩胃苓湯加枳。腎囊流濕外用湯熏。以蛇床子川椒熟礬煎湯熏

壳山梔黃蘗小茴未拌勻絹袋盛。氣聚絡虛理須疏導。宜延胡山甲木香歸

安腎囊下冷則易之虛濁逆法在溫通。宜乾薑吳萸荻房勞疝發溫攝下元。宜杞子沙

子荻荅鹿角膠荇蓉當歸。筋結疝癰治同木腎。宜穿山甲全蠍木瓜葶藶荻荅

少腹偏墜散結為先。香橘散加穿山甲或穿陰丸腫大逐濕可效。

荔枝核十枚煨研火酒調如糊服效。別有小腸氣名曰氣瘕痛引腰臍。天台烏膀胱

氣名曰水瘕不得小便。加味五又如奔豚響疝是氣水衝突下焦

丹溪用理中湯去朮加桂心荻荅。或一捏金散。或木通川棟各一

錢茴香五分飛鹽酒調服。○丹溪云桂能泄奔豚荻荅能伐腎邪

若白朮則助土克水。九癰兒疳。畢丸由啼哭動傷陰器。導氣湯或用全蠍一

燥腎閉氣。故宜去之。錢核桃肉一兩。蜜。大約疳氣上攻者。宜吳黃桂心枳下墜者。宜川

丸彈子大。日一丸。大約疳氣上攻者。宜吳黃桂心枳下墜者。宜川

香附。橘核。木。按之大痛者為實。宜查肉延胡青皮不痛者為虛。宜參

香。葫蘆。巴等。按之大痛者為實。宜查肉延胡青皮不痛者為虛。宜參

芥。歸。杞。非。痛處寒者必寒積。宜川烏胡椒官桂痛處熱者必濕熱。

子。核。桃。等。痛處寒者必寒積。宜川烏胡椒官桂痛處熱者必濕熱。

宜山。梔。川。棟。木。通。荻。苓。莖。縮。者。宗。筋。受。寒。宜虎潛丸去知藥或鹿

橘。核。蒼。朮。厚。樸。黃。蘗。等。莖。縮。者。宗。筋。受。寒。宜虎潛丸去知藥或鹿

等。子。腎。疳。者。客。邪。在。腎。酒。煮。當。歸。丸。卵。大。小。上。下。不。常。者。屬。氣。分。聚。香。飲。去。

肉。桂。囊。腫。脹。堅。頑。不。移。者。屬。血。分。橘。核。丸。若。結。蓋。疳。之。上。攻。者。衝。病。

下。注。者。任。病。偏。墜。者。小。腸。病。閉。癰。者。膀。胱。病。卵。癰。出。白。者。腎。病。餘。

則。筋。急。囊。腫。痕。聚。濁。逆。肝。胃。病。為。多。日。久。沈。痼。虛。滑。正。氣。陷。邪。氣。

留。行。立。穿。囊。頑。不。知。痛。下。焦。路。遠。藥。力。難。到。遂。成。宿。疳。迄。乎。無。子。

疳氣

疳氣

疳氣

疳氣

疳氣

丹溪云。不痛斷房事及厚味。不可治。信夫。

疝氣脉候

心脉搏滑急爲心疝。肺脉沈搏爲肺疝。腎脉肝脉大急沈皆爲疝。
肝脉滑甚爲癰疝。心脉微滑爲心疝。腎脉滑甚爲癰癧。脉急
者曰疝。瘕小腹痛。內經疝瘕積聚。脉弦急者生。虛弦小者死。經脉寸口
脉弦而緊。弦緊相搏。則爲寒疝。正傳脉弦急搏皆疝。弦數宜清熱。弦
緊宜溫經。兼浮宜汗。兼實宜下。弦細爲寒濕。弦濡爲濕熱。醫通

附方

木香散

木香 陳皮 良薑 訶子 乾薑 枳實 各一錢

半草豆蔻 黑牽牛 川芎 各一錢 水煎

蜘蛛散

蜘蛛十四枚微炒 桂心五分爲末 每服一錢白湯下

疝 狐 疝 衝