

名
醫
疑
問
集
一

複製說明

本館所藏孤本名醫疑問集系不著撰人的
清康熙間精抄本一函六冊約九萬字該書以學
生提問作者答疑的形式就常見疾病與疑難病
症詳細加以闡述如病理立法處方等每病各有
病例每方各備君臣佐使之品次序井然全書全
無前人用方足見為作者多年臨床經驗之總結
經查有著書目均未見收載是一部很有學術研
究價值和臨床實用價值的珍本醫籍為茲據館

藏中醫古籍實行祖國醫學文獻資源共享特用
宣紙復印函套綫裝以利研閱和流傳

浙江中醫學院圖書館

一九八七年九月

上卷

中風 中腑 中臟 中經 中寒 中暑 溫症 燥症 火症
氣症 血症 痰飲 鬱症 發熱 惡寒 傷風 咳嗽

名醫疑問

名醫疑問目錄

上卷

中風門一

中臟門三

中寒門五

濕症門七

火症門九

血症門十一

鬱症門十三

惡寒門十五

中腑門二

中經門四

中暑門六

燥症門八

氣症門十

痰飲門十二

發熱門十四

傷風門十六
即冒風

咳嗽門十七

名醫疑問集

中風門

疑問。若言中風、邪必由皮膚肌表、透入腑臟、方可云中。如何純無頭疼、
體熱、畏風、惡食、諸表症何也。蓋中之一字、說有而實無、說無而實有。
即余臨症三十載、內發者十居八九、外中者十之一二、以愚見比量此
中字、當作射中之中字、解說。譬如有人被暗箭中傷、其力必重、其勢
必深之義。經謂賊風虛邪、譬之暗箭、避之有時、以防暗箭之中傷耳。
蓋風之一字、若說果有外感風邪、定然有表症之發、熱、頭痛、惟中風
之風、不拘東南無西北有、即有賊風虛邪之所觸者、十無一二、為虛風
所鼓、一時暴發者、十居八九、實非外來之風邪、外來之風邪、人、得而。

之當有畏風惡寒、頭疼作熱之症現矣。然中風之病出，其不意乎。然而發與外感之風絕不相干。實表虛為邪，外觸為標。

疑問百病之中，何獨中風為甚。此風字既非外來之風，獨先聖冠諸病之首，畢竟風從外入，風從內發，是真象是惜境。經云：人之氣以天地疾風名之于天地之風，独不可以氣言也。然天地之氣有和風、賊風、狂風，為害不一。在人之風氣，必有正氣、邪氣、亂氣，為病不等。今言中風之風，當以氣字之義比量。庶真類不分，而自晰矣。于和風，天地感之發育萬物；于狂風，草木觸之以挫折；于賊風，人冒之則致病；于正氣，人身藉之以榮衛百脉；于邪氣，表裏因之而受病；于亂氣，腑臟犯之而絕生。

疑問：又云血虛者為左癰，氣虛者為右癰。論氣運則血流，氣血周流一身何

独左有血而無氣右有氣而無血独右無死血左無濕痰其說果否蓋
 癰者舉動艱難也癰者不能移換也經云榮氣與宗氣並行于十二
 經脈之中導引血脈者也蓋左有十二經右有十二經共二十四經皆由督
 脈所分腹有任脈一經全藉宗氣營氣衛氣營衛導引血脈得以流
 通流通則機關便捷若營衛之氣偏閉于左則左癢若營衛之氣偏
 絕于右則右癢于理相合凡氣虛則氣滯在血脈不能運動盡可為死血
 若氣虛則氣閉而精液凝結不能滋潤盡可為濕痰萬不可偏執左為
 死血右為濕痰

疑問常見形作肥厚神色充滿富貴安逸之中者十居其半貧賤勞碌辛
 苦瘦弱之人中者十無一二若中風何不独中作薄辛苦之人而偏中

富貴安逸之人舊時只聞五旬之外者中今則三十左右亦能中何也大
凡形作肥厚于神氣必不能維持所以平日之間言談則氣短行動則氣
喘如此形氣常患此病貧賤辛苦之人形動志苦衣食不敷何暇于酒
色惟辛苦勞役晝夜匪寧血脈流通機閱捷利中若故少舊時天地之氣
運和人稟充足必待衰朽而中今則天地生意甚薄人稟亦弱氣之調攝
失宜故少年夭化中也

疑問治療之法當從古方當從時論或另有新義否

蓋古方時論無書不有即下文已備悉不須多贅只以平日對症用藥已
有效驗者繫附于後下文依次而叙只以新久虛實補瀉調和方治以備擇用

中府門

中府者經謂六府不和則四肢偏癱云六府非六府齊病身一角二府不和方病或六府皆不和而病何謂不和在元氣或虛或實遂致經絡有盛有衰偏左偏右致有半身不遂諸症故先哲有云脾土太過至土實而氣壅疾徒使經絡閉塞隧道不通而偏癱者謂之有餘假疾氣火而偏于盛也治從實治新者宜瀉久者宜和達者清補

疑問有云中府者肢作偏癱外顯六經形症論十二經如何只言六經受病以其六經受病故只半身不遂即

若論中府豈有表諸經不病之理左右各有十二經病則俱病不病則俱不病先聖只言六經者独指足三陽足三陰所關陰陽蹻陰維陽維之

六經故有不遂之病第六府在內經絡在肌理顏色顯外麗而詳察隨
症之虛實新久治之可也

脾土不及至土薄而氣虛肝木偏勝而剋制血脈枯澁經絡不能貫通而
偏廢者謂之不足因氣血兩虛而偏于衰也治當新治新者宜調久者宜補達
者宜溫補

中府之脈

脈來緩滑或浮滑或浮數有神者易治或弦滑或浮數或洪大者難治按屬
有餘以緩法瀉之若兩尺不應寸關轉大而急疾者不治

中府實脈

浮弦無力為風浮滑不清為痰浮數有力為火沉弦有力為氣沉實有力為

便結沉澁而數為血凝

中府實症

氣壅痰結口眼喎斜語言雖清而寒溫心境雖明而恍惚先癱右瘓亦有四肢
無恙惟麻木而舉動艱難大便秘結燥胃中否滿口角流涎面或青或白或有汗無汗
中府治法

初中一日内如胃中痰壅先宜吐宜痰後不宜再吐即當以順氣消痰清熱之
劑疎利表邪大便秘至三五日竟以下劑和之如表病漸緩七日後以平劑和
之如至七日後全休相安宜以補劑安之

吐劑如痰涎壅滯閉不清者吐之吐中自有疎散之義

稀涎散明礬 枯礬各一錢 猪牙皂角炙黃生皮二錢 為末每服一二錢白湯調

服探吐不盡再吐後即用後方

中府寔症治表之方 順氣消痰者風清熱不怕氣虛血虛先服此劑急治其標
天麻三錢為君 半夏二錢 橘紅錢半為臣 防風一錢 枳實二錢為佐 胆星六分
水煎十分加姜汁五匙乃服十匙不拘早晚日服二劑天麻為平肝者風清痰
定暈之聖藥故以為君 半夏祛痰之要品故以為臣 胆星為使而清之橘
紅順氣理痰所必用佐以枳實而利之防風之辛使疎風散表 方內加黃
芩五分 甘草二分為使黃芩之苦以瀉熱和肝諸藥走散故用甘草以緩之如
因節痛而惡風加羌活錢防風五分如熱盛加黃連五分 犀角五分
下劑如大便久結腸胃不和面紅煩渴急宜下之

潤下丸 治大腸熱結燥屎難行者 大黃枳實黃芩 朴硝 厚朴以蜜為

九桐子大不拘時白湯服三錢不利再服

礞石滾痰丸

治痰壅否膈熱結便秘上下不通者

治中脘實症平劑之方

此方照前方減去防風之年枳實之苦胆星之煨加

之牛膝秦元以和血菊夜黃苓以清熱枳壳狀苓以理脾胃不補不瀉謂

之平也

天麻二錢

半夏錢半

秦元錢半

白茯苓錢

橘紅一錢

牛膝一錢

枳壳一錢

菊花五分

黃苓五分

甘草玄

姜一片水煎午後空心服

治中脘實症清補之方

此方照前方減去枳壳之釋滯加當歸佐牛膝秦元菊夜

以補血清火謂之清補

天麻二錢

秦元一錢半

當歸錢半

半夏錢半

白茯苓一錢

牛膝一錢

橘紅一錢

菊花五分

甘草玄

車前子五分

姜一片水煎空心臨卧服

中府虛脈

沉而無力為虛脈沉滑而濡緩濕痰不和氣滑血少虛微無力為氣血兩虛
浮數微滑為內熱有痰俱易治若沉濡不應則氣滯血凝虛弦虛數乃無枯尚
熱浮滑不清是風痰內鼓浮濡無力則榮衛不行俱難治兩尺絕無下元已絕
寸關虛鉅而空大真氣已散或舉之轉大按之絕無乃孤陽無依必死無疑

中府虛症

神志昏倦失癰右癱面赤氣喘自汗煩躁不思飲食腸鳴泄瀉寢不安眠
不安痰声如錐口角流涎顏色不定

中府虛症治法

初則以清劑先理心肺次則和血清熱寧神調氣理痰久則調補氣血遠則大補精神

中府虛症治法之方

以其氣虛佐茯苓白朮以健脾以其血虛佐秦艽川芎以和血痰氣不清者
以天麻臣以橘半風熱未省便以荆防甘草

天麻三錢 橘紅錢半 半夏錢半 白茯苓一錢 秦艽一錢 防風五

荆芥五 甘草二 白朮一錢 川芎五

水煎加薑汁五匙竹瀝十匙和勻早晚日服二帖

吐刺 如胃次有痰結否滿不消于三日之前不妨吐微

桔梗二錢 人參一錢 牙皂五粒炒去

水煎十分加食鹽二錢一次熱服二以雞毛探吐不盡再服一貼

中府虛症平刺標本兼治之方