



石室秘錄目錄

山陰陳士鐸遠公甫敬習

義烏

金以謀孝芭  
李祖脉子永甫參攷

卷一

正醫法

反醫法

順醫法

逆醫法

內治法

外治法

完治法

碎治法

大治法

小治法

偏治法

全治法

生治法

死治法

上治法

中治法

下治法

先治法

後治法

急治法

緩治法

本治法

末治法

不內外治法

陰治法

陽治法

假治法

卷二

真治法

男治法

女治法

虛治法

實治法

寒治法

熱治法

通治法

塞治法

解治法

欽治法

升治法

墮治法

開治法

閉治法

吐治法

泄治法

王治法

霸治法

倒治法

縛治法

肥治法

瘦治法

摩治法

浴治法

達治法

發治法

奪治法

深治法

淺治法

短治法

日治法

夜治法

氣治法

血治法

臟治法

腑治法

常治法

變治法

初治法

終治法

耑治法

分治法

同治法

異治法

勞治法

逸治法

吸治法

引治法

單治法

雙治法

立治法

卧治法

饑治法

飽治法

卷三

富治法

貧治法

產前治法

產後治法

老治法

少治法

東南治法

西北治法

皮毛治法

肌膚治法

筋脉治法

溫治法

清治法

收治法

散治法

軟治法

堅治法

抑治法

揚治法

痰治法

火治法

靜治法

動治法

春夏治法

秋冬治法

奇治法

平治法

奇治法奇音鶴

耦治法

形治法

氣治法

春夏治法

近治法

久治法

暫治法

奇治法奇音鶴

明治法

輕治法

重治法

遠治法

得治法

意治法

傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

六論氣色

七論脈訣

八論強弱

九論寒熱

卷四

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘疹門

錢真人傳痘瘡神方

岐天師又傳治回毒歲久不愈方

岐真人傳兒科秘法

長沙真人張冒傷寒方  
傳治小兒感

兒痢

雷真君親傳活人籙

傷寒門四十條

中寒門六條

中暑門九條

水濕門九條

熱症門三條

燥症門

內傷門三十四條

血症

腹痛

喉痛

氣鬱

癲症

狂症

呆病

厥症

斑疹

亡陽

痢疾

五絕

砒毒

虎傷

湯火傷

癰疽併無名瘡毒

石室秘錄目錄

目錄

卷一

正醫

肺經生癆  
腎兩陽脹滿  
久嗽服氣  
水瀉  
血痢  
水

先治

腿癆  
膝風  
多骨癰  
囊癰  
騎馬癰  
外感初起  
傷寒初起

後治

風邪作喘  
中寒  
中氣喘  
非外感  
腹痛  
心卒痛  
內傷

急治

大便不通  
小便不通  
夜卧不睡  
產婦感中風邪

緩治

火吐  
火瀉  
火渴

反醫

發狂見鬼  
摔倒不知人  
中風墮地

本治

心驚不安  
精滑夢遺  
見色倒戈

末治

瘧症不已  
產婦感中風邪

不內外治

跌仆斷傷

順醫

胃虛  
腎氣喘上逆  
雙蛾

陰治

腎虛感寒  
水虧夜熱

逆醫

肺癆  
陽虛大吐  
陰虛癆

陽治

傷寒發班  
中暑大熱

陽治

陽症火瀉

內治

肺癆  
陽虛  
陰虛

假治

假熱  
假寒

小治

中氣不順  
上焦之疾

卷二

真治

真熱  
真寒

男治

狐疝  
強陽不倒

女治

瘻陽不振  
風邪入血室

全治

脾不化  
食滯  
吐血  
治頭  
痛  
膀胱

虛治

氣虛  
血虛

生治

花癩  
羊癩

實治

治實邪

死治

中邪  
尸厥  
中毒  
中惡

寒治

吐血  
衄血  
目睡

上治

眉落  
烏髮  
瘡瘍  
目生星

熱治

心寒  
腎寒  
胃弱

中治

統治諸癥

奪治

水腫腹脹  
肘腫

通治

下病下通治  
大瀉通治

塞治	氣虛中滿 飽食嘔塞	深治	病入膏肓
解治	結胸內傷肝鬱	淺治	骨髓腦中
斂治	亡陽頭汗下血	長治	痿症腹痛背脊骨痛
升治	陽虛下陷陰虛下陷	短治	筋肉拔晴痙病
墮治	腹痛三症	日治	附子理中湯大承氣湯
開治	開隔戶廁	夜治	四逆湯
閉治	交感脫精夢遺壅塞	氣治	附子理中湯大承氣湯
吐治	痰塊壅塞	血治	夜發寒熱
泄治	內傷諸症	臟治	心腎同治
王治	飲食難消	腑治	肺經獨治
霸治	大渴大渴	小便閉塞	大便結
倒治	發背癰腫	胆怯	膽虛吐嘔
縛治	瘡水淹死	常治	頭痛日痛
肥治	肺癰開刀	變治	傷寒變結胸
瘦治	兩手不能伸	終治	中暑變亡陽
摩治	口眼歪斜	初治	論反胃變噎膈
浴治	止手汗	火病初治	中風變症
達治	大丹痧疹	火病初治	傷風初治
發治	疏通肝邪	火病初治	傷寒初治
異治	中溫傷寒	火病初治	傷濕初治
勞治	中暑久坐	火病初治	燥病初治
同治	參蘇補中益氣	火病初治	傷風初治
分治	遺精與健忘分治	火病初治	傷濕初治
	中氣與中疾分治	火病初治	燥病初治
皮毛治	瘀瘡瘍瘍	火病初治	傷風初治
肌膚治	紫白癥風	火病初治	燥病初治
	粉刺	火病初治	傷風初治
	頑瘡	火病初治	燥病初治

筋脉治

筋病

逸治 治過勞 治氣勞

吸治 治血勞

溫治 治虛勞

虛病

引治 治厥逆 治虛火

沸騰

清治 治脈燥

久瀉

單治 各症治肝

散熱

收汗

久汗

雙治 心痛治肝

散治

消痞塊

散熱

立治 腹痛治脾

軟治

法夏

散熱

雙治 腎寒治腎

堅治

抑火

肝火

心火

胃火

臥治 痘瘍治風

揚治

氣沉血滯

火

陽明胃火

老火

鐵治 僵寒治風

痰治

久病初起之痰

久病之痰

已病之痰

頑痰

卷三 寶潔宜補正氣

痰治

久病初起之痰

久病之痰

已病之痰

頑痰

富治 貧賤不可與

火治

久病初起之火

久病之火

各經之火

火

貧治 富貴人同治

靜治

解火鬱

火

產前治 子懸治胎動

動治

治手足麻木

火

產後治 橫生倒養治胎動

春夏治

春宜理氣

火

老治 老人宜補腎

秋冬治

秋宜潤肺

火

少治 少年人宜治脾胃

奇治

治奇症四十七

火

西北治 東南治

平治

脾氣虛血虛腎虛

火

耦治 雙味治病

奇治

單味治病

火

氣治 氣虛通瘀湯

氣虛痰多

火

火

氣治 氣虛痰多

氣虛痰多

火

火

五論四時

四論晝夜

三論陰陽

暗治

產門暗疾  
產門生瘡

產門生蟲

明治

治瘡毒  
頭面上瘡

久治

虛寒久治

暫治

傷風  
傷暑

傷食  
傷濕

遠治

瘻疽  
中風

食炭脹

近治

瘻疽  
中惡

心痛  
心癆

輕治

小柴胡湯

暴亡  
心痛

重治

大渴  
大瀉

腹痛欲死  
大吐

瘟疫治

陰陽脫

大汗  
大吐

得治

失治

意治

神治

傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

岐天師又傳治回毒久不愈方

岐真人傳兒科秘方

長沙張真人傳治小兒感冒風寒方

兒科  
初生  
病下  
吐  
下  
不竟  
瀉  
肚  
胎  
突出  
不肯  
食乳

六論氣色

七論脉訣

八論強弱

卷四

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘瘡門

錢真人傳痘瘡神方

石室秘錄卷之三

山陰陳上鐸遠公甫敬習

義烏金以錄孝芑甫評定  
李開泰子承甫評定

富治法

論膏梁宜補正氣

天師曰。富治者。治膏梁富貴之人也。身披重裘。口食肥甘。其腠理必疎脾胃必弱。一旦感中邪氣。每當補正為先。不可以祛邪為急。若惟知推蕩外邪。而不識急補正氣。必至變生不測。每遇此症。至半不慎也。方用太參三錢。白朮三錢。甘草一錢。陳皮五分。茯苓三錢。半夏五分。為君主之藥。倘有風邪。加桂枝一錢。或柴胡一錢。傷暑加入香薷一錢。傷食加入猪苓二錢。傷熱加入黃連一錢。傷燥加入蘇子一錢。麥冬五錢。傷氣加入白芍五錢。傷寒加入肉桂一錢。水煎服。此方之妙。妙在健脾順氣。正補而邪各退。又逐經各有加減妙法。可使膏梁之子。永無屈死矣。此富貴之善治也。

張公曰。富貴治法已駢極細微。不必再行加減。

貧治法

論貧賤不可與富貴人同治

天師曰。貧治者。落齧之民。單寒之子。不可與富貴人同為治法。故更立一門。蓋貧賤之人。其筋骨過勞。腠理必塞。斯食者也。糲無燔熬烹炙之味。入於腸胃。則胃氣健剛可知。若亦以富貴治法治之。未必相宜也。方用白朮二錢。茯苓三錢。白芍三錢。甘草一錢。半夏一錢。陳皮五分。厚朴五分。其七味為主。有風者。加桂枝一錢。或柴胡一錢。有火者。加黃連一錢。或梔子一錢。有濕者。加猪苓二錢。有燥者。加麥冬五錢。蘇葉一錢。有寒者。加肉桂一錢。有暑者。加香薷一錢。有熱者。加石膏一錢。傷米食者。加麥芽二錢。傷肉食者。加山楂二十粒。傷麵食者。加蘿蔔子一錢。以此方加減。無不神效。此行賤治法。實有圓機。顆要醫術之。

張公曰。貧賤治亦同。實無可傳。非好隱也。

產前治法

論橫生倒養 論漏胎 論胎動

天師曰。產前之症。俱照各門治之。惟有子懸之症。最難治。其次漏胎。又其次。是胎動。更有可畏者。是橫生倒養。不可不急請也。子懸之症。乃胎熱而子不安。身欲起立於胞中。故若懸起之象。其實非子能懸用也。若非氣盛。

下之立死矣。方用人參二錢、白朮五錢、茯苓二錢、白芍五錢、黃芩三錢、杜仲一錢、熟地一兩、生地三錢、歸身二

錢水煎服。此方純是利腰臍之聖藥，少加黃芩清之，則胎得寒子自定。况方中滋補有餘，而寒涼不足，定變扶危中含深意。蓋胎繫於腰腎之間，而胞又結於衝任之際。今藥皆直入於內經之中，則深根固蒂，子即欲動而不能，況又用清子之藥，有不泰然於下者乎？○其次漏胎，乃氣血不足之故，急宜以峻補之。則胎不漏，方用人參二錢、白朮五錢、杜仲一錢、枸杞子一錢、山藥二錢，當歸身一錢、茯苓二錢、熟地五錢、麥冬二錢、北五味五分、山茱萸二錢、甘草一錢，水煎服。此方不寒不熱，安胎之聖藥也。凡有胎不安者，此方安之，神效。胎之動也，由於男女之顛狂。今補其氣血，自然鎮定，又何至漏胎哉？○胎動即漏胎之兆，亦以此方治之，無不神效。○難產如橫身倒養，此死亡頃刻也。若無急救之法，何以成醫之聖？然而胎之不順，由於血氣之虧。血氣既虧，子亦無力，往往不能轉頭，遂至先以手出，或先脚下矣。倘手足出，即以針刺兒手足，則必驚而縮入，急用人參一兩、當歸三兩、川芎二兩、紅花三錢，速灌之，少頃則兒頭直而到門矣。倘久之不順，再將前藥服之，不可止也。若兒頭既已到門，久而不下，此交骨不開之故，速用柞木枝一兩，當歸二兩、川芎一兩、人參一兩，煎湯服之，少頃必然一聲响亮，兒即生矣。真至神至奇之方也。倘兒頭不下，萬萬不可用柞木枝，蓋此味最開交骨。兒未回頭而兒門先開，亦死之道，故必須兒頭到門，而後可用此方也。此產前之法，必當熟悉於胸中，而後臨事不致倉皇。

張公曰：產前無白帶，也有則難產之兆。即幸而順生，產後亦有血暈之事。方用黑豆三合，煎湯二碗，先用一碗入白果十個，熟地一兩、山茱萸四錢、茯苓三錢，澤瀉二錢、丹皮二錢、山萸四錢、薏仁四錢、紅棗二十個，加水二碗，煎服一劑。二劑永不白帶。湯通治婦人之諸帶，無不神效。○小產之症，非產前也，然非正產之症，亦可作產前治。如人不正產而先產者，名曰小產。雖無大產之虛，而氣血亦大傷矣，宜急補之，則日後坐胎，不至再有崩漏。用人參五錢、白朮五錢、茯苓三錢、熟地一兩，當歸五錢、杜仲二錢、炮姜五分，水煎服。此方乃補氣補血之聖方。胞動而下，必損帶脉，補其氣血，則帶脈損處可以重生。他日受孕，不至有再損之虞也。

華君曰：治法與余同。然尚有二方，未傳一漏胎也。胎動方，白朮一兩、熟地一兩，水煎服。此方妙在用白朮以利腰臍，用熟地以固根本。藥品少而功用專，所以取效神也。此方可以救貧之人，一天師留以待

予傳世立功甚矣。天師之恩德大也。方各黑白安胎散。○漏胎方亦奇絕。用白术五錢熟地一兩。三七根末三錢水煎服。此方妙在三七根末乃止血神品。故用之奏效如响。此方更勝安胎之藥。方名止漏絕神丹。雷公真君曰。難產婦人之常。生子而反至死母。仁人所痛心也。但難產非兒之橫逆。實母之氣衰以致兒身不能回轉。於是手先出而足先墮矣。一見此等生法。絕勿驚惶。我有至神之法。口中念無上至聖化生佛。百遍免之手足。即便縮入。急用人參一兩附子一錢當歸一兩川芎五錢黃芩一兩煎湯飲之。兒身即順。立時而下。蓋參芪補氣。歸芎補血。氣血既足。兒易舒展。何必服催生之藥哉。倘不補氣血。而用催生墮胎之藥。必致轉利轉虛。不殺母必殺子矣。

胎動是熱。不動是寒。熱用黃芩。寒用砂仁。寒熱相兼並用砂仁黃芩。世不察寒熱。專以黃芩砂仁為安胎聖藥。亦謬矣。橫生倒產。獨參湯最妙。世醫不知也。至胎衣不下者。令常服參湯。或加入砂仁數分。服二三日。則其衣自下。李子永識。

### 產後治法

論產後宜補

天師曰。產後之病。不可枚舉。終以補氣補血為主。余未嘗不可定方。而概治之也。產後往往血暈頭痛。身熱腹疼。或手足逆而轉筋。或心腸痛而吐嘔。風邪入而變為陰寒。或涼氣侵而直為厥逆。皆死亡定於旦夕。而危急亂於須臾也。此時若作外症治之。藥下喉即死。可不慎歟。方用人參五錢。白朮五錢。熟地一兩。當歸二兩。川芎一兩。荆芥末炒黑二錢。此方為主。有風感之加柴胡六分。有寒入之加附子一錢。肉桂一錢。其餘諸症俱不可亂加以此方服之。無不神效俱可。或加分兩。而不可去取藥味。蓋產婦一身之血盡行崩下。皮毛腠理如紙之薄。邪原易入。然亦易出也。故以大劑補氣之中。畧加驅邪之藥。少粘氣味。邪則走出於軀壳之外。烏可照平常無病之人。慮其邪之難散。而重用逐邪之方也。此方之妙。純是補氣補血之品。全不顧邪。蓋於輔正。正氣既多。邪氣自遷。况方中原有荆芥之妙劑。不特引氣血各歸經絡。亦能引邪氣各出皮毛。此方之所以奇而妙。妙而神也。惟有見食作痛。手按之少痛者。加入山楂十粒。桃仁五個可也。一劑即去之。餘藥萬不可輕用增入也。問熟地三日內可服否。一日何嘗不可服也。

張公曰。產後是方。最定得妙。無可再傳方也。  
華君曰。與余忌併傳子如產後諸症。以補氣血主。方用人參三錢。當歸一兩。川芎五錢。荆芥炒黑一錢。益母草一錢。水煎服。有風加柴胡五分。有寒加肉桂一錢。血不淨加三查十粒。血量加炒黑姜片五分。鼻中衄血加麥冬二錢。夜熟加地骨皮五分。有食加山楂五粒。穀芽一錢。有痰少加白芥子五分。餘斷斷不可輕入。此方純補氣血而不治表。所以為妙。予親治產後無不神效。不知天師何故不傳此方。而另傳方與遠公想因氣數之薄。而此方尚欠力量也。然亦可並傳於古云。

老治法

論老人宜補腎

天師曰。老人之氣血既衰。不可仍照年少人治法。故食多則飽悶。食少則困餒。食寒則腹痛。食熱則腸燥。此老人最難調治。而醫士用藥不可不知其方也。丸方莫妙用六味丸。加麥冬三兩。北五味子一兩。與之嘗服。則腸無燥結之苦。胃有能食之歡。此方之妙。竟可由六十服至百年。終歲不斷常服。蓋老人氣血之虛。盡由於腎水之涸。六味丸妙在極補腎水。又能健脾胃之氣。去腎中之邪火。而生腎中之真陽。所以老人最宜也。然而老人最不肯節飲食。又將何以治之。余今新定一方。可以純治傷食多痰之症。方用人參五分。茯苓一錢。白芥子一錢。麥冬三錢。薏仁五錢。山藥二錢。陳皮三分。麥芽五分。山楂三粒。神曲三分。蘿蔔子三分。甘草五分。水煎服有火者。加元參二錢。有寒者。加肉桂五分。有痰者。加半夏五分。有食者。加三查。麥芽有濕者。加澤瀉一錢。有暑者。加香薷五分。有燥者。加麥冬五錢。蘇葉五分。不眠者。加棗仁一錢。脹痛者。加白芍三錢。心痛者。加梔子一錢。咳嗽者。加桔梗一錢。腰痠者。加熟地五錢。杜仲五錢。足無力者。加牛膝一錢。餘可不必再加。老人之方。如此可悟也。

張公曰。老治之法。最平穩而妥當。不必再立方也。

華君曰。無。

更有一方。治老人不寐最妙。用六味地黃丸一料。加麥冬四兩。炒棗仁五兩。黃連三錢。肉桂五分。當歸三兩。白芍五兩。甘菊花三兩。要家菌自種者。白芥子二兩。為末。蜜為丸。每日白滾水送下五錢。服後用飯。此方老人可服至百服。

少治法

論少年人宜治脾胃

天師曰少年人血氣方剛不可動用補血必看其強弱如何而後因病下藥自然無差方用厚朴一錢茯苓三錢陳皮一錢甘草一錢半夏一錢砂仁三粒車前子一錢此方為主而逐症加減自易奏功畏寒者傷寒也加桂枝一錢畏風者傷風也加柴胡一錢畏食者傷食也加麥芽三錢山楂二十粒傷酒者加乾葛二錢畏濕者傷濕也加猪苓澤瀉各一錢惡熱者傷熱也加石膏一錢畏暑者傷暑也加香薷一錢發多者加半夏一錢天花粉一錢餘可照症加之也此治少年之方法亦非無意蓋管其脾胃則諸藥雖加而不傷胃氣故易奏功人不可易視之也

張公曰少治法亦妥妙不必再為加減

東南治法

論補中益氣湯

天師曰東南治法東方之人與南方之人同治也東南俱係向明之地腠理疏泄氣虛者多且天分甚薄不比西北之人剛勁若照西北人治法治之立見危殆矣方用人參一錢白朮二錢當歸一錢五分黃芪三錢柴胡一錢升麻五分陳皮五分甘草一錢此補中益氣湯也以此方出入加減無有不妙加減法照老少貧富法治用之

張公曰東南治法以補中益氣湯加減俱得其妙不必再言

西北治法

天師曰西北人賦質既堅體亦甚拙冷水冷飯不時常用始覺快然一用熱劑便覺口鼻雙目火出故治法與東南人迥別方用黃連三分黃芩一錢梔子一錢陳皮一錢枳壳一錢厚朴一錢甘草一錢麥芽二錢水煎服有食加山楂三十粒傷食加大黃一錢有痰加天花粉三錢傷風加柴胡二錢傷暑加香薷三錢傷熱加石膏五錢怒氣傷肝加白芍五錢餘俱照病加減可也此治西北人又如此因其強而多用消導之品也

張公曰西北治法尚可斟酌倘健者可加大黃一錢

華君曰無

治皮毛法

論疥瘡 白癩 風

論黃水瘡 治瘡 痘瘍

天師曰皮毛治法者。感輕之症。病未深入營衛。故從皮毛上治之也。如病疥瘡。黃水瘡。瘡是也。此等症不必用湯藥。疥瘡用輕粉一錢。油胡桃末三錢。不可去油。猪板油三錢。白微末二錢。防風末一錢。蘇葉一錢。搗成圓如彈子大。擦瘡處一日即愈。○黃水瘡。凡毒水流人何處。即生大水泡瘡。即為黃水瘡。手少動之即破。此熱毒鬱於皮毛也。當以湯洗之即愈。方用雄黃五錢。防風五錢。二味用水十碗。煎數沸。去渣去汁。洗瘡上即愈。○瘡瘍。以暑氣傷熱而生也。有雪水洗之更佳。隨洗隨滅。如不能得有一方最妙。用黃瓜切成片。擦之即愈。此皆從皮毛治之。

張公曰。凡人生白癩風。與紫癩風者。乃暑熱之時。人不知而用日晒之手巾。擦其身中之汗。便成此病。雖無害而最難愈。方用蒼耳子一兩。防風三錢。黃芪三兩。各為末。水打成丸。米湯每日早晨送下三錢。一料服完必愈。神方也。紫白癩俱效。

肌膚治法

論膿窠瘡 粉刺

論頑癬

論凍瘡

論坐板疥瘡

天師曰。肌膚有獨同。是皮毛而各有治法。肌膚之病。從腠理而當較皮毛畧深。如入膿窠瘡。粉刺。頑癬之類。是也。然皆氣血不和。故蟲得而生焉。活其氣血。則病自愈。膿窠瘡。用當歸三錢。熟地三錢。白芍三錢。生地三錢。麥冬二錢。天門冬三錢。川芎一錢。茯苓三錢。甘草一錢。柴胡一錢。人參一錢。白朮三錢。黃芪五錢。荆芥一錢。薏仁五錢。水煎服。此方妙在血氣補血之藥。而畧用柴胡。荆芥以發之。先服四劑。必然瘡口盡加膨脹。作膿。四劑後去柴胡。加丑味子五粒。又服四劑。則滿身之瘡。如掃而愈矣。○粉癥之症。乃肺熱而風吹之。多成此症。雖無關大病。然書生嬌女。各生此病。亦欠手致。我留一方為之添容。未為不可。方用輕粉一錢。黃芩一錢。各為細末。蜜調為丸。於每日洗面之時。多擦數遍。臨睡之時。又重洗面而擦之。不須三日。自然消痕減癬矣。○惟有頑癬之方。最難治理。然一經我治。亦易收功。方用練樹皮白微一兩。輕粉三錢。冰片一錢。生甘草一錢。蝸牛三錢。火焙乾。有壳亦可用杜大黃根一兩。各為細末。先以荔枝殼扒碎。其瓣皮。而後以此藥末。用麻油調擦之。三日即結。厭而愈。此皆治肌膚之法。可以為式。

張公曰。凍瘡乃人不能耐寒而肌膚冷死忽遇火氣乃成凍瘡。耳上凍瘡必用手去溫之。遂成瘡也。方用黃犬屎露天入者變成白色。用炭火煅過為末。再用石灰陳年者妙。各等分。以麻油調之敷。且雖成瘡而爛敷上。即止痛生肌神方也。若耳上面上雖凍而不收口者。必用此藥止消。荆芥煎湯洗之三日愈。坐板瘡亦是肌膚之病。止消輕粉一錢。蘿蔔子種三錢。冰片半分。杏仁去皮六十四粒研為末。以手按之瘡口上。一日即愈。神效奇驗無以過也。

### 筋脉治法

論筋病 論脈病

天師曰。筋脉者。一身之筋通體之脈不可有病。病則筋縮而身痛。脈濇而體重矣。然脈之舒。在於血和。而脈之平。在於氣足。故治筋必須治血。而治脈必須補氣。人若筋急。拳縮僵僂而不能俯仰。立而不能直者。皆筋病也。方用當歸一兩。白芍五錢。薏仁五錢。生地五錢。元參五錢。柴胡一錢。水煎服。此方之奇。在用柴胡一味。入於補血藥之中。蓋血虧在筋病。用補血藥以治筋。宜矣。何以又用柴胡以疏散之。不知筋乃肝之餘。肝氣不順。筋乃縮急甚而僵僂。今用柴胡舒其肝脉之鬱。鬱氣既除。又復用之以大劑補血之品。則筋得其養而寬。筋寬則諸症悉愈矣。血脉不足之症。任督陰陽歸經絡不足。或毛髮之乾枯。鬢髮之膨落。或色澤之不潤。或相貌之憔悴。是也。此等之症。人以為氣之衰也。誰知血之竭乎。法當補其血。而血不可驟補也。須緩緩補之。當歸一錢。白芍三錢。川芎一錢。熟地四錢。白菜五個。何首烏三錢。桑葉七片。水煎服。此湯即四物湯。妙在用白菜以引至皮毛。用何首烏以引至髮髮。則色澤自然生華。而相貌自然發彩矣。此治脈之法人亦宜知。

張公曰。筋脉之治。予尚有二奇方傳世。用當歸三錢。芍藥一兩。熟地二兩。柴胡亦錢。白朮五錢。肉桂五錢。白芥子一錢。水煎服。此方乃腎肝同治之法。筋雖屬肝。而滋肝必責之腎。今大補其腎。又加之舒肝之藥。而筋有不快。然以養者耶。○脈治法。當歸一兩。白芍三錢。生地三錢。麥冬三錢。熟地一兩。萬年青三分。枸杞子二錢。旱蓮草一錢。花椒三分。天冬三錢。水煎服。此方藥味俱是補血之品。而又上走於面。久服自然髮髮變黑。容顏潤澤矣。可與天師法並傳也。

華君曰。無。烏鬚我有絕奇之方。世間方甚多。皆不能取效於旦夕。我之奇方。不須十天保汝。重為烏黑。熟

地三兩何首烏三兩。用生不用熟。用紅不用白。用圓不用長黑。芝麻一兩炒熟。年青二片桑葉二兩。白菓三十個。桔梗三錢。各為細末。不可經鐵器為丸。每日早飯後服一兩。十日包鬚烏黑。乃余自立之方。治人親驗者也。岐天師加花椒一錢。此方奇絕。華君不畏洩天機耶。

溫治法

論虛病

天師曰。溫治者不可用寒涼。又不可用辛熱。不得已復用溫補之藥以中治之。如人病虛癆。四肢無力。飲食少。思悶。心驚悸。失血之後。大汗之後是也。此等各症俱不可用偏寒偏熱之藥。必須溫平之品。少少與之。漸多默奪。庶幾奏效。倘以偏師出奇。必有後熱。方用熟地五錢。白木五錢。茯苓五錢。白芥子五分。山藥三錢。枸杞子一錢。當歸一錢。棗仁五分。麥冬一錢。神曲三分。芡實二錢。水煎服。此方去煎之藥居多。使健脾利氣。養精生血。既無偏熱之虞。又鮮偏寒之慮。中和純正。久之可服。濕去則脾氣自行。血足則精神自長。此溫治之所以妙。

張公曰。溫治法妙。予亦有一方可存。熟地五錢。山藥一錢。茯苓一錢。甘草一錢。女貞子一錢。麥冬三錢。當歸二錢。菟絲子一錢。棗仁一錢。遠志八分。山藥一錢。陳皮三分。砂仁一粒。覆盆子一錢。水煎服。此方不熱不涼。補腎肝肺脾心之五。而無偏重之憂。可以溫治者。幸留意於此方。華君曰未傳。

清治法

論脉燥

天師曰。清治者不可用涼藥。又不可用溫補。乃改用清平之劑。故曰清治。此等病必是肺氣之燥。肺金之氣一燥。即有意外之虛。若不急治。必變成肺痿。肺癰等症。蓋燥極成火。自宜用涼藥矣。此不可涼藥者。何。肺居上流。用涼藥以寒散。或藥不能遞入於肺中。勢必趨於脾胃。肺之熱未除。而胃口反成虛寒之症。必致下瀉。瀉久而胃口無生氣矣。胃既無生氣。又何能生肺金。而養肺氣哉。故不若用清平之味。平補胃口。而上清肺金之氣之為得也。方用元參三錢。麥冬五錢。桔梗一錢。天門冬一錢。甘草一錢。紫苑一錢。欵冬花一錢。貝母一錢。蘇子一錢。水煎服。此方皆一派清平之品。而耑入肺金之妙劑也。久服。胃既不寒。而肺金得養。又何肺痿。肺癰之生哉。故人久咳不已。即當敬服此方。萬勿惑於時而用偏寒之藥也。

張公曰。清治法方最妙。予不能贊一詞。不留方。

收治法

論久嗽久瀉久汗

嗽神丹

水神丹

天師曰。收治者。氣散而收之也。如人病久嗽不已。久瀉不已是也。久嗽者。人無不為邪之聚也。日日用發散之劑而不效者何。氣散故耳。氣散矣。而仍用散藥。無怪乎經月而不效也。法當用收斂之藥一二見功效也。方中用人參一錢。白芍三錢。酸棗仁一錢。北五味子一錢。麥冬五錢。蘇子一錢。益智仁五分。白芥子一錢。一劑輕。二劑全愈。後服六味地黃丸加麥冬三兩。北五味子一兩。服之不再發。否則不能保其不發也。蓋久服散藥。盡真陰。雖暫用收斂之藥。一時奏功。而真陰既虧。腠理不密。一經風邪。最易感人。此必然之勢也。服地黃丸。水足而肺金有養。腠理自密。又何患重感風邪哉。○大瀉之後。必多亡陰。亡陰既多。則元陽亦脫。若不急為收止。則陰絕陽亡可立而待。法當用止塞之品。或疑邪未盡去。如何止住其水。萬一邪居中州。則腹心之患。不可不慮。其言則是。其理則非。吾言大溫者。乃純是下清水。言利下也。非利無止法。豈瀉水亦無止法乎。故人患水湯者。急宜止遏。方用白朮五錢。茯苓三錢。車前子一錢。北五味一錢。吳茱萸五分。酸棗仁一錢。水煎服。此方止藥少於補藥。健脾去濕水性分消。不收而自收也。若純以栗殼以滯止之。而不分消其滯。天之勢則阻滯。一時勢必潰決。反生大害矣。○大汗之病。陽氣盡隨汗而外越。若不急為止抑。則陽氣立散。即時身死。法當以大補之。剝煎飲一線之氣可留。而大汗可止。方用人參一兩。或黃芪一兩。代之當歸一兩。北五味一錢。桑葉七片。急為煎服。此方即補血湯之變妙。在補氣藥多於補血。使氣旺。則血自生。血生汗可止。况方中加五味子以收汗。加桑葉以止汗。有不相得益彰者乎。倘以大汗之人。氣必大喘。不可以參芪重增其氣。純用補血之品。未為無見。然而血不可驟生。氣當急固。不顧氣徒補血。未見功成。此似是而非。又不可不急辨之也。此收法宜知。醫可不細加體認乎。

張公曰。俱論得暢而妙。吐瀉無可再言。惟久嗽之法。吾意即宜以六味地黃湯加麥冬五味治之。似宜不必先用人參以救肺氣之害也。然而天師用之必有深意。他日再敬記之。

大汗症多係陽脫。有用大劑參附湯者。李子永識

散治法

論散藥