

本草綱目

草部

卷之五
第六冊

本草綱目草部目錄第十二卷

草之二 山草類下三十九種

黃連

本經

胡黃連

開寶

黃芩

本經

秦艽

本經

紫胡

本經

前胡

本經

防風

本經

獨活羌活

本經

當歸

綱目

都管草

圖經

升麻

本經

葛參

本經

白鮮

本經

延胡索

開寶

貝母

本經

山慈姑

嘉祐

石蒜

圖經

水仙

會編

梔子

本經

地筋

州錄即
管茅

芒

拾遺

龍膽

本經

細辛

本經

杜衡

本經
木細辛附

荳蔻

別錄

鬼督郵

唐本

徐長卿

本經

白薇

本經

金朱

別錄

草犀

拾遺

擎股

海藥

吉利草

綱目

硃砂根

綱目

辟虺雷

拾遺

錦地羅

綱目

紫金牛

圖經

拳參

圖經

鐵線草

圖經

金絲草

綱目

右附方舊七十一新二百一十四

本草綱目草部第十二卷

草之二

山草類下三十九種

黃連

本經釋名王連

藥性時珍曰

其根

集解別錄曰黃連生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根弘景曰巫陽在建平今

上品

經

連珠而色黃故名

集解西間者色淺而虛不及東陽新安諸縣最勝臨海諸縣者不佳用之當布衣接去毛

令如連珠保昇曰

苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連珠今秦地及杭州柳州者

佳頌曰

今江湖荆夔州郡亦有而以宣城九節堅重相擊有聲者為勝施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗高一尺以來葉似甘菊

四月開花黃色六月結實似芥子色亦黃江左者根黃連珠其苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊

始堪采采曰蜀道者粗大味極濃苦療渴為最江東者節如連珠療痢大善澧州者更勝時珍曰黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥

而堅者為善唐時以澧州者為勝今雖吳蜀皆有惟以雅州眉州者為良藥物之興廢不同如此大抵

有二種一種根粗無毛有珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜

根修治

段曰凡使以布拭去肉毛用漿水浸二伏時漉出于柳木火上焙乾用時珍曰五臟六腑皆有火平則治動則病故有君火相

根治火之說其實一氣而已黃連入手少陰心經為治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽

之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸

炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨為之引導益辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨為之引導益辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之

氣味

別錄曰微寒

舊曰神農岐伯黃帝雷公皆無毒李當之小寒之才曰黃芩龍骨理石為之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白

芩

鹽鐵畏欽冬牛膝勝烏頭解巴豆毒權曰忌豬肉惡冷水

段曰服此藥十兩不得食豬肉若服至三年一生不得食也時

珍曰道書言服黃連花猪肉令人泄瀉而方家有猪肚黃連丸猪臍黃連丸止忌肉而不忌臍腑乎

主治熟氣曰痛臂傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰腫痛久服令人不忘

本經主

元

元

元

元

元

元

元

元

臍疾冷熱之下洩澼腹血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益臍療口瘡

別錄治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸躁潤心肺長肉止血下行

熱疾止盜汗并瘧疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲

大羸瘦氣急

藏治鬱熱在中煩躁惡心元元欲吐心下痞滿

素主心病逆而盛心病

熱疾止盜汗并瘧疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲

大羸瘦氣急

藏治鬱熱在中煩躁惡心元元欲吐心下痞滿

素主心病逆而盛心病

熱疾止盜汗并瘧疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲

大羸瘦氣急

藏治鬱熱在中煩躁惡心元元欲吐心下痞滿

素主心病逆而盛心病

熱疾止盜汗并瘧疥猪肚蒸為丸治小兒疳氣殺蟲

大羸瘦氣急

藏治鬱熱在中煩躁惡心元元欲吐心下痞滿

伏梁好古去心竅惡血解服藥過劑煩悶及巴豆輕粉毒

時珍發明

元素曰黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經其用

暴發五也止中部見血六也張仲景治九種心下痞五等瀉心湯皆用之成無己曰苦入心寒勝熱黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱
蛻得甘則動得苦則安黃連黃蘖之苦以安蛻也好古曰黃連苦燥苦入心大就燥瀉心者其實瀉脾也實則瀉其子也襄亨曰黃連去
中焦濕熱而瀉心大若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之以猪膽汁拌炒佐以龍膽草則大瀉肝膽之火下痢胃口熱禁口者
用黃連人參煎湯終日呷之如吐再強飲但得一呷下咽便好劉完素曰古方以黃連為治痢之最益治痢之宜辛苦寒藥辛能發散開
通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宣平而已諸苦寒藥多泄惟黃連黃蘖性冷而燥能降火去濕而止瀉痢故治痢以之為君宗奭曰今
人多用黃連治痢蓋執以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之又不顧寒熱多少惟欲盡劑由是多致危困若氣實初病
熱多血痢服之便止不必盡劑虛而冷者慎勿輕用某曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火凡諸瘡宜以黃連當歸為君甘草黃芩為佐凡耶暴發
赤腫痛不可忍者宜黃連當歸以酒浸煎之宿食不消心下痞滿者須用速枳頌曰黃連治目方多而羊肝凡尤奇異今醫家洗眼以黃
連當歸芍藥等分用雪水或甜水煎湯熱洗之冷即再溫甚益眼目但是風毒赤目花翳用之無不神効蓋眼目之病皆是血脉凝滯使
然故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也韓愈曰火分之病黃連為主不但瀉心火而與芩蘖諸苦藥列稱者此也比目疾
人以人乳浸蕎或點或服之生用為君佐以官桂少許煎百沸入蕎空心服之能使心腎交於頃刻入五苓滑石大治夢遺以黃土薑汁
酒蕎四炒為君以使君子為臣白芍藥酒蕎為佐廣木香為使治小兒五疳以茱萸炒加木香等分生大黃倍之水丸治五疳此皆得制
方之法也時珍曰黃連治目及痢為要藥古方治痢香連丸用黃連木香薑連散用乾薑黃連變通丸用黃連茱萸薑散用黃連生薑
熱用熱因寒用君臣相佐陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝之害也弘景曰俗方多用黃連治痢及渴道方服食長生
微劉宋王微黃連讚云黃連味苦左右相因斷涼滌暑闢命輕身縉雲昔御飛蹕上是不行而至吾聞其人又梁江淹黃連頌云黃連
上草丹砂之次禦孽辟妖長靈久視驛龍行天馴馬匝地鴻飛以儀順道則利時珍曰本經別錄並無黃連久服長生之說惟陶弘景言
道方久服長生神仙傳載封君達黑穴公並服黃連五十年得仙竊謂黃連大苦大寒之藥用之降大燥濕中病即當止豈可久服使肅
殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎素問載岐伯言五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王冰註云酸
入肝為溫苦入心為熱辛入肺為清鹹入腎為寒甘入脾為至陰而四氣兼之皆增其味而益其氣故各從本臟之氣為用所以久服黃
連苦參反熱從火化也餘味皆然久則臟氣偏勝即有偏絕則有暴天之道是以絕粒服餌之人不暴亡者無五味偏助也又秦觀與喬
希望論黃連書云聞公以眼疾解黃連至十數兩猶不已殆不可也醫經有久服黃連苦參反熱之說此雖大寒其味至苦入胃則先歸

於心久而不已心火偏勝則熱乃其理也況眼疾本於肝熱肝與心為子母心火也肝亦大也腎孤臟也人患一水不勝二火豈可久服苦藥使心有所偏勝是以火救火其可乎秦公此書蓋因王公之說而推詳之也我明荆端王素多火病醫令服金花丸乃芩連危葉四味餌至數年其火愈熾遂至內障喪明觀此則寒苦之藥不但使人不能長生久則氣增偏勝速夭之由矣當以素問之言為法陶氏道書久服長生之說皆謬談也誤人最甚醫宜知之楊士瀛云黃連能去心竅惡血

附方

舊二十二心經實熱

鴻心湯用黃連七錢水一盞半煎一

卒熱心痛

黃連八錢㕮咀水煎

肝火為痛

黃連薑汁炒為末粥糊丸梧子大每服三十丸白湯下○

蓋食遠溫服小兒減之

和劑局方卒熱心痛

熱服外臺秘要月火為病

左金丸用黃連六兩茱萸一兩同炒為末神翹糊丸梧子大每服三四十九

伏暑發熱

作渴嘔惡及赤白痢消渴腸風酒毒泄瀉諸病並宜酒煮黃龍丸主之川黃連一斤易

毒發狂奔走不定宣白湯下丹溪方

骨節積熱

漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五六合浸納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸綠豆大每服二十九

煎草甘湯下易簡方

骨節積熱

經宿微煎三四沸去滓分作二服廣利方

小兒疳熱

丸用豬肚一箇洗淨宣黃連五兩切碎水和

和丸梧子大每服三十九大麥湯

消渴尿多

肘後方用黃連末密丸梧子大每服二十九下尋常渴只一服見効○易簡方

三消胃熱

黃連末以冬瓜自然汁浸一夜晒乾又浸如此七次為末以冬瓜汁

黃連五兩桔梗根五兩為末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十九日二服忌冷水猪肉○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下

濕熱水病四五丸飲下日三四服范汪方

破傷風病

黃連末密丸梧子大每服二丸至五錢酒一盞煎七分入黃蠟三錢溶化熱服之高文虎蓼花洲閑錄

宿空腹熱服臥將息一二日即止

孫真人千金備急方

赤痢之下

累治不瘥黃連一兩雞子白和為餅姜紫為末以漿水三升慢火

入麝香少許每服二錢陳米飲下佛

赤白之痢

並無寒熱只日久不止用黃連四十九箇鹽梅七箇入新

智和尚在閩以此濟人本事方

兩水二升煎一升分

冷熱諸利

胡治九益湯治下痢不問冷熱赤白穀滯休息久下惡主之黃連長三寸三十枚重一兩半龍骨如碩子三次熟服經驗方

赤白之痢

瓶內燒烟盡熟研每服二錢鹽米湯下○楊子建護命方

赤白之痢

愚用黃連黃芩各一

土上沸止又上水五合如此九上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又上九上九下度可復一升頓服即止

圖經本草

下痢腹痛以黃連一升酒五升煮取一升半分再服當止絞痛也

後治痢香連丸

李絳兵部手集治赤白諸痢裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗篩白蜜丸梧子大每服二三十九空腹飲下日再

方

服其効如神久冷者以煨蒜搗和丸之不拘大人嬰孺皆效○易簡方黃連茱萸炒過四兩木香麪煨一兩粟米飯丸○

錢仲陽香連丸治小兒冷熱痢加煨熟河子肉○

又治小兒瀉痢加煨熟肉豆蔻又治小兒氣虛瀉痢腹痛加

白附子尖

劉河間治久痢加龍骨朱丹溪治禁口痢加石蓮肉王氏治痢渴加烏梅肉以阿膠化和為丸

培四兩使君子仁培四兩廣木香二兩為末蒸餅和丸綠豆大每服三十九米飲食前下日三服忌猪肉冷水

不能食者黃連一升烏梅二十枚去核炙燥為末蠟一碁子大蜜一升合煎和丸梧子大一服二

十九日三服○又方黃連二兩熟艾如鴨子大一團水三升煮取一升頓服立止

並肘後方

氣痢後重

裏急或下泄杜玉方薑連散末收每用連一錢薑半錢和勻空心溫酒下或米飲下神妙○濟生方秘傳香連丸用黃連四兩木香二兩生薑四兩以薑鋪砂鍋底次鋪連上鋪香新汲水三盞煮焙研醋調水米糊為丸如常日服五次

小兒下痢宣連用水濃煎和蜜日服五六次○

諸利脾泄

臘毒下血雅川黃連半斤去毛切裝肥豬大腸內縫定入砂鍋中以水

子母秘錄

諸利月泄酒煮爛取連培研末搗腸和尤梧子大每服百丸米湯下極効直指

濕痢

風日夜無度及腸風下血用川黃連去毛吳茱萸湯泡過各二兩同炒香揀出各為末以粟米飯和尤梧子大各收每服三十九赤痢甘草湯下黃連丸白痢薑湯下茱萸丸赤白痢各用十五丸米湯下此乃浙西河山純老方救人甚効○局方戊己丸治脾胃受濕下痢腹痛未數化用二味加白芍藥同炒研蒸餅積熱下血

聚金丸治腸胃積熱或因酒毒下血腹痛作渴脉弦數黃連四兩分作四分一分生用一分切炒一分炮切一分水

和丸服

積熱下血浸晒研末條黃芩一兩防風一兩為末麪糊丸如梧子大每服五十九米泔浸枳殼水食前送下冬月加酒蒸大黃

一兩

楊臘毒下血黃連為末獨頭蒜搗研和尤梧子大氏家藏方月泄

每空心陳米飲下四十九

濟生方酒痔下血丸白湯下一方用自然薑汁浸培炒

赤小豆末尤

痔病祕結用此寬腸黃連枳殼等分為末糊丸梧子大每服五十九空心米飲下

良斗門方

痔病祕結大每服五十九空心米飲下

醫方大成

痔月極效經驗良方

月積食泄

川黃連二兩為末大蒜搗和

人心統

水泄脾泄神聖香黃散宣連一兩生薑四兩同文火炒至薑脆各自揀出為末水泄用薑

下活

水泄脾泄末脾泄用連末每服二錢空心白湯下甚者不過二服亦治痢疾

博濟方

吐血不止七分入豉二十粒煎至五分

去滓溫服大人小兒眼目諸病勝金黃連丸用宣連不懶多少搗碎以新汲水一大盃浸六十日綿濾取汁入原盃內重湯上熬之不性皆治簡要濟衆方目諸病攬之候乾即穿地坑子可深一尺以瓦鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火燃之以藥盪覆上四畔泥封開孔出烟盡取刮下九小豆大每甜竹葉湯下十九劉禹錫傳信方羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明及障翳青盲用黃連末一兩羊子肝一具去膜搗爛和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑瘥昔崔承元活一死囚後病死一旦崔病內障逾年半夜獨坐聞階除悉窣之聲問之答曰是昔蒙活之因今故報恩遂告以此方而沒崔服之不數月眼復明因傳於世

暴赤眼痛

○又方

苦竹兩頭留節一頭開小孔入黃連片在內油紙浸封井中一夜次早服竹節內水加片腦少許外洗之○海上方用黃連冬青葉煎湯洗之○選奇方用黃連乾薑杏仁等分為末綿包浸湯闇目乘熱淋洗之

小兒赤眼

甚妙全幼心鑑

火引風眼

輕粉少許為末

男兒乳汁和之飯上蒸過帛裹熨眼

仁存方

日卒痒痛

乳汁浸黃連頻點背中抱朴子

云治目中百病

外臺秘要

淚出不止

黃連浸濃汁漬

拭之

肘後方

牙痛惡熱止

李樓奇方

口舌

上三四次即効屢試有驗

仁存方

日卒痒痛

乳汁浸黃連頻點背中抱朴子

云治目中百病

外臺秘要

淚出不止

黃連浸濃汁漬

拭之

肘後方

牙痛惡熱止

李樓奇方

口舌

生瘡

肘後用黃連煎酒時含呷之○赴黃連

瘡散用黃連乾薑等分為末摻之

小兒口瘡

黃連蘆薈等分為末每蜜湯服五分走馬瘡

小兒鼻瘡

鼻下兩道赤色有瘡以米泔洗

者灌之斑雖發亦輕此祖方

小兒食上

取好黃土煎黃連汁搜之晒

預解胎毒

小兒初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹毒又方

祕錄

小兒月食

生於耳後黃連

同土

小兒食上

乾與食

姚和衆童子秘訣

予解胎毒

未出聲以黃連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲

也王海藏湯液本草

因驚胎

力出血取黃連末酒服方寸

七日三服

子母秘錄

妊娠

煩渴

口乾不得卧黃連末每服一錢

者灌之斑雖發亦輕此祖方

小兒食上

取好黃土煎黃連汁搜之晒

預解胎毒

小兒初生以黃連煎湯浴之不生瘡及丹毒又方

祕錄

小兒月食

生於耳後黃連

同土

小兒食上

乾與食

姚和衆童子秘訣

予解胎毒

未出聲以黃連煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲

也王海藏湯液本草

因驚胎

力出血取黃連末酒服方寸

七日三服

子母秘錄

妊娠

煩渴

口乾不得卧黃連末每服一錢

七日三服

子母秘錄

妊娠

煩渴

胃益顏色浸人乳汁點目甚良

卷治之則成瘖小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘧理腰腎去陰汗

開附方二

新一傷寒勞復

身熱大小便赤如血色用胡黃連一兩山梔子二兩去殼入蜜半兩拌和炒令微焦為末用猪膽汁和丸梧子大每服

十三傷寒勞復

十九用生薑二片烏梅子一箇童子小便三合浸半日去滓食後暖小便令溫吞之卧時再服效

蘇頌圖經本草 小

兒潮熱

柱來盜汗用南番胡黃連紫胡等分為末煉蜜丸梧子大每服一丸至五丸安

小兒疳熱

肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃

器中以酒少許化開便入水五分重湯煮二三十沸和滓服

孫兆秘寶方

之藥恐生別證以胡黃連五錢靈脂一

兩為末雄猪膽汁和丸綠豆大飲肥熱痘疾

胡黃連丸用胡黃連各半兩砂二錢半為末入猪膽內札定以杖子釣懸於砂鍋內

米服每服一二十九全幼心鑑月熱痘疾

漿水煮一炊久取出研爛入盧薑麝香各一分飯和丸麻子大每服五七至一二十丸宜未

飲下

錢乙

五心煩熱

胡黃連末米飲服

小兒黃疸

胡黃連川黃連各一兩為末用黃瓜一箇去瓢留益入華在內

一二十沸溫服

保幼大全

小兒黃疸

胡黃連川黃連各一兩為末用黃瓜一箇去瓢留益入華在內

十九普濟方

血痢不止

胡黃連烏梅肉蜜下土等分

十九

普濟方

保幼大全

小兒黃疸

胡黃連川黃連各一兩為末用黃瓜一箇去瓢留益入華在內

十九

與今所說
有小異也

根氣味苦辛無毒

別錄曰大寒言曰神農桐君雷公苦無毒字當之小溫某曰可升可降陰也好古曰氣寒味微苦而甘陰中微陽入于太陰血分元素曰氣涼味苦甘氣厚味薄浮而升陽中陰也入手少陽陽明經酒炒則上行之才曰山茱萸龍骨

為之使惡蕙實畏丹砂牡丹藜蘆得厚朴黃連止腹痛得五味子牡蠣令人有子得黃芪白欵赤小豆療鼠瘻時珍曰得酒上行得猪膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得桑白皮瀉肺火得白朮安胎

主治諸熱黃疸腸澼泄痢逐

水下血閉惡瘡瘍疎火癆本經療瘧熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸辛血閉淋露下血小兒腹痛別治毒骨蒸寒熱往來腸胃不利

破壅氣治五淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴甄下氣至天行熱疾丁瘡排膿治乳癰發背大明涼心治肺中濕熱瀉肺火上逆療上熱自

中腫赤瘀血壅盛上部積血補膀胱寒水安胎養陰退陽元治風熱濕熱頭疼奔豚熱痛火欬肺痿喉腥諸失血時發素某曰黃芩之中

珍

枯而飄者瀉肺

大利氣消痰除風熱清肌表之熱細實而堅者瀉大腸火養陰退陽補膀胱寒水滋其化源高下之分與枳實枳殼同例用有九瀉肺熱一也上焦皮膚風熱風濕二也去諸熱三也利胸中氣四也消痰膈五也除脾經諸濕六也夏月須用七也婦人產後養陰退陽八也安胎九也酒炒上行主上部積血非此不能除下痢腹血腹痛後重身熱久不能止者與芍藥甘草同用之凡諸痛瘡不可忍者宜芩連苦寒之藥詳上下分身稍及引經藥用之震亨曰黃芩降痰假其降火也凡去上焦濕熱須以酒洗過用片芩瀉肺火須用桑白皮佐之若肺虛者多用則傷肺必先以天門冬保定肺氣而後用之黃芩白朮乃安胎聖藥俗以黃芩為寒而不敢用蓋不知胎孕宜清熱涼血不妄行乃能養胎黃芩乃上中二焦藥能降火下行白朮能補脾也羅天益曰肺主氣熱傷氣故身體麻木又五臟入肺為腥故黃芩之苦寒能瀉火補氣而利肺治喉中腥臭頃曰張仲景治傷寒心下痞滿瀉心湯凡四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不止喘而汁出者有葛根黃芩黃連湯及妊娠安胎散亦多用之時珍曰潔古張氏言黃芩瀉肺火治脾濕東垣李氏言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪朱氏言黃芩治上中二焦火而張仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽證下後心下滿而不痛瀉心湯並用之成無已言黃芩苦而入心泄痞熱是黃芩能入手少陰陽明手足太陰少陽六經矣蓋黃芩氣寒味苦色黃帶綠苦入心寒勝熱瀉心火治脾之濕熱一則金不受刑一則胃火不流入肺即所以救肺也肺虛不宜者苦寒傷脾胃損其母也少陽之證寒熱胸脇痞滿默然不欲飲食心煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在半表半裏而胸脇痞滿實兼心肺上焦之邪心

煩喜嘔默不欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無己注傷寒論但云柴胡黃芩之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅斂腸胃之氣殊昧其治火之妙楊士瀛直指方云柴胡退熱不及黃芩蓋亦不知柴胡之退熱乃加後苓似與別錄治少腹絞痛利小腸之文不合成氏言黃芩寒中苦能堅腎故去之益亦不然至此當以意逆之辨以脉證可也若因飲寒受寒腹中痛及飲水心下悸小便不利而脉不數者是裏無熱證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者黃芩可用乎故善觀者先求之理毋復泥其文昔有人素多酒慾病少腹絞痛不可忍小便如淋諸藥不效偶用黃芩木通甘草三味煎服遂止王海藏言有人因虛服附子藥多病小便不利而脉不數者是裏無熱證則黃芩不可用也若熱厥腹痛肺熱而小便不利者黃芩其不可病骨蒸發熱膚如大燎每日吐痰益許暑月煩渴寢食幾廢六脉浮洪遍服柴胡麥門冬荆澤諸藥月餘益劇皆以為必死矣先君偶思李東垣治肺熱如火燎煩燥引飲而晝盛者氣分熱也宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用

附方

一十四

二

黃丸

孫思邈千金

片芩一兩水二鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯綮如鍼應桴醫中之妙有如此哉

附方

一十四

三

黃丸

方云巴郡太

守奏加減三黃丸療男子五癆七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱渴五臟大春三月黃芩四兩大黃三兩黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物隨時合擣下篩蜜丸烏豆

大米飲下每服五丸日三不知增至七丸服一月病愈久服走及奔馬人用有驗某食猪肉 圖經本草

三補丸

治上焦積熱瀉五臟大黃連黃芩等分爲末蒸餅

九梧子大每服二十九白湯下

丹溪纂要

肺中着火

清金丸用片芩

子大每服一三十劑效如景方見發 小兒驚風 黃芩人參等分爲末每服千丸

不拘大人小兒黃芩一兩淡豉三兩爲末每服三錢

九白湯下 同上

膚熱如火

炒爲末水丸梧

子大每服二三十丸白湯下

丹溪纂要

月中看火

清金丸用片芩

竇禹功亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃芩酒浸方

少陽貞

酒透晒乾爲末每服一錢茶酒任下

東垣蘭秘室藏

瘡目作痛

瘡末每服二錢茶下

潔古家珍

吐血衄血

所致黃芩一兩

去中心黑朽者爲末每服三錢水吐衄下血 黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一

錢亦治婦人漏下血

龐安時卒病論

血淋熱痛

黃芩一兩水煎

壓水不斷

芩心丸治婦人

一益前六分和滓溫服 聖惠方口吐衄下血 黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一

天癸當住每月却行或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸如

此七次爲末醋糊丸梧子大每服七十九空心溫酒下日二次

瑞竹堂方

崩中下血

黃芩爲細末每服一錢麝香酒下以杵錘燒赤淬

乃治陽乘於陰所謂天暑地

本事方

安胎清丸

條芩白朮等分炒爲末末飲和丸梧子大每服五十九白湯下或加神麪

熱經水沸溢者也

丹溪纂要

產後血渴

飲水不止黃芩參門冬等

此為試讀，需要完整PDF請訪問 www.gutenberg.org

分水煎溫服無時

支瘡血出

一人失火至五壯血出不止如尿半令欲絕以酒

炒黃芩二錢為末酒服即止

老小火丹

黃芩宋水調塗

楊氏家藏方

炒黃芩

二錢為末酒服即止

李樓怪證奇方

梅師方

子主治崩漏血

別錄

秦艽

音交
經中品

釋名

秦糾

本

秦瓜

蕭炳

○秦曰秦艽俗作秦膠本名秦糾與糾

同時珍曰

集解

暴乾弘景曰今出甘松龍洞蟲咬以根作

羅紋相交長大黃白色者為桂中多冲上用宜破去

秦曰今出涇州鄜州岐州者良頌曰今河陝州郡多有之其根土黃色而相交糾

長一尺以來粗細不等枝幹高五六寸葉婆娑連莖梗俱青色如萬葉六月中開花紫色似萬花當月結子每於春秋采根陰乾

根

修治

裴曰秦艽須於脚丈處認取左丈列為秦治疾右丈列為艽即發脚氣凡用秦以布拭去黃白毛乃用還元湯浸一宿日乾用

時珍曰秦艽但以左丈者為良分秦與艽為二名謬矣

氣微溫味苦辛陰中微陽可升可降入

手陽明經之才曰葛蒲為之使畏牛乳

至治寒熱邪氣寒濕風寒肢節痛下水利小便

本經

療風無問久新通身攀急

別錄傳尸骨蒸治瘧及

時氣

大牛乳點服利大小便療酒黃疸解酒毒去頭風

氣

好治胃熱虛寒發熱

時珍曰秦艽手足陽明經藥也兼入肝膽故手足不遂黃疸煩渴之病須之取其去陽明之濕熱也陽明

氣

古治胃熱虛寒發熱

珍曰秦艽有濕則身體酸疼煩熱有熱則日晡潮熱骨蒸所以聖惠方治急勞煩熱身體酸疼用秦艽柴胡一兩甘

草五錢為末每服三錢白湯調下治小兒骨蒸潮熱減食瘦弱用

附方

舊五

新六

五種黃疸

崔元亮海上方云凡黃有數種傷酒發黃誤食鼠

秦艽炙甘草各一兩每用一二錢水煎服之錢乙加薄荷葉五錢

附方

新六

五種黃疸

崔元亮亦作黃因勞發黃多痰渴目有赤脉益憔悴或

面赤惡心者是也用秦艽一大兩剉作兩帖每帖用酒半升浸絞取汁空腹服或利便止就中飲酒人易治屢用得力

○貞元廣利方

治黃病內外皆黃小便赤心煩口乾者以秦艽三兩牛乳一大升煮取七合分溫再服此方出於許仁則又孫真人方加芒消六錢

暴

瀉一飲秦艽二兩甘草炙半兩每傷寒煩渴心神躁熱用秦艽一兩牛乳一大盞

太平聖惠方

又台動不安

秦艽甘草炙鹿角膠炒各半兩為末每服三錢水一大盞糯米五

發背初起似

人用秦艽一兩水一盞煎六分分作二服

又方秦艽阿膠炒艾葉等分如上煎服

聖惠方

發背初起似

方加冬葵子等分為末酒服一七

聖惠方

月動不安十粒煎服

又方秦艽阿膠炒艾葉等分如上煎服

聖惠方

發背初起似

人用秦艽一兩水一盞煎六分分作二服

又方秦艽阿膠炒艾葉等分如上煎服

聖惠方</p

者便以秦艽牛乳煎服得快利三

五行即愈

崔元亮海上集驗方

末終之直指方

一切皆治秦艽為

茈胡

本經

釋名地薰

本經

芸蒿

別山菜

吳普

茹草

范

胡

是也

此草並作茈字

此草根紫色今太常用

薑茈草之柴皆音紫茈胡之茈音柴茈胡生山中嫩則可茹老則采而為柴故苗有芸

蒿

山菜茹草之名而根名茈胡也蘇恭之說殊欠明古本張仲景傷寒論尚作茈字也

集解

別錄

范胡葉名芸蒿辛香可食生弘農川

谷及寃句二月八月采根暴乾

弘農曰今出

傷寒大小柴胡湯為痰氣之

要若以芸蒿根為之大謬矣

頌曰今關陝江湖間近道皆有之以銀州者為勝二月生苗甚香莖青紫堅硬微有細線葉似竹葉而稍緊

小亦有似斜蒿者亦有似麥門冬葉而短者七月開黃花根淡赤色似前胡而強生丹州者結青子與他處者不類其根似蘆頭有赤毛

如鼠尾獨窠長者好穀曰茈胡出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處多有白鶴綠鶴于此飛翔是茈胡香直上雲間若有過往聞

者皆氣爽也

承曰柴胡以銀夏者最良根如鼠尾長一二尺香味甚佳今圖經所載俗不識其真市人以同華者代之然亦勝於他處者

益銀夏地方多沙同華亦沙苑所出也

機曰解散用北柴胡虛熱用海陽軟柴胡為良時珍曰銀州即今延安府神木縣五原城是其廢

蹟所產柴胡長尺餘而微白且軟不易得也北地所產者亦如前胡而軟今人謂之北柴胡是也入藥亦良南土所產者不似前胡正如

蒿根強硬不堪使用其苗有如韭菜者竹葉者以竹葉者為勝其如邪蒿者最下也按夏小正月令云仲春芸始生倉頡解詁云芸蒿也

似邪蒿可食亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭以為非柴胡云近時有一

種根似桔梗沙參白色而大市人以為充銀柴胡殊無氣味不可不辨

根

修治

數曰凡采得銀州柴胡去鬚及頭用銀刀削去赤薄

皮少許以粗布拭淨剉用勿令犯火立便無效也

氣味平無毒

刺錄曰微寒

普曰神農岐伯雷公苦無毒天明日甘

元素曰氣味俱輕陽也升也少陽經藥引胃氣上升苦寒以發

散表故某曰升也陰中之陽手足少陽厥陰四經引經藥也在臟主血在經主氣欲上升則用根以酒浸飲中及下

降則用梢之才曰半夏為之使惡皂莢畏女莞藜蘆時珍曰行手足少陽以黃芩為佐

王治

心胸易

胃中結

氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新久服輕身明目益精

本除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胸中邪氣五臟間遊氣大腸停積水脹及濕痺

拘攣亦可作浴湯別治熱骨節煩疼熱氣肩背疼痛勞乏羸瘦下氣消食宣暢氣血時疾內外熱不解單煮服之良

魏補五勞七傷

除煩上驚益氣力消痰止嗽潤心肺添精健忘大明除虛勞散肌熱去草辰潮熱寒往來膽瘧婦人產前產後諸熱心下痞胸膈痛

治陽氣下陷肝膽三焦包絡相火及頭痛眩運目暎赤痛障翳聾鳴諸瘧及肥氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒痘疹餘熱五

痘羸熱時發

之才曰此胡得桔梗大黃石膏麻子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸七療傷寒熱頭痛心下煩滿頸曰珍言曰張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒消等湯故後人治寒熱此為最要之藥

稟曰能引清氣而行陽道

傷寒外諸有熱則加之無熱則不加也又能引胃氣上行升騰而行春令者宜加之又凡治瘧以柴胡為君隨所發時所在經分佐以引經之藥十二經瘧症中須用柴胡以散諸經血結氣聚功與連翹同也

好古曰柴胡能去臟腑內外俱乏既能引清氣上行而順陽道又

入足少陽在經主氣在臟主血前行則惡熱却退則惡寒惟氣之微寒味之薄者故能行經若佐以三稜廣茂巴豆之類則能消堅積是主血也婦人經水適來適斷傷寒雜病易老惧用小柴胡湯加以四物之類并秦艽牡丹皮輩為調經之劑又言婦人產後血熱必用之藥也

宗奭曰柴胡本經並無一字治勞今人治勞方中鮮有不用者嗚呼凡此誤世甚多嘗原病勞有一種其臟虛損復受邪熱因虛而致勞故曰勞者牢也當須斟酌用之如經驗方中治勞熱青蒿煎之用柴胡正合宜爾服之無不效熱去即須急止若或無熱得此愈甚

雖至死人亦不忍目擊甚多日華子又謂補五勞七傷藥性論亦謂治勞乏羸瘦若此等病苟無實熱醫者執而用之不元何待注釋本草一字亦不可忽蓋萬世之後所誤無窮可不謹哉如張仲景治寒熱往來如瘧狀用柴胡湯正合其宜也

時珍曰勞有五勞病在五臟

若勞在肝膽心及包絡有熱或少陽經寒熱者則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡乃引清氣退熱

必用之藥惟勞在肺腎者不可用爾然東垣李氏言諸有熱者宜加之無熱則不加又言諸經之瘧皆以柴胡為君十二經瘧症須用柴

以散結聚則是肺瘧腎瘧十二經之瘧有熱者皆可用之矣但要用者精思病原加減佐使可也寇氏不分臟腑經絡有熱無熱乃謂柴

胡不治勞之一概擯斥殊非通論如和劑局方治上下諸血龍腦雞蘇丸用銀柴胡浸汁熬膏之法則世人知此意者鮮矣按龐元英談

數云張知問久病瘧熱時如大年餘骨立醫用草附諸藥熱益甚召醫官孫琳胗之琳投柴胡湯一帖熱減十之九三服脫然琳曰此名

勞瘧熱從體出加以剛剝氣血愈虧安得不瘦蓋熱有在皮膚在臟腑在骨髓非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力減服故三服乃效也觀此則得用藥之妙矣寇氏之說可盡憑乎

附方

新五傷寒餘熱不論長幼柴胡四兩甘草一兩每用二錢水一盞煎服

許學士本事方

小兒骨熱

十歲以後遍身如火日漸黃瘦盪汗欬嗽煩渴柴胡四兩丹砂三兩為末猪脂溫拌和飯上蒸熟丸茶豆大每服一丸桃仁烏梅湯下日三服

聖濟總錄

虛勞發熱柴胡人參等分每服三錢

澹寮方

濕熱黃疸柴胡一兩甘草二錢

本草綱目

卷一百一十一

半作一劑以水一盃白茅根一握煎至眼目昏暗柴胡六錢決明子十八錢治篩人乳汁積熱下痢分浸冷空心腹之柴胡黃芩等分半酒半水煎七

七分任意時時服盡

孫尚藥秘寶方目和傅目上文

夜見五色 千金方

積熱下痢

分浸冷空心腹之 濟急方

苗王治卒聾擣汁頻滴之千金

前胡

別錄時珍曰按孫恤唐韻中品釋名作涌胡名義未解

軟為療殆欲同之本經上品有茈胡而無此晚來醫乃用之大明曰越衢婺睦等處者皆好七八月采之外黑裏白頌曰今陝西梁漢江淮荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白茅長三四寸味甚香美又苦蒿七月內開白花與葱花相類八月結實根青紫色今廊庭將來者大與柴胡相似但柴胡赤色而脆前胡黃而柔軟為不同爾一說今諸方所用前胡皆不同汴京北地者已黃白枯脆絕無氣味江東乃有二四種一種類當歸皮班黑肌黃而脂潤氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短者味都微一種如草烏頭膚赤而堅有兩三岐為一本食之亦戰人咽喉中破以薑汁漬擣服之甚下膈解痰實然皆非真前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類柴胡而大氣勞烈味亦濃苦療痰下氣最勝諸道者數曰凡使勿用野蒿根綠真似前胡只是味粗酸若誤用之令人反胃不受食若是前胡味甘微苦也時珍曰前胡有數種惟以苗高一尺色似斜蒿葉如野菊而細瘦嫩時可食秋月開夥白花類蛇牀子花其根皮黑肉

白有香氣為真大抵北地者為勝故方書稱北前胡云

根修治

數曰修事先用刀刮去蒼黑皮并剗上子細剗以甜竹瀝浸令潤日中熬乾用

氣味苦微寒無毒

權曰甘辛平之才曰半夏

為之使惡皂莢畏藜蘆

王治痰滿胸膈中痞心腹結氣風頭痛去

痰下氣治傷寒熱推陳致新明日益精錄能去熱實及時氣內外俱熱單煮服之

甄治一切氣破癥結開胃下食通五臟靈

筋骨節煩悶反胃嘔逆氣喘嗽安胎小兒一切痘氣

大清肺熱化痰散風邪

時珍發明足太陰陽明之藥與柴胡純陽上升入少陽厥陰

者不同也其功長于下氣故能治痰熱喘嗽瘧膈嘔逆諸疾氣下則火降痰亦降矣所以有附方一小兒夜啼前胡擣篩蜜丸小豆大日推陳致新之績為痰氣要藥陶弘景言其與柴胡同功非矣治證雖同而所入所生則異

附方一小兒夜啼前胡擣篩蜜丸小豆大日

以瘥為度

普濟方

防風

本經上品

釋名銅芸

本經吳草

別名屏風

別名白芷

吳普時珍曰防者壅也其功療風最要故名屏風者防風陽

沙苑今第一出彭城蘭陵即近鄉郊者鬱州百市亦有之次出襄陽義陽縣界亦可用惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好參曰今

出齊州龍山最善淄州兗州青州者亦佳葉似牡蒿附子苗等沙苑在同州南亦出防風輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣頃曰今汴

東淮浙州郡皆有之莖葉俱青綠色莖溪而葉淡似青蒿而短小春初時嫩紫紅色江東宋毫人采作菜始極爽口五月開細白花中心

攢聚作大房似蒔蘿花實似胡荽子而大根土黃色與蜀葵根相類二月十月采之關中生者三月六月采之然輕虛不及齊州者良又

有石防風出河中府根如蒿根而黃葉青花白五月開花六月采根暴乾療頭風脹痛時珍曰江淮所產者多是石防風生于山石之間

二月宋嫩苗作菜辛甘而香呼為珊瑚菜其根粗醜其子亦可種吳綬云凡使以黃色而潤者為佳白者多沙條不堪

氣味甘溫無毒

別錄曰辛無毒入頭者令人發狂入尾者發人癥疾普曰神農黃帝岐伯桐君雷公扁鵲甘無毒李當之小寒元素曰味辛而甘氣溫氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經之本藥好古曰又行足陽明太陰二經為肝經氣分藥巢曰防風能制黃芪黃芪得防風其功愈大乃相畏而相使者也才曰得皂角能行周身得澤瀉藁本療風得當歸芍藥陽起石禹餘根療婦人子臟風畏草薢殺附子毒惡藜蘆白

葉

主治中氣熱汗出

別錄謂曰江東一種防風茹其嫩苗

花

主治四肢拘急不得經脉虛羸骨節間痛心腹痛

甄權

子

主治瘧風更復調食之

蘇發明

爾能瀉肺實誤服瀉人上焦元氣某曰防風治一身盡痛乃卒伍卑賤之職隨所引而至者風藥中

沙苑

別名

乾

普

根

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白芷

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

別名

白蘿蔔

潤劑也若補脾胃非此引用不能行凡脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽證當用防風凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之為能散結去上部風病人身體拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲陽鴻黃散中倍用防風者乃於上中寫本也

附方

舊二

新九自汗不止

防風去蘆為末每服二錢浮麥煎湯服

睡中盜汗防風二兩芍藥一兩人參半兩為

枳實炒一兩甘草末每服三錢臨卧飲下

易簡方

消風順氣老人大腸秘瀉防風

半兩為末每食前白湯服二錢

偏正頭風大每嚼一丸茶清下

小便五升煎至四升分二服即止也

經驗後本經驗後本

小兒解

貞防風白及柏子仁等分為末以乳湯服二錢

簡便方偏正頭風大每嚼一丸茶清下

獨聖散用防風去蘆頭炙亦為末每服一錢以麪糊調下更以

解烏頭毒附子天雄毒

盧汁調塗一日一換

養生主論

婦人崩中

麪糊酒投之此藥累經效驗一方加炒黑蒲黃等分

經驗方

角解烏頭毒並用防風煎

汁飲之良

解羌活毒同解野菌毒

千金方解羌活毒已死只要心間溫暖者乃是熱物犯之只

獨活

本經上品

釋名

羌活

本經

羌青

本經

獨搖草

別錄

護羌使者

本經

胡王使者

吳長生草

弘景曰

一莖直上不為風搖故曰獨活

別錄曰

此草得風不

獨活以羌中來者為良故有羌活胡王使者諸名一物二種也正如集孕

搖無風自動故名獨搖草大明曰獨活是羌活母也時珍曰

川芎撫芎白术蒼木之義入用微有不同後人以為二物者非矣

集孕

景曰此州郡縣並是羌地羌活形細而多節軟潤氣息極猛烈

出益州北部西川者為獨活色微白形虛大為用亦相似而小不如至易姓宜密器藏之

別錄曰

獨活生雍州川谷或隴西南要二月八月采根暴乾弘

黃色而作塊者為獨活而陶隱居言獨活色微白形虛大用與羌活相似今蜀中乃有大獨活類桔梗而大氣味亦不與羌活相類用之微

寒而少效今又有獨活亦自蜀中來類羌活微黃而極大收時才解乾之氣味亦芳烈小類羌活又有槐葉氣者今京下多用之極效驗

意此為真者而市人或擇羌活之大者為獨活殊未為當大抵此物有兩種西獨者黃色香如蜜臘西者紫色秦隴人呼為山前獨活古

方但用獨活今方既用獨活而又用羌活茲為謬矣機曰本經獨活一名羌活本非二物後見人其形色氣味不同故為異論然物多不

齊一種之中自有不同仲景治少陽所用獨活必繫實者東垣治太陽所用羌活必輕虛者正如黃芩取枯瓢者名芩片治大陰條實者

名于芩治陽之明義同也況古方但用獨活無羌活今方俱用不知病宜兩用耶抑木之考耶時珍曰獨活羌活乃一類二種以中國者

為獨活西羌者為羌活蘇頌所說頗明按王貽易簡方云羌活須用紫色有贊頸鞭節者獨活是極大羌活有口如鬼眼者尋常皆以老

宿前胡為獨活者非矣近時江淮山中出一種土當歸長近尺許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用羌活解散亦或