

赤水玄珠

卷十

赤水玄珠第十五卷目錄

秘結門

大小便不通

閉癃遺溺不禁辨

小便不通門

癃門

遺溺門

小便不禁門

溺赤

脫肛門

附 腸病

前陰諸疾門

痴門

赤水玄珠第十五卷

新安生生子孫一奎著輯

秘結門

經曰大便者腎之所主腎主五液也腎氣充則大便潤虛則津液耗竭而燥結矣又飢飽勞役損傷胃氣及食辛熱厚味之物而助火邪伏於血中煎熬真陰皆能使大便燥結又有年老陰血不足而燥者惟當補而潤之不可用峻利之劑又大便燥結者不得發汗汗則重亡津液必秘結而死矣

有陽結有陰結有風結有實結有虛結有氣秘有血秘  
仲景曰脈浮數能食不大便者此爲實名曰陽結也期十

七日當劇脈沉而遲不能食身體重大便反硬名曰陰  
結也期十四日當劇陽結者散之陰結者熱之風結者  
諸藥中加羌活防風之類此二味雖是風藥然味辛所  
以能潤燥也經曰腎惡燥急食辛以潤之

潔古曰臟腑之秘不可一槩治療有虛秘有實秘胃實而  
秘者能食小便赤以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛不  
能食而小便清利者厚朴湯主之實秘者物也虛秘者  
氣也

東垣曰有物有積而結者當下之食傷太陰腸滿食不化  
腹嚮嚮然不能大便者以苦泄之仲景麻仁丸局方七  
宣丸皆以大黃爲君之類治注夏大便滯者血少血中伏火也黃耆人參  
是也

湯加生地當歸身桃仁泥潤之如潤之大便仍久不快者少加煨大黃微利之如加大黃久不快利者非血結血秘是熱生風止當服黃耆人參湯內用羌活防風各五錢水四盞煎至一盞空心服之其便必大走也

丹溪戒人用峻利但宜滋養陰血使孤陽之火不熾而金行清化木邪有制脾土清健而運行津液津液入胃則腸潤而通矣須知在西北以開結爲主在東南以潤燥爲主慎勿膠柱而調瑟也

王海藏云桃杏仁俱治大便秘當以血氣分之年老虛人大便秘脈浮在氣杏仁陳皮主之脈沉在血桃仁陳皮主之所以俱用陳皮者以其干陽明病與手太陰爲表

裏也

脈多沉伏而結 陽結脈沉實而數 陰結脈  
伏而遲或結 老人虛人便結脈雀啄者不治

七宣丸

柴胡

枳實

麵炒

訶子皮

木香

各五兩

桃仁

去皮尖炒六兩

甘草

炙四兩

大黃

麵包煨十五兩

右煉蜜丸

桐子大

每服二十

丸米飲下漸加四五十丸以利爲度

厚朴湯

胃虛而秘者不能飲食小便清利

陳皮

半夏

麵炒

枳實

各一兩

甘草

炙厚朴三兩

製各

白朮

二兩

每三五七錢羗三片棗一枚水煎服

保命集

大黃牽牛散

相火之氣遊走臟腑大便秘結

大黃

一兩

牽牛

頭末

五錢

爲細末每三錢有厥冷合用酒調

無厥冷而手足煩熱者蜜湯調下食後以微微利爲度此謂不時而熱者濕熱也凡用大黃半兩至一兩而大便不通利者加射香少許調于藥中則大便必大走也

半硫丸 治年高虛秘冷秘 方見燥門

大潤腸丸 治大便秘澁通用

杏仁

炒

枳殼

麻仁

陳皮

各五錢

阿膠

防風

各二錢半

右煉蜜丸梧子大每五十丸老人蘇子煎湯下壯者  
荆芥湯下

麻仁丸 實秘能飲食小便赤此丸與七宣丸主之

枳殼

川芎

等分

麻仁泥

減半

煉蜜丸梧子大食前溫水服

又麻仁丸 風秘脾約症小便數大便秘

大黃 枳殼 赤芍藥 各一兩 厚朴 五錢 麻仁

杏仁 各一兩 二味俱另研 煉蜜丸 梧子大每服三五十丸

皂角丸 治有風人大便秘澀

牙皂 枳殼 羞活 桑白皮 檳榔 杏仁

麻仁 防風 白芷 陳皮

等分

蜜丸梧子大每服三五十丸蜜湯下

皂角枳殼丸 大腸有風秘結老人宜服

皂角皮子 枳殼炒各等分

蜜丸梧子大每七十丸空心食前米飲下

搜風順氣丸 治大腸秘澀

大黃

五兩半  
熟半生

山茱萸

麻仁泥

郁子仁

炮去皮研

兎絲子

山藥

牛膝

峻憤榔

各二

防風

枳殼

獨活

各一

車前子

二兩半

蜜瘰

蜜丸

梧子大每二三十丸

米飲下平旦臨臥各一服

二仁丸 治老人虛人風秘不可服大黃者妙

麻仁

杏仁

枳殼

調子丁等分

蜜丸梧子大每三十丸溫水下未利增之

四磨湯 氣滯腹急大便秘

沉香

木香

檳榔

烏薑末

等分

各磨半鍾和勻溫服有熱者加大黃枳殼名六磨湯

橘杏丸 治氣秘老人虛弱人皆可服

橘紅 杏仁

等分

煉蜜丸梧子大每七十丸空心米飲下

蘇麻粥 順氣滑大便 蘇子 麻仁

二味不拘多少研爛水瀝取汁煮粥食之

從容瑣陽粥 老人陰血不足大便燥結

肉蓯蓉 瑣陽 煮粥服

小通氣散 虛人憂怒傷肺致令秘澁

曾服燥藥而大便秘

陳皮 蘇葉 枳殼 木通

等分

水煎服立通

金液丹 治挾冷結滯兼治傷寒陰結以杏仁麻仁煎湯

吞下 方在寒門

神功丸 治氣壅風盛秘結後重疼煩悶

大黃

訶子各四兩

人參

麻仁各二兩

右蜜丸梧子大

每二十丸米飲下食後臨臥服此藥虛實加減

小柴胡湯 治傷寒陽結能食而大便結

檳榔丸 治大腸實熱不通心腹脹滿

檳榔 大黃 麻仁 枳實 茯活 杏仁 牽牛

白芷

黃芩

各一兩

人參

五錢

蜜丸梧子大每四十丸空心溫水下

四順清涼飲 治同前 每加燈心十根枳殼十片水煎  
服効

檳榔散 治腸胃有濕大便秘結

檳榔 不拘多少 爲末每服二錢蜜湯點服

香蘇散 治同上 加枳殼檳榔水煎服

五仁丸 津液枯竭大腸秘結傳道艱難

桃仁

杏仁

各一

柏子仁

郁李仁

炒

松子仁

各二

錢半

陳皮

四兩另爲末

右五仁另研爲膏入陳皮末研勻蜜丸梧

子大空心米飲下五十丸

調氣滋補溫腸丸 治發汗利小便亡津液以致秘結

沉香

一兩另爲末

肉蔻容

二兩

爲末用麻子仁汁打糊爲

丸梧子大每七十丸空心米飲下

潤腸丸 治脾胃中伏火秘結及風結血結

桃仁

麻仁

當歸尾

大黃

羌活

各五錢

升麻

紅花

郁李仁

右除桃麻仁另研爲泥外餘爲末

煉爲末

蜜丸梧子大每三五十丸空心白湯下

一方加防風

三錢

皂角仁

燒存性兩半

無升麻以下三味

歲靈仙丸

治年高氣衰津液枯燥秘結

黃耆

枳殼

歲靈仙

等分

陳黃湯

治老人大便秘結

黃耆

陳皮

各五錢爲末

每服三錢

用火麻仁一合研爛

以水投取汁一鍾濾去渣于銀石器中煎候有乳花  
起卽入白蜜一大匙再煎令滾調藥末空心服

獨棗湯 治大便積日不通

大棗一枚劈開入輕粉五分依舊合起以麻線縛札慢

火水者熟嚼碎以棗汁送下

丹溪治虛熱大腸秘

白芍藥

一兩半

陳皮

生地黃

當歸身

各二兩

一條芩

甘草

各二錢

右粥丸每七八十丸白湯下

潤麻丸

治血燥大便不通

此丹溪秘方

麻仁

當歸

桃仁

生地黃

枳殼

各一兩

蜜丸梧子大每五十丸空心白湯下

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上沖吸門不開噎塞

不便燥秘氣不得下治在幽門以辛潤

當歸身

桃仁泥

升麻

各一錢

生地

熟地

各五分

炙甘草

紅花

各三錢

水煎食前調檳榔末五錢或加

麻仁泥一錢若加大黃名當歸潤燥湯

潤燥湯

升麻

生熟地黃

各二錢

當歸梢

生甘草

大黃

煨

桃仁泥

麻仁泥

各三錢

紅花

五分

右除二仁另研作

一服水煎數沸下二仁煎空心熱服

活血潤燥丸 治大便風秘血秘時常燥結

當歸梢

一錢防風

三錢大黃

紙裹煨

差活

各二兩

桃仁

麻仁

各二兩

皂角

燒存性

一兩

三錢其性濕

研如泥

滑潤則

燥濕自解

右除二仁另研外餘爲末蜜丸梧子大空心服五十丸白湯送下三兩服後以蘇子麻仁粥每日早晚食之大便不致燥結以磁器盛藥紙封

脾約麻仁丸和劑方 治腸胃熱燥大便秘結

厚朴去皮 茯苓製各 枳實麸炒各 杏仁去皮尖炒

麻仁另研各五錢 大黃蒸焙一兩六錢

蜜丸梧子大每二十丸臨臥溫水下以通利

潤腸丸 治大便秘澁連日不通

麻子仁一盞半細研用水浸瀘去皮取汁 芝麻半盞微炒研用 水浸取汁

桃仁泡去皮尖炒黃研如泥 荆芥穗爲末各一兩

右前藥入鹽少許 同煎可以代茶飲之以利爲度

三和散 治七情之氣結于五臟不能流通以致脾胃不

和心腹痞悶大便秘澁

川芎三兩

羌活去

紫蘇梗

沉香

宣木瓜

白朮