

張仲景傷寒論貫珠集目錄卷二

太陽救逆法第四 計六十四條 方二十七道

論結胸臑結之異三條

結胸及痞之源一條

結胸證治十條

大陷胸湯方

大陷胸丸方

小陷胸湯方

文蛤散方

三物白散方

痞證七條

大黃黃連瀉心湯方

附子瀉心湯方

半夏瀉心湯方

生薑瀉心湯方

甘草瀉心湯方

懊憹煩滿六條

梔子豉湯方

梔子甘草豉湯方

梔子生薑豉湯方

梔子厚朴湯方

梔子乾薑湯方

下利脈證五條

桂枝人參湯方

葛根黃連黃芩湯方

赤石脂禹餘糧湯方

下後諸變證治九條

桂枝去芍藥湯方

桂枝加厚朴杏仁湯方

桂枝去芍藥加附子湯方

柴胡加龍骨牡蠣湯方

誤汗吐下後諸變脈證十三條

乾薑附子湯方

茯苓四逆湯方

黃連湯方

火逆十條

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯方

桂枝加桂湯方

太陽類病法第五 計三十三條 方八道

溫病一條 風溫一條 瘧病七條

桂枝加葛根湯方

濕病五條 風濕四條

桂枝附子湯方 甘草附子湯方

暍病三條 霍亂病十一條

四逆加人參湯方 理中丸方

四逆加豬膽汁湯方

飢證一條

瓜蒂散方

張仲景傷寒論貫珠集卷之二

飲鶴山人尤怡在涇註

二然朱陶性校

太陽下篇

太陽救逆法第四 計六十三條

論胸結臍結之異三條

問曰病有結胸有臍結其狀如何答曰按之痛寸脈浮關脈沉名曰結胸也何謂臍結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸脈浮關脈小細沉緊名曰臍結舌上白胎滑者難治

此設爲問答以辨結胸臍結之異結胸者邪結胸

按中之則痛臟結者邪結腸間按之亦痛如結胸者謂如結胸之按而痛也然胸高而臍下胸陽而臍陰病狀雖同而所處之位則不同是以結胸不能食臍結則飲食如故結胸不必下利臍結則時時下利結胸關脈沉臍結則更小細緊而其病之從表入裏與表猶未盡之故則又無不同故結胸臍結其寸脈俱浮也舌上白胎滑者在裏之陽不振入結之邪已深結邪非攻不去而臍虛又不可攻故曰難治

臍結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不

可攻也

邪結在臟必陽氣內動或邪氣外達而後可施攻
取之法若無陽證不往來寒熱則內動外達之機
俱泯是以其人反靜其舌胎反滑邪氣伏而不發
正氣弱而不振雖欲攻之無可攻已蓋卽上文難
治之端而引其說如此

病脇下素有痞連在臍旁痛引少腹入陰筋者此名
臟結死

臟結之證不特傷寒卽雜病亦有之曰脇下素有
痞則其病久而非暴矣曰連在臍旁痛引少腹入

陰筋則其邪深而非淺矣。既深且久，攻之不去，補之無益，雖不卒死，亦無愈期矣。故曰死。

論結胸及痞之源一條

病發於陽而反下之，熱入因作結胸；病發於陰而反下之，因作痞。所以成結胸者，以下之太早故也。

此原所以結胸與痞之故。病發於陽者，邪在陽之經，病發於陰者，邪在陰之經也。陽經受邪，鬱即成熱；其氣內陷，則爲結胸。陰經受邪，未即成熱，其氣內陷，則作痞。所以然者，病邪在經，本當發散而反下之，裏氣則虛，邪氣因入，與飲相搏而爲病也。要

之陽經受邪原有可下之例特以裏未成實而早
行下法故有結胸之變證審其當下而後下之何
至是哉仲景復申明所以成結胸之故而不及痞
豈非以陰經受邪則無論遲早俱未可言下耶

論結胸證治十條

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛
數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解
也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動
膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則爲結
胸大陷胸湯主之若不結胸但頭汗出餘無汗劑頸

而還小便不利身必發黃也

脈浮動數皆陽也。故爲風爲熱爲痛。而數則有正。爲邪迫失其常度之象。故亦爲虛頭痛發熱微盜汗出而復惡寒。爲邪氣在表。法當發散而反下之。正氣則虛。邪氣乃陷。動數變遲者。邪自表而入裏。則脈亦去陽而之陰也。膈內拒痛者。邪欲入而正拒之。正邪相擊。則爲痛也。胃中空虛。客氣動膈者。胃氣因下而裏虛。客氣乘虛而動膈也。短氣躁煩。心中懊懣者。膈中之飲爲邪所動。氣乃不舒。而神明不寧也。由是陽邪內陷與飲相結。痞鞭不消。而

結胸之病成矣大陷胸湯則正治陽邪內結胸中之藥也若其不結胸者熱氣散漫既不能從汗而外泄亦不得從溺而下出蒸鬱不解浸淫肌體勢必發黃也

大陷胸湯方

大黃六兩 芒硝一升 甘遂一錢匕

右三味水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末溫服一升得快利止後服按大陷胸與大承氣其角有心下與胃中之分以愚觀之仲景所云心下者正胃之謂所云胃中者

正大小腸之謂也。胃爲都會，水穀並居，清濁未分，邪氣入之，夾痰雜食，相結不解，則成結胸。大小腸者，精華已去，糟粕獨居，邪氣入之，但與穢物結成燥糞而已。大承氣專主腸中燥糞，大陷胸并主心下水食。燥糞在腸，必藉推逐之力，故須枳朴水食在胃，必兼破飲之長，故用甘遂。且大承氣先煮枳朴而後內大黃，大陷胸先煮大黃而後內諸藥。夫治上者制宜緩，治下者制宜急，而大黃生則行速，熱則行遲，蓋卽一物而其用又有不同如此。

傷寒六七日，結胸熱實，脈沉而緊，心下痛，按之石韌。

者大陷胸湯主之

邪氣內結既熱且實脈復沉緊有似大承氣證然結在心下而不在腹中雖按之石鞭而痛亦是水食互結與陽明之燥糞不同故宜甘遂之破飲而不宜枳朴之散氣如上條之說也

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之

熱結在裏而復往來寒熱是謂表裏俱實不得以十餘日之久而獨治其裏也故宜大柴胡表裏兩

解之法若但結胸而無大熱如口燥渴心煩等證者此爲水飲結在胸脇之間所謂水結胸者是也蓋邪氣入裏必挾身中所有以爲依附之地是以在腸胃則結于糟粕在胸膈則結於水飲各隨其所有而爲病耳水結在胸而但頭汗出者邪膈於上而氣不下通也故與大陷胸湯以破飲而散結太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡所小有潮熱從心下至少腹鞭滿而痛不可近者大陷胸湯主之

汗下之後津液重傷邪氣內結不大便五六日舌

上燥而渴日晡所小有潮熱皆陽明胃熱之徵也
從心下至少腹鞭滿而痛不可近則不特徵諸兆
抑且顯諸形矣乃不用大承氣而用大陷胸者亦
以水食互結且雖至少腹而未離心下故也不然
下證悉具下藥已行何以不臣枳朴而臣甘遂哉
結胸者項亦強如柔瘥狀下之則和宜大陷胸丸
瘥病之狀頸項強直結胸之甚者熱與飲結胸膈
緊實上連於項但能仰而不能俯亦如瘥病之狀
也曰柔而不曰剛者以陽氣內陷者必不能外閉
而汗常自出耳是宜下其胸中結聚之實則強者

得和而愈然胸中盛滿之邪固非小陷胸所能去而水熱互結之實亦非承氣湯所可治故與葶藶之苦甘遂之辛以破結飲而泄氣閉杏仁之辛白蜜之甘以緩下趨之勢而去上膈之邪其芒硝大黃則資其軟堅蕩實之能

大陷胸丸方

大黃半觔 葶藶半觔 芒硝半觔

杏仁半升去皮尖熬

右四味搗篩二味內杏仁芒硝合研加脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合