

御纂醫宗金鑑卷十五

編輯外科心法要訣目錄

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鐵鍼入肉

鐵鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

骨梗咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發癰

湯火傷

凍瘡

人齒傷

熊虎狼傷人

馬齒傷

瘋犬齒傷

馬汗驢涎入瘡

蛇齒傷

蜈蚣齒傷

蠍蟇

蠶齒

射工傷

蚯蚓傷

天蛇瘡

蠼螋傷

百蟲入耳

御纂醫宗金鑑卷十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

跌撲之證屬尋常復元活血湯最良已破亡血八珍服未破血
瘀大成湯

註此證有已破未破之分亡血瘀血之別如尋常跌撲微傷
皮肉疼痛未破者以復元活血湯散瘀活血若損傷筋骨
血流過多不止者卽爲亡血急用花蕊石散乾撒止血內
服八珍湯加酒炙骨碎補續斷紅花若從高跌墜未曾損

破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便秘結

當以大成湯通利二便其人自醒若便利不醒者灌獨參

湯救之

大成湯

大黃三錢

朴消

枳殼各二錢
炒

厚朴

薑炒

當歸

紅花

木通

蘇木

陳皮

甘草各一錢

水二鍾煎八分不拘時服服後二時不行渣再煎加蜜

匙冲服

歌大成活瘀便立通濟黃枳殼厚歸紅木通蘇水陳皮草煎
服不行加蜜冲

復元活血湯

當歸尾二錢

柴胡一錢五分

穿山甲

炙研

紅花

枯薑仁各七分

甘草

五分

桃仁十七個

大黃三錢

水二鍾酒二鍾煎一鍾食遠服以利爲度

方
歌復元活血跌撲證惡血流瘀積滯疼山甲柴紅枯薑草桃

仁歸尾大黃行

花蘆石散

見發無定處血癥

八珍湯

獨參湯

俱見瀰
瘍門

金瘡

金瘡須宜驗傷痕輕傷皮肉重傷筋外撒如聖桃花散血多八珍湯獨參

註

此證有金刀傷箭簇傷石鋒傷須看傷痕深淺輕者皮肉

破損血流不住以桃花散撒之重者筋斷血飛係大衄已

傷用如聖金刀散撒上以絹帛紮住止而復流再撒若藥
痂過厚拘痛者以生肌玉紅膏塗傷處外貼陀僧膏長筋

止痛生肌治之無論輕重傷破出血初服三黃寶鱗丸傷
破微出血者服黎洞丸若出血過多其人面黃眼黑不可
專攻瘀血宜用八珍湯甚者獨參湯先固根本二方俱加
蓀木紅花兼調瘀血此證雖係好肉暴傷然驗脈法形證
亦可以定生死如傷血過多脈見虛細沉小和緩者生若
脈見浮洪數大實虛促者死被傷入肺者一七死左脇下
傷內者腸全斷者少腹下傷內者傷處繁多者老人左股
壓碎者傷破陰子者肩內耳後傷透於內者死凡傷天胞
穴與肩角腦後臂裏跳脈髀內陰股兩乳上下心下鳩尾
及五臟六腑之輸者皆死腦後出髓而不能語目睛直視

喉中沸聲口急唾出兩手妄舉者亦死又有腹皮損破腸
出者看腸若僅傷一半者可治先以大麥煮粥取濃汁溫
洗其腸以桑皮尖茸爲線蘸花蕊石散縫腸傷口急於縫
處塗活雞冠血隨以清油塗腸令潤將腸輕輕納入腹中
外用生人長髮密縫腹傷口之裏肉留外皮撒月白珍珠
散以待生肌斂口若傷口大者不能外縫以陀僧膏護貼
候自潰膿卽按潰瘍門治法縫後勿驚笑以米飲少少飲
之漸增待二十日後再喫濃粥調理而愈

三黃寶蠟丸

藤黃四兩製法見
黎洞丸內

天竹黃無真者九轉
南星代之

紅芽大戟

劉寄奴

血竭各三兩

孩兒茶

雄黃各三兩

朴消一兩

當歸尾一兩五錢

鉛粉

汞卽水銀

乳香

麝香各三錢

琥珀二錢

各研極細末稱準和一處將水銀同鉛粉在鐵鍋內火上
熟研成末入前藥內共研勻用煉淨黃蠟二十四兩放磁
器內坐滾水中化開將藥入內攪勻病重者每丸一錢病
輕者每丸五分熱黃酒調服倘受傷至重連服數次服藥
後飲酒出汁更妙又治一切惡瘡以膏油化開敷之甚效

方歌三黃寶蠟丸天竹大戟兒茶消寄奴雄黃鉛粉汞乳

歸麝碾去其粗蠟丸黃酒熱調服外治惡瘡油化敷能療
金瘡傷損證續筋瘀散痛全無

黎洞丸

三七 生大黃 阿魏

孩兒茶

天竹黃

血竭

乳香

沒藥各二兩

雄黃一兩

山羊血

五錢無真者以小子羊鮮心血代之

冰片

麝香

牛黃各二錢五分
以上各研細末

藤黃

二兩 以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次去浮沉取中將山羊血拌入曬乾

取秋露水化藤黃拌藥搗干餘下如乾加煉蜜少許爲丸

重一錢黃蠅封固每用一丸黃酒化服外敷亦用黃酒磨塗此藥如在夏天修和取天落水拌之爲丸

方黎洞金瘡跌撲傷發肯癰疽諸惡瘡癰瘍刑傷瘋犬敵蜂

蛇蠍毒服敷良三七大黃冰麝魏兒茶天竹竭勝黃羊血

牛雄黃乳沒秋露和左酒化強

桃花散見發無定處血箭

如聖金刀散見足部脫肛

生肌玉紅膏

陀僧膏

八珍湯

獨參湯

月白珍珠散

俱見潰瘍門

花蕊石散

見發無定處血瘡

箭頭入肉

附毒箭

箭頭入肉鉗不出解骨丸納羊脂敷燒銅毒箭金汁解射商中人藍汁塗

註

箭頭嵌入肉內鉗不出者宜解骨丸納傷口內外用羊脂細嚼貼之覺癢忍之極癢箭頭漸冒憾動拔出卽以人尿洗之貼陀僧膏曰換傷口自歛又有毒箭二種交廣蠻夷用燒銅作箭簇甚毒人若中之纏傷皮肉便悶曖沸爛而死急飲金汁外亦用金汁抹之若金汁一時不得卽灌人糞汁並外敷之非此不能解毒也又一種以毒藥喂箭名爲射商人若中之甚毒急用葛氏方用藍錠汁一盃灌

之外亦用塗抹傷處一法用大豆豬羊血內服外敷解毒
亦效又箭鏃不出者搗鼠肝塗之或鼠腦搗塗卽出

解骨丸

蜣螂

研

雄黃

研

象牙末

各等分

共和勻煉蜜爲丸如黍米大納傷口處

方解骨丸

能拔箭鏃蜣螂雄黃功效速象牙末加蜜煉丸大

如黍米納傷處

陀僧膏

見潰瘍門

鐵鍼入肉

鐵鍼入肉隨氣遊走向心胸險可愁烏鵲翎灰酒調服膏貼鍼出始免憂

註凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣遊走若走向心窩胸膛者險急用烏鵲翎數根炙焦黃色研細末酒調服一錢或二錢俱可外用神聖膏貼三五次其鍼自出前法用在一二日間效

神聖膏

用車脂葷油不拘多少研如膏調磁石末攤紙上如錢許貼之每日二換

鐵鍼誤入咽喉

誤吞鐵鍼入咽喉急飲蝦蟆血數頭鍼不卽吐若難散或食飴糖出不留

註 鐵鍼誤入咽喉無藥可施宜用癩蝦蟆數個將頭剝去倒垂流血以盃接之得一盃許灌入喉中移時連鍼吐出鍼自輾曲一方用舊名離恨存性研末每服三錢黃酒調服亦能化鍼或用飴糖一効食盡便出

誤吞銅錢

誤吞銅錢雖無疼久留腹中病必成芋蕷能化堅爲軟多食無
傷可化銅

註誤吞銅錢多食芋蕷卽能化堅爲軟若誤吞鐵骨等物腸
中不能轉送覺墜者多食青紫豬脂自然送入大腸與糞
同出甚效