

中兽医验方汇编

5-2
湖北省畜牧兽医处
湖北省畜牧兽医学研究所(武昌金水南)
湖北省畜牧兽医学专科学校
湖北省畜牧兽医学协会

前 言

中兽医医疗技术在我国有着悠久的历史，广大劳动人民在这方面创造和积累了极其丰富的经验。但中兽医及其医疗技术在旧社会受到了很大的摧残和限制，得不到发展，许多良方奇术，多半零星散失，甚至有的已经失传了。

解放后，在党的领导下，中兽医的地位和政治觉悟都有了空前的提高。十年来在积极防治家畜疾病工作上，起着良好的促进作用，保障了畜牧生产的健康发展。为了继承和发扬祖国兽医学遗产，促进中西医结合，进一步创造条件，使祖国的兽医学推陈出新地进入新的历史阶段，更好地为畜牧业的高速度发展服务，今春，在全省普遍地开展了一次采风、献方运动，经过县的汇集和专署农业部门的整理，共献方580个。

为使验方汇编工作做得比较细致，本年5月间由省农业厅畜牧兽医处和省畜牧兽医科学研究所及省畜牧兽医专科学校，组织部分研究人员、教师及学生分赴麻城、当阳、监利、黄陂、光化等五个县，进行临床应用验证了一些处方外，并于本年8月，又邀请了六个专区的十一位著名中兽医，在武昌召开了“湖北省中兽医采风工作座谈会”，湖北省科学技术协会还组织了华中农学院、武汉军区后勤部兽医处兽医检验所、武汉市郊区农科所、东西湖农牧试验站等有关单位的兽医人员参加会议。经过到会人员的讨论与研究共选出验方170余个，编成本书。这些秘方、验方、单方、偏方，都有着较高的疗效，是劳动人民几千年来与家畜疾病作斗争的经验总结。

本书能于较短时间内编成，并作为庆祝伟大的国庆十周年献礼礼品，是由于全省广大中兽医在党的领导下，热爱祖国，踊跃献方的结果。对于这种热情，谨致衷心感谢。

因时间短促，以及对许多中兽医的医学理论及技术尚有待于进一步学习和研究，因此，在编写时，错误之处，在所难免，希各地兽医工作同志，多多提出宝贵意见。

1959年9月

凡 例

- 1、书中所用藥量，仍按十六两为一斤的計量单位。
- 2、本书所列劑量，一般是指成年牛馬而言，如有例外，均在該处方之后注有“本方适用于猪”或“本方适用于羊”等字样。
- 3、本书基本采用中医医病名，为适应广大讀者需要，在它的后面括号内，列出現代医学病名。
- 4、书中用黑体字印刷的处方，系湖北省农业厅畜牧兽医处、湖北省畜牧兽医科学研究所及畜牧兽医专科学校組織人員在农村通过臨床应用，作过驗證的。
- 5、书中对病原、病状所作的簡要敘述，仅为初学中医医的讀者們提供參攷。
- 6、本书汇集的主要内容是驗方，对于部分疾病有必要应用針灸和手术的，放在处理項内。

目

錄

前言

凡例

一、牛口瘡（口炎）	（ 1 ）
二、宿草不轉（牛第一胃食滯）	（ 1 ）
三、鴉嗝囊積食	（ 2 ）
四、翻胃吐草（嘔吐）	（ 3 ）
五、胃火（胃卡他）	（ 4 ）
六、青草脹（急性臌脹）	（ 4 ）
七、結症（便秘症）	（ 6 ）
八、下痢（腸卡他）	（ 7 ）
九、兔腹瀉	（ 8 ）
十、羊痢疾（腸炎）	（ 9 ）
十一、仔猪白痢	（ 9 ）
十二、大便下血（胃腸炎）	（ 10 ）
十三、鼻出血（衄血）	（ 12 ）
十四、喉火（喉頭炎）	（ 13 ）
十五、肺寒（感冒）	（ 14 ）
十六、咳嗽（支氣管炎）	（ 16 ）
十七、猪喘氣病	（ 17 ）
十八、肺熱（肺炎）	（ 18 ）
十九、麻腳風（流行性感冒）	（ 20 ）
二十、尿閉（尿道結石）	（ 21 ）
二一、尿血（血尿）	（ 22 ）
二二、胞轉（膀胱炎）	（ 23 ）

二三、黑汗风（日射病、热射病）	（ 24 ）
二四、牛风湿症	（ 25 ）
二五、胎衣不下	（ 26 ）
二六、产后风（产后麻痹）	（ 27 ）
二七、翻胞（子宫脱）	（ 28 ）
二八、缺奶	（ 28 ）
二九、火眼（结膜炎）	（ 29 ）
三十、白翳遮眼（角膜翳）	（ 30 ）
三一、癞子（疥癣）	（ 31 ）
三二、猪蛔虫病（猪蛔虫病）	（ 31 ）
三三、牛眼虫病	（ 32 ）
三四、创伤	（ 33 ）
三五、打背（马鞍伤）	（ 33 ）
三六、牛鞭伤	（ 34 ）
三七、脱蹄溃（腐蹄病）	（ 34 ）
三八、溃症（脓肿）	（ 35 ）
三九、脱肛（直肠脱出）	（ 36 ）
四十、农药（1605、1059）中毒	（ 36 ）

一、牛口瘡（口炎）

病原：由于吃了尖硬、过冷、过热，或霉爛的飼料，刺戟口腔而引起。

病状：采食和咀嚼緩慢，口內發熱、疼痛、流涎，重者口腔內發生潰爛。

处方一：用淘米水洗口。

二：野狗糞燒焦，加枯礬少許，共同研細末，敷于口內潰爛之處。

（以上大悟縣 吳光捷）

三：1.黃連一兩 梔子一兩 石膏二兩 甘草五錢 牛蒡子一兩
研末，分二次用開水沖服。

2.用下列藥物研末吹入口內患處。

冰片五分 硼砂五分 玄明粉五分 硃砂六分

（麻城縣 郭壽山）

四：黃連五錢 黃芩八錢 黃柏一兩 山梔八錢 連翹一兩
二花一兩 白芷八錢 薄荷六錢 玄參一兩 滑石一兩
車前一兩 甘草三錢 淡竹葉、生石膏各一兩為引

（孝感專區 余士如）

二、宿草不轉（牛第一胃食滯）

病原：吃了過多不易消化的飼料，或冬季舍飼期間運動不足及飲水缺乏等原因而引起。

病状：食欲減退，反芻停止，背拱起，呆立無神，有輕微腹痛，常用後肢踢腹，有時空口咀嚼，暖氣，初期大便正常，後期干燥，體

溫一般无变化。

处方一：山楂二兩 草果一兩 檳榔一兩 厚朴二兩 枳壳二兩
陈皮八錢 大黃二兩 芒硝二兩 生姜一兩
分二次用开水冲服。此方用于初發病时。

（畜牧兽医研究所整理）

二：廣木香五錢 檳榔五錢 青皮四錢 陈皮四錢
炒枳壳四錢 川黃柏四錢 川黃連四錢
京三稜（醋炒）四錢 蓬莪朮（醋炒）四錢 制香附五錢
黑牽牛（鹽水炒）五錢 大黃（酒洗）六錢 灶心土为引
患此病中期以本方煎水灌服

（黃梅县 張竟成）

三：大黃二兩 芒硝八兩 生石膏二兩 滑石二兩 二丑二兩
番瀉叶一兩 当归一兩 枳壳一兩 厚朴六錢 蒼朮六錢
陈皮五錢 甘草五錢 麻油八兩为引
煎水灌服。

（襄陽农业局整理）

四：大黃一兩 芒硝一兩 神曲五錢 麥芽一兩 山楂五錢
木通五錢 枳壳六錢 厚朴六錢 桔梗八錢 甘草四錢
煎水灌服

（当阳县 庄亦运）

三、鷄嗝囊積食

病原：貪食过多的干硬飼料，停積于嗝囊中。

病状：病鷄呆立不动，垂头，不吃食，嗝囊膨大而硬。

处方一：山楂三錢 麥芽四錢 神曲五錢 木香三錢
先灌麻油三、四滴于鷄口中，再煎服上方。

（沙洋农場 蔡怀珍）

二：神曲、麥芽、檳榔、枳壳、茯苓、雄黃，各等量混合研末，

每鷄日量一錢五分，分兩次餵給。

(天門縣 汪近九)

四、翻胃吐草（嘔吐）

病原：飼養管理失宜，餵飼過飽或吃了帶刺戟性的飼料而引起。

病狀：患畜精神沉郁，頭低耳搭，發抖，嘔吐。

處方一：砂仁一兩 益智仁二兩 草果二兩 川芎一兩 枳殼一兩
厚朴一兩 白朮一兩 陳皮一兩 五味子八錢 小茴香八錢
半夏六錢 茯苓一兩 甘草五錢 白芍八錢 當歸八錢
研末，煎水灌服。

(大悟縣 吳光捷)

二：砂仁五錢 白芍五錢 當歸五錢 丁香六錢
陳皮五錢 甘草四錢 石斛五錢 白朮八錢
益智仁五錢 草果仁八錢 廣木香五錢 肉豆蔻八錢
紅棗五枚為引
煎水灌服。

(鄂城縣 熊武臣)

三：生姜（燒）四兩 灶心土四兩
共煎水除渣，加白酒四兩灌服。

(孝感專署農業局整理)

四：柿蒂一兩 丁香七錢 橘紅六錢 生姜一兩 竹茹七錢
煎水灌服。

(黃陂縣 熊大順)

五：砂仁一兩 蒼朮一兩 白豆蔻五錢 白朮八錢 當歸六錢
川芎六錢 乾姜六錢 枳實五錢 厚朴六錢 甘草四錢
煎水灌服。

(孝感專區 金家祥 王開祥 胡相銘)

六：藿香五錢 豆蔻五錢 豆根四錢 厚朴六錢 黃連三錢

貝母二錢 神曲六錢 木通五錢 白朮六錢

生姜為引。

煎水灌服

(鄂城縣 熊松林)

五、胃火 (胃卡他)

病原：吃了不易消化或霉爛的飼料，或勞役過度，不按时給食，飢飽不均等等原因而引起。

病狀：頭低耳搭，吃食減少，口色不正，流涎，反芻減少，便秘。

處方一：梔子一兩 連翹八錢 枳殼八錢 厚朴一兩 黃連六錢
黃芩一兩 黃柏一兩 蒼朮一兩 龍胆二兩 知母一兩
甘草六錢

研末分二次開水沖服。

(大悟縣 吳光捷)

二：厚朴二兩 蒼朮一兩 陳皮一兩 龍胆二兩 桔梗五錢
甘草一兩 小茴香一兩

研末，分二次開水沖服。

(巴東縣 曾繼榮)

三：厚朴五錢 陳皮六錢 白芍四錢 大茴四錢 神曲一兩
砂仁四錢 茯苓五錢 蒼朮四錢 枳殼六錢 廣木香五錢
大黃一兩 芒硝一兩 滑石一兩

研末，開水沖服，嚴重的先用麻油半斤，蛋白三個，調灌後，再服藥。

(漢川縣 李少祥)

六、青草脹 (急性臌脹)

病原：吃了過量的青草或易于發酵的飼料，如苜蓿、豌豆藤、酒糟

等，或因餵腐敗的豆餅等不良飼料而引起。

病狀：低頭耳搭，流涎，左腹膨起，緊張，食欲、反芻停止，呼吸迫促，口色呈藍紫色，脈洪大，站立時四肢張開，背拱起，常回頭看腹。

处方一：大腹皮八錢 烏藥八錢 茯苓一兩 枳殼八錢
厚朴八錢 陳皮六錢 炒白芍六錢 青皮八錢
六一散一兩 香附一兩 車前草為引。

煎水灌服。

（麻城縣 汪志潤 徐少清）

二：二丑六錢 山楂一兩 大黃三兩 枳殼八錢
陳皮五錢 香皮五錢 萊菔子一兩 玄明粉三兩
厚朴八錢 香油半斤為引

研末，開水沖服。

（麻城縣 兽医站）

三：老蘿卜莖七個 老鼠屎一兩 薄荷葉一把 車前草一把
煎水灌服。

（麻城縣 白果 兽医站）

四：大蒜（搗碎）四兩 香油六兩 南醋八兩
混合灌服。

（當陽縣 張又臣）

五：陳石灰二斤，浸水，使自然沉澱，取用上部石灰水灌服。

（巴東縣 曾繼業）

六：青木香一兩 廣木香一兩 勾藤一兩 菖蒲五錢
木通一兩

煎水灌服（適用於羊）。

（巴東縣 曾繼業）

七：葶澄茄二兩 老鼠屎一把 韭白一兩 萊菔子（炒）二兩
煎水灌服（適用於羊）。

（當陽縣 高鎮中）

八：煤油二～三兩 水八兩
混合灌服。

(涇阳县 黃行寬)

七 結症 (便秘症)

病原：飼養不當，長期餵給乾飼料，飲水不足等所引起。

病狀：病馬臥立不安、打滾，出汗，前蹄刨地，后蹄踢腹，示有腹痛，糞便乾硬。

处方一：当归身四錢 郁李仁六錢 麻 仁三錢 巴豆霜三錢
小条参四錢 云茯苓六錢 寒水石三錢 玄明粉五錢
滑 石四錢 二 花四錢 木 通三錢 麻 油二兩
蛋清三个为引。

研末，开水冲服。

(麻城县 魯宏沑)

二：大 黃二兩 芒硝八兩 枳实八錢 陈皮八錢
川厚朴八錢 木通六錢 滑石六錢 木香六錢
香 一斤

先灌香油，再將上藥研末，开水冲服。

(光化县 陈宗礼)

三：芒 硝二兩 大 黃八錢 厚朴八錢 麻 仁八錢
郁李仁八錢 續隨子八錢 桃仁七錢 炒枳实六錢
二 丑六錢 通 草六錢 鬱金六錢
煎水灌服。

(孝感专区 郑六斤 蔣从洲 王树清 李少祥)

四：大黃二兩 二丑二兩 山楂二兩 芒硝四兩 神曲二兩
煎水并加香油四兩共同灌服。

(大悟县 吳光捷)

五：山 楂八錢 神曲六兩 麥芽六錢 當歸六錢 麻仁六錢
 郁李仁五錢 川芎八錢 枳實八錢 厚朴八錢
 研末，開水沖服。

（天門縣 藍明康）

六：大黃一兩 芒 硝二兩 陳皮一兩 枳殼一兩
 厚朴一兩 老鼠屎一兩 通草八錢 甘草五錢
 煎水灌服。

（孝感專區 周 華 李萬康）

八、下痢（腸卡他）

病原：餵飼大量腐敗、發霉的飼料，感受風寒，或冬季飲了過多的冷水，均可引起本病。

病狀：病初食欲減退，精神不振，糞稀如粥，有難聞臭味，尾根及后肢為糞便所沾污，嚴重者，食欲停止，喜喝水，體質消瘦。

處方一：車前草十兩 灶 心 土二兩 椿樹根皮二兩 側柏葉一兩
 薄 荷四兩 野燈心草八兩
 煎水灌服。

（麻城縣醫站）

二：灶心土四兩 車前草四兩 蚯蚓十五條（放瓦片上焙干研末）

煎水灌服。

（麻城縣醫站）

三：大麥二斤炒焦，加糖一斤灌服。

（監利縣 龔鈞章）

四：茵陳八錢 條芩六錢 赤 芍八錢 澤瀉八錢
 甘草五錢 阿膠八錢 五味子六錢 滑石一兩

木通八錢 猪苓八錢

煎水灌服。

(天門县 藍明康)

五：金鈴草八錢 当 归八錢 赤 芍八錢 厚朴八錢
黃 連八錢 木 香七錢 檳 榔七錢 黃芩七錢
車前草七錢 薄荷叶七錢 肉豆蔻七錢 六一散为引

煎水灌服。

(黃陂县 罗荣么)

六：黃 連三錢 木 香五錢 肉豆蔻五錢 乳 香三錢
沒 藥三錢 甘 草三錢 地榆(炒、去梢)四錢
槐花(炒)四錢 赤石脂一兩 鮮姜三片为引

煎水灌服。

(黃梅县 張竟臣)

七：鬱 金五錢 訶子六錢 黃連七錢 大黃一兩
黃 芩一兩 黃柏一兩 白芍五錢 白芷六錢
金銀花八錢

煎水灌服。

(孝感专区 李楚清)

八：烏梅三分 黃連三分 白头翁八分 乾柿子二分

煎水灌服(适用于羊)。

(宜都行署农业局整理)

九、兔腹瀉

病原：吃了含水过多的飼料或受寒冷刺激所致。

病状：病兔无神，不吃，糞便稀如水，肛門附近常沾滿糞水。

病状：麥芽 谷芽 鷄蛋壳

上藥等量混合，炒枯研末，每次二錢，每日服三次。

(沙洋農場 蔡怀珍)

十、羊痢疾（腸炎）

病原：主要是飼養不當，吃了發霉、腐敗的飼料或喝了污水等而引起。

病狀：拉出的糞便很臭，帶有粘液，初期糞便稍濃，后期稀如水。

处方一：厚朴四錢 陈皮四錢 青皮四錢 枳壳三錢 良姜四錢
香附六錢 木通五錢 山楂一兩 烏梅六錢 黃連二錢
研末，分二次開水沖服。

(沙洋農場 蔡怀珍)

二：紅高粱三兩 萊菔子一兩 神曲一兩 陳麥芽三兩
研末、分三次開水沖服，每天一次。

(當陽縣 高鎮中)

三：馬齒莧、側柏葉各一把，童便一杯，拌入飼料內餵服。

(大悟縣 吳光捷)

十一、仔猪白痢

病原：致病原因複雜，主要為飼養不當，管理不善，豬舍潮濕污穢，氣候突變，母豬飼料突然變換，缺奶或奶汁過多，仔猪運動太少，啃食污物等原因，均易招致本病。

病狀：病初糞便濃稠呈灰白色，后漸變稀，糞便顏色轉呈灰黃、黃綠或灰黑色，具難聞的臭味。几天后仔猪逐漸消瘦，行動緩慢，被毛粗亂，肛門附近沾有糞便。

处方一：白頭翁一兩半 龍胆草一兩半 二花二兩 甘草一兩
煎水餵豬，每日一次。

(榆城縣 趙性松)

二：丁香一斤 藿香二斤 訶子二斤 白芍三斤 秦皮二斤
石榴皮三斤 木香一斤 前仁二斤 粉葛三斤 青皮三斤
茯苓三斤

將上藥用一六二斤開水浸泡二十四小時，放蒸餾器內蒸餾而成。

按體重每市斤用一毫升，注射于小豬皮下，每日一次。

（當陽縣 兽医站）

三：白頭翁四兩 槐花四兩 訶子四兩 官桂四兩 豬苓四兩
茯苓四兩 白朮四兩 澤瀉四兩 肉豆蔻二兩

研末，加入飼料內餵母豬，用量按仔豬一头給藥一錢，每日三次。

（天門縣 汪近九）

四：百草霜一兩 白頭翁末一兩 神曲一兩 麥芽一兩
山楂一兩 紅糖四兩

上藥研碎，加大米飯鍋巴約半斤（研碎）混勻、拌入飼料內餵母豬。

（大悟縣 吳光捷）

五：黃連三錢 乾柿子五錢 艾葉五錢

煎水灌服。

（宜都行署農業局整理）

六：白頭翁二錢 黃連三錢 黃柏三錢 陳皮四錢 訶子三錢
芍藥五錢

煎水分三次灌服（五頭仔豬用量）。

（新洲縣 申道文）

十二、大便下血（胃腸炎）

病原：勞役過度，吃了不易消化的粗硬飼料及刺激性的物質，久喝急

飲等，均能導致本病。

病狀：精神不振，吃食減少，口色微黃，脈搏沉遲，腸音稍高，拉糞時用力，有腹痛現象，糞便帶血，并有膿臭。

處方一：白頭翁八錢 黃連六錢 黃芩五錢 二花一兩
柴胡八錢 白芍六錢 地榆炭八錢 炒黃柏八錢
車前草一兩 赤茯苓八錢 益元散八錢
煎水灌服。

(麻城县 兽医站)

二：玉竹參六錢 茯苓六錢 木香六錢 砂仁五錢
炙甘草五錢 槐花五錢 杜仲六錢 地榆五錢
食醋半斤為引
研末，用開水沖服。

(監利縣 魏宗福)

三：地榆炭一兩 沒藥六錢 白芍六錢 黃連六錢 槐花一兩
車前草一兩 側柏葉一兩
研末，開水沖服。

(麻城县 兽医站)

四：當歸炭八錢 地榆炭八錢 山梔炭八錢 生地二兩
炒丹皮八錢 黃連五錢 炒側柏葉一兩 二花炭一兩
廣木香六錢 荊芥炭六錢 黃芩六錢
煎水灌服。

(孝感专区 胡相銘)

五：荊芥八錢 澤瀉八錢 滑石八錢 槐花八錢 梔子八錢
訶子八錢 白豆蔻八錢 地榆一兩 扁蓄一兩 瞿麥一兩
當歸六錢 砂仁六錢 甘草五錢 生石膏、灶心土為引
煎水灌服。

(廣濟縣 兽医站)

六：取韭菜搗碎，搓成如鷄蛋大的丸子，外裹以稻草灰，投入口內，使其咀嚼吞服。

(荊門縣 孔庚玉)

七：山梔子一錢 槐花一錢 地榆一兩 當歸一錢 赤芍一錢
檳榔一錢 黃連五錢 黃柏一錢 秦皮一錢 大黃七錢
白頭翁一錢

煎水灌服。

(宜都行署農業局整理)

八：黃連 六錢 黃柏七錢 黃芩八錢 槐花炭一兩
白頭翁七錢 白芍六錢 炒蒲黃六錢 地榆炭八錢
炒白朮七錢 澤瀉六錢 薄荷 五錢

煎水灌服。

(孝感專區 侯善之)

九：厚朴 五錢 陳皮六錢 地榆炭一兩 白朮五錢 當歸五錢
薏苡仁六錢 蒲黃五錢 阿膠 一兩 檳榔四錢 木通六錢
枳殼 五錢

煎水灌服。

(孝感專區 涂元廷)

十三、鼻出血（衄血）

病源：由於鼻粘膜受傷，或使役過度，打嗆等而引起。

病狀：患畜有一側鼻孔出血或兩側鼻孔出血，血色常鮮紅，流出的血呈滴狀或綫狀，出血少時，患畜無其他異狀，若出血過多，則表現不安，眼膜及口腔粘膜發白，脈搏細而快。

處方。一：食鹽二兩 韭菜一斤 墨斗草一把

搗碎灌服。

(大悟縣 吳光捷)

二：大黃 五錢 黃柏 五錢 黃芩五錢 梔子五錢 香附五錢
川木瓜五錢 川芎 五錢 瞿麥五錢 地榆六錢 當歸六錢
款冬花六錢 枇杷葉五錢 藕節一兩

研末，開水沖服。

(光化縣 王久長)