

王氏醫案

貞

(の)

王氏醫案續編卷五 原名仁術志

杭州王士雄孟英醫案

武進董介穀蘭初續輯

戊申元旦陳秋槎參軍大便驟下黑血數升繼卽大吐鮮紅之○血○爲○熱○迫○而○妄○行○

○心○無○血○養○故○神○昏○肝○無○血○養○故○症○厥

血而汗出神昏肢冷搐搦躁亂妄言速孟英至舉家跪泣救命

▶▶▶虛在陰分▶熱在氣分

察其脈左手如無右絃更按之數以六十八歲之年僉慮其脫

參湯煎就將欲灌之孟英急止勿服曰高年陰分久虧肝血大

去而風陽陡動殆由忿怒兼服熱藥所致耶其夫人云日來頗

有鬱怒熱藥則未服也惟冬閒久服薑棗湯且飲都中藥燒酒一饼耳孟英曰是矣以西洋參犀角生地銀花綠豆杞子元參

茯苓。羚羊。茅根爲劑。衝入熱童。溲灌之外。以燒鐵淬醋。令吸其氣。龍牡研粉。撲汗生附子。搗貼涌泉穴。引納浮陽。兩服血止。左脈漸起。又加以龜板鼈甲服三帖。神氣始清。各恙漸息。稍能啜粥。乃去犀羚加麥。冬天冬女貞旱蓮。投之眠食日安。半月後始解黑燥矢。兩旬外便溺之色皆正。與滋補藥調痊。仍充撫轅巡捕。瞿鑠如常。秋間赴任紹興。西秋以他疾終。

姚令輿。室素患喘嗽而病。春溫醫知其本元久虧。投以溫補。痽肺原包心而生故肺熱必及於心厥神昏耳聾。譖語面青舌絳。痰喘不眠。皆束手矣。延孟英診之。

脈猶絃滑。曰證雖危險。生機未絕。遽爾輕棄。母乃太忍。與犀角羚羊。參沙參。知母花粉石膏。以清熱息風。救陰生液。佐蕤蓉。

石英。鼈甲。金鈴。旋覆。貝母。竹瀝。以潛陽鎖逆通絡蠲痰三劑而平繼去。犀羚石膏加生地黃服旬日而愈。仲秋令輿病竟誤服溫補數日而殞。豈非命耶。

運糧千總馬香谷患渴祕欲死。所親趙春山司馬延孟英視之脈堅體厚口渴苔黃。投知蘖卮棟犀苑裹茹之藥送當歸龍薈丸而瘳竟不復發。

謝某患嗽臥難偏左。孟英切其脈右寸。裏滑曰此肺虛而痰貯於絡。以葦莖絲瓜絡生蛤粉貝母冬瓜子茯苓威蕤枇杷葉燕窩梨肉投之果愈。

許叔超令大母患瘧。延孟英治之。脈絃滑而數。脘悶便祕。合目

汗出口渴不饑。或慮高年欲脫。孟英曰。此溫邪挾素盛之痰所化。補藥斷不可投。與知芩、婁杏、翹貝、旋茹、連斛、雪羹爲方。服果漸效。

蒲艾田年踰花甲。陡患鼻衄。諸法不能止。速孟英救之。面色黑黯而有紅光。脈絃洪而芤。詢知冬閒廣服助陽藥。是熱亢陰虛之證。與大劑犀角、元參、茅根、女貞、旱蓮、石斛、茯苓、澤瀉、天冬。知母、投之而安。續予滋陰藥。填補而康。

許少卿室故醫陳啓東先生之從女也。夏初患感。何新之十進清解。病不略減。因邀診于孟英。脈至絃洪豁。大左手爲尤。大渴。大汗。能食妄言。面赤足冷。徹夜不瞑。孟英曰。證雖屬溫。而真陰。

素虧久傷思慮心陽外越內風鴟張幸遇明手未投溫散尚可無恐與龍牡犀珠龜板鱉甲貝母竹瀝竹葉辰砂小麥元參丹參生地麥冬爲大劑投之外以燒鐵淬醋令吸其氣蠟粉撲止其汗搗生附子貼於涌泉穴甫服一劑所親薦胡某往視大斥王議爲非而主透疹之法病家惑之卽煎胡藥進焉病者神氣昏瞀忽見世父啓東扼其喉使藥不能下嗌且囑云宜服王先生藥少卿聞之大駭專服王藥漸以向愈而陰不易復頻灌甘柔滋鎮月餘始能起榻季夏汎行惟情志不怕易生驚恐與麥參熟地石英茯神龍眼甘麥大棗三甲等藥善其後秋杪歸寧微吸客邪寒熱如瘧孟英投以清解已得向安胡某聞之復於

眞盲人

服清解藥。致邪氣留戀。再服清涼。
戀豈服滋補藥邪。氣反不留戀。
耶此等人而亦自命爲醫。豈非怪物。

所親處云。此證實由夏間治法不善。以致邪氣留戀。再服清涼。
總。是病者該死。故一時有此二妖孽。
 必死無疑。湯某復從而和之。許氏卽招湯某診治。謂其陽氣傷。
○既已沈寒焉能作寒熱勿論其認證之誤與不誤卽理○中湯亦豈有此等加減法耶。
 殘沈寒久伏以理中湯加威靈仙桂枝半夏厚樸薑棗等藥。病
者頗疑藥太燥烈。湯復膏吞拭舌。說得天花亂墜。病家惑之初。
 服胃氣倍加繼而痰嗽不饑。黃苔滿布。肌消汎斷。內熱汗多。心
 悸不眠。臥榻不起。病者堅卻其藥。然已進二十劑矣。再邀何新
 之商之。亦難措手。仍囑其求診於孟英。按脈絃細更數。纂思懸
 罷。縱有神丹。不可救藥矣。

涼藥未輟。而忽見如
此之證。卽不接脈亦

可知爲新
感溫邪矣

六日其外祖何新之邀孟英診之脈甚絃洪滑數心下拒按便
闊汗多投小陷胸加石膏知母花粉竹葉枇杷葉貝母雪羹二
劑各恙皆減洩赤便行繼與清養而安

費伯元分司患煩躁不眠醫見其苔白也投以溫藥因而狂妄
瘓癰多方不應余薦孟英視之左脈絃細而數右更滑乃陰虛
之體心火熾肝風動而痰盛於中也先以犀羚桑菊息其風元
參丹皮蓮心童洩清其火茹貝雪羹化其痰兩劑而安隨與三
甲至磁硃潛其陽甘麥大棗緩其急地黃麥冬養其陰漸次

康復

何楷階令正素患肝厥仲夏患感沈樾亭按溫證法治之內風

不至。陸動而大便泄瀉脈細而絃渴飲痰多不饑不寐。因邀孟英商之。投白頭翁湯。加三甲石斛茯苓竹茹而安。隨以峻補善後而痊。

許氏婦患間瘧寒少熱多不饑大渴善嘔無汗脈滑而絃。孟英投白虎湯。加花粉柴胡而愈。

吳醞香大令四令媳時患腹脹減餐牙宣脅痛久治不效。肌肉漸消。孟英診脈絃細而數。肝氣雖滯而陰虛營熱。豈幸通溫運之可投耶。以烏梅黃連棟芍。卮子木瓜首烏蟹甲茹貝。服之果愈。繼與甘潤滋填肌充胃旺。汎準脈和。積歲沈疴。宛然若失。

顧雲蘿令正久患腳氣。屢治屢發。馴致周身筋掣上及於巔。齶

痛指麻。腰痠目眩。口乾食少。夜不能眠。孟英察其脈芤而絃數。
真陰大虧。體雖痛。從無赤腫之形。腳氣藥。豈徒無益而已。與二
地二冬二至知藥。桑菊。扈棟。蒿薇。龜板。鼈甲。藕等藥服之。各恙
漸減。蓋因平素帶下太甚。陰液漏泄。而筋骨失其濡養也。故治
病須澄源以潔流。秋閒以海螵蛸粉。魚鱠黃藥阿膠爲丸。服之
全愈。

石北涯令正。久患齦疼。漸至身面浮腫。或以爲虛。或以爲溼病。
日以劇。氣逆不饑。孟英察脈。左洪數。右絃滑。陰分雖虛。先當清
其肺胃之痰熱者。投白虎加沙參花粉。冬瓜皮。枇杷葉。扈子。竹
茹。蘆根。服之。腫即消。繼佐滋陰。齦疼亦止。

肝主疏泄。腎主閉藏。兩尺浮而不沈。是腎失其閉藏之職矣。左寸關弦。是肝木太過獨行其疏泄之權矣。右寸脉沉。即以濡養。肝木加黃柏之苦。以堅之。螺蛸之潤。以固之。用藥如法。故收捷。

金曉香令媳半產後。營分不攝。淋漓數月。治之弗瘳。孟英於季夏診視。兩尺皆浮。左寸關絃與三甲二至二地。蒿薇柏葉螺蛸黃藥爲方。服之漸愈。仲秋診其脈。卽斷受孕渠。謂懷娠必無病矣。而不知病久初痊。正須培養。雖卽受孕。涵蓄無權。果至仲冬而胎墮矣。

德清蔡初泉。陡發寒熱。咽痛大渴。脘悶舌絳。孟英診脈甚數。徑投大劑犀羚元參丹皮桑扈銀花。花粉翹旁之藥。服後偏身發赤疹。而熱退知饑矣。

歙人吳茂林。患右頰腫痛。額下結核。牙關僅能呷稀糜。外科稱名不一。治若罔知。孟英投以天麻殼蠶羚羊石膏。醒頭草升麻。桂。肝。風。清。痰。之。法。

當歸秦艽花粉黃芩等藥漸愈。

吳誦青室年近五旬。天癸已絕。偶患腹脹。局醫黃某知其體素羸也。投以腎氣湯。而寒熱漸作。改從建中法。旬日後病劇而崩。愈補愈甚。乞援於孟英。脈洪而數。渴飲苦黃。是吸收暑邪。得溫補而血下漏也。與犀角元參茅根柏葉瓦棟知斛花粉白薇等藥數劑。始安。續加生地二至三冬滋養而愈。次年患病。仍爲誤藥而殞。

阮範書明府令正患腹痛欲厥。醫見其體甚弱也。與鎖逆通補之法。而勢日甚。孟英察脈絃數左溢。是因忿怒而肝陽勃升也。便悶不饑。口苦而渴。與雪羹瓦棟旋絳元胡丹皮茹貝下左金

王氏醫案續編 卷五
丸而愈。踰年以他疾歿于任所。

海鹽周子因工於畫。體素弱。偶患間瘡。黃某用首烏。鼈甲。薑棗等藥。病日甚。加以參桂。狂躁妄言。始延孟英視之。面赤舌絳。溲濁便溏。渴飲汗多。脈形細數。是暑證也。與元參銀花知芩茹貝竹葉荷梗蓮心西瓜皮爲劑。尋愈。

吳薇客太史令堂。患痰嗽喘逆。便闊不眠。微熱不饑。口乾畏熱。年踰六旬。多藥勿痊。孟英切其脈。右寸關絃滑而浮。左關尺細。與無神。是陰虛於下。痰實於上。微兼客熱也。攻補皆難。偏任與茹貝旋斛。浮石。蘆根。冬瓜子。枇杷葉。杏仁。花粉爲劑。而以熟地泡湯煎服。則渴藥輕投。清上滋下。是一舉兩全之策也。投匕果

應再服而大便行漸次調養獲瘳戊春患感證比孟英白江西歸已不能治矣

謝譜香素屬陰虧情志抑鬱因遠行持重而患欬逆左脇刺痛寸步難移杳不知饑臥難著枕延孟英診之脈象絃細弱數苔膩痰粘便艱溲少乃腎氣不納肝氣不舒肺氣不清胃氣不降投以沙參枇杷葉茹貝旋卮龜板鼈甲絲瓜絡冬瓜子青鉛白前金鈴藕肉而以熟地湯煎服數劑而平繼漸滋填向愈葉承恩室懷妊患感昏諳不眠善嘔便悶汗出不解脈濤口乾乃營陰素虧邪熱內熾以元參石膏知芩茹貝銀花枇杷葉薇杞棟斛投數帖而愈

江夢花如君患。兩目腫痛。不能略張。醫投風藥。昏痺欲厥。浼孟英診之。脈至洪滑。大渴便祕。與白虎湯二劑霍然。

潘復堂令愛。患感。沈悅亭治之。漸愈。惟咽阻無形。水穀礙下。孟英以竹葉石膏湯加紫苑白前旋覆枇杷葉以清肺熱而降肺氣。果卽帖然。

吳西漿患瘧。寒微熱甚。旬餘不愈。孟英診之。脈滑而長。疏大劑白虎湯與之。渠兄濂仲云。沈顧二君皆主是方。屢服無效。孟英索方閱之。湯雖白虎。而石膏既少且煨。兼不去米。因謂其兄曰。湯雖同。君藥已重用。而去米。加花粉竹茹等。其力不同科矣。濂仲大悟。服之尋愈。此可以見服藥不可徒有湯頭之名也。

曹稼梅令愛患眩暈脘痛筋掣吐酸渴飲不饑咽中如有炎鬱
朱某與溫胃藥病日劇孟英診脈絃滑投茹貝黃連旋赭卮棟
枳鬱雪羹之藥十餘劑始愈

夏氏婦懷娠患感醫投溫散漸至氣衝不寐時欲瘞厥脘悶呻
吟渴難受飲所親張養之延孟英診之脈滑數而溢與小陷胸
加旋壅石膏知梔茹杏腹皮蘇子竹瀝海蛇大劑投旬日而愈
設用輕淺之方焉克有濟耶

沈悅亭令正齒衄五日不止去血已多諸方不應孟英脈之絃
滑上溢投犀角澤蘭元參旋覆生地花粉茯苓牛膝桃仁澤瀉
而安既而詢其經事本月果已愆期蓋卽逆行之候也繼用滋

陰清熱。乃漸康復。

此證卽葉氏所謂下竭上結之候也。葉氏雖有方案亦未知果能取效否。不知古名家遇此當作何治法。書中迄無論及者。是鄙人

王雪山于上年誤餌透土丹之時。孟英診治向愈。卽囑其常飲柿餅湯。以杜關格於將來。迨今四月閒。形體日瘦。張某進以導溼疏風補氣之藥。孟英偶見之力。勸其溫補莫投。且以凡物遇火則乾。瘤得滋則肥潤爲譬。雪山深韙之。奈爲張某輩朝夕虛言所眩。仍服補劑。延至秋閒。始延孟英視之。脇痛畏風。周身絡脈時欲敲朴。食少便難。日晡微有寒熱。脈來絃澀而數。右寸關絃更以滑。是升降之令久窒痰邪。襲於隧絡。關格之勢將成。再求治與沙參茹貝薇蒿旋斛卮棟蘭草杞杷葉絲瓜絡冬瓜子蘆根茅根等出入爲方。服之寒熱既蠲。腸痛亦減。雪山大喜。

將斷語與脉證合參。便知審病之法。